

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





LEVI COOPER LANE FUND









# LA MÉDECINE DU BON SENS

DE L'EMPLOI

DES

PETITS MOYENS EN MÉDECINE ET EN THÉRAPEUTIQUE

#### OUVRAGES DE M. P.-A. PIORRY

**Dictionnaire des Sciences médicales** (de 1818 à 1822), un grand nombre de Mémoires. **Traité de Médecine pratique,** dont il reste à peine quelques exemplaires. Paris, 1841-1851, 9 volumes de chacun 600 à 800 pages, et dont le premier constitue :

UN TRAITÉ DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE, dont 150 pages consacrées à l'Étude de l'anatomie pathologique, contiennent l'exposé des faits principaux qui résultent des innombrables nécroscopies que

faits principaux qui résultent des innombrables nécroscopies que l'auteur a pratiquées.

Le neuvième volume, paru en 4854, contient:

UN ATLAS DE PLESSIMÉTRISME, avec 42 pl. représentant plus de de 250 dessins plessimétriques gravés sur bois.

6 fr.

Tratéé de Blagmestie et de Sémélelegie. Paris, 1637, 3 volumes in-8° de 600 à 700 pages.

Cet ouvrage est le plus complet qui existe sur ce sujet. Il a été traduit en allemand, contrelait en Belgique, et même en France, au moyen de Manuels de diagnestie composés preque exclusivement avec les natériaux qu'il coultiest.

Tratéé des altérations du Mang, en 1 volume de plus de 700 nages (1834).

6 fr.

Tous les ouvrages précédents sont épuisés et ne se trouvent plus dans le commerce.

se trouvent plus dans le commerce.

De la Dectrine des états orgamopathiques, de la Nomenclature organopathologique, du traitement de la Variole, suivi de deux Mémoires, l'un sur la Folie et le Délire, l'autre sur la Déristation et la Révulsion. Paris, 1855.

La tavail dont il s'agit est l'ensemble de quelque-uns des discours que M. Piorry a pronencés à l'Académie impériale de Médecine de ses doctrines.

Bulletin de l'Académie impériale de Médecine. Un grand nombre de Mémoires, Rapports, etc.

Exposé amalytique des principaux travaux d'anatomie, de Physiologie, d'Hygène. de Chirurgie, de Diagnostic, de Médecine pratique et de Littérature philosophique de P. A. Piorry, à l'appui de sa candidature à l'Académie des Sciences. 4 volume in-4.

En Médecine du bous sens. De l'emploi des petits moyens en médecine et en thérapeutique. 4 volume de 560 pages, 4re édition.

Traité de Plessimétrisme et d'Orgamographisme.

Andomie des organes sains et malades, établie pendant la vie au moyen de la percussion médiate, et du dessin à l'effet d'éclaircir le diagnostic. 4 volume de 752 pages (1866).

# MÉDECINE

# DU BON SENS

DE L'EMPLOI

DES

# PETITS MOYENS EN MÉDECINE

ET EN THÉRAPEUTIQUE

PAR

# P.-A. PIORRY

PROPESSEUR DE CLINIQUE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Officier de la Légion d'honneur, médecin de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie impériale de médecine, des Sociétés médicales de Poitiers, de Tours, de Boulogne, d'Alger, de Gœttingue, de l'Académie royale de médecine de Madrid, de la Société médicale de Suède, d'Athènes, de la Société royale des médecins de Vienne, Membre honoraire de l'Université de Moscou, de Kharkoff, etc.

#### DEUXIÈME ÉDITION

REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENT



# ADRIEN DELAHAYE, LIBRAIRE

RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 23 ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

1867

(Droits de reproduction et de traduction réservés)



# YMAMMI MMAI

1335

148 766 1867

# AVANT-PROPOS

l'ai l'intention, dans cet ouvrage, de traiter des petits moyens que l'on peut utilement employer, alors qu'il s'agit de prévenir, de pallier ou de guérir les souffrances, les douleurs, les lésions, les maladies dont notre pauvre humanité est affligée.

Ce que je désigne sous le nom de petits moyens consiste en des pratiques quelquesois vulgaires, accessibles à tous, non dangereuses dans leur exécution, et qui, tirées en grande partie de l'hygiène, comprenant parsois l'emploi de substances très-simples, ont cependant une extrême importance pratique.

Ces médicaments si peu compliqués flattent bien moins les préjugés ou les goûts de beaucoup de re-

cins et du public que les médicaments énergiques ou que les formules complexes des empiriques.

L'homme est passionné pour les superstitions; il invoque moins souvent Dieu que les anges, les démons, ou les faiseurs de miracles; il croit plutôt à un spiritualisme fantastique qu'aux faits démontrés par l'expérience et le bon sens; il est très-disposé à admettre ce qu'il ne comprend pas et à nier sottement l'évidence. La drogue lui platt; l'hygiène, qui contrarie ses habitudes, lui inspire de la répulsion. Il court vers les vendeurs d'orviétan, vers les prôneurs de remèdes spéciaux; il écoute les prometteurs de la quatrième page du journal en vogue, et il en veut presque au médecin honnête qui lui dit la vérité et qui cherche à le guérir par des médications fondées sur la raison. Sa foi est robuste en qui le trompe, mais faible ou nulle en celui qui l'éclaire et qui lui parle le langage austère d'un savoir consciencieux.

Ce n'est donc pas pour plaire à la foule ou pour apprendre à faire du metier que cet écrit est publié; son but est d'améliorer la pratique; de la fonder sur des faits incontestables; de la vulgariser, et de femplacer des hypothèses systématiques, des préjugés trompeurs, des prétentions hasardées et spéculatives, telles qu'on les admet encore en général, par des notions positives qui, ne compromettant rien, étant incapables de nuire, peuvent avoir sur la santé et sur la vie des hommes une immense influence.

Certes, le médecin qui, se conformant au plan que

riens de tracer, choisira en thérapeutique le vrai, le suple et l'utile, aura moins de succès dans les salons que celui qui, compromettant son honorable profession par une incroyable audace, par des formules multipliées et per un brillant savoir-faire, acquerra une réputation unpée; mais il méritera l'estime publique, qui, aux yeu de l'homme honnête et consciencieux, est la plus haute des récompenses.

# NOTE RELATIVE A CETTE SECONDE ÉDITION

DE LÁ

# MÉDECINE DU BON SENS

Le titre de cet ouvrage, médecine du bon sens n'a peutêtre pas été compris de la facon que l'entendait son auteur. Il ne signifiait pas, dans l'intention de M. Piorry, que la raison et la logique n'étaient pas en rapport avec des doctrines autres que les siennes. L'acception qu'il donnait à la dénomination de son livre était celle-ci : que les moyens très-simples et en grande partie vulgaires qui constituaient ce travail étaient indiqués par l'expérience et par un rationalisme prudent; ce n'était pas là une flèche méchamment lancée contre d'autres médecins ou contre leurs manières de voir; mais un appel hienveillant fait aux praticiens pour les conduire à l'étude attentive des moyens dits hygiéniques, et à hésiter alors qu'il s'agit de prescrire em-

piriquement et sans examen préalable des remèdes dangereux et recommandés par la tradition sans une étude approfondie des circonstances organiques qui en exigent l'administration.

La médecine du bon sens est celle qu'exerce tout médecin observateur qui, cherchant la vérité avec bonne foi et sans parti pris à l'avance, rejette les théories à perte de vue, les hypothèses hasardées tout aussi bien que les assertions sans preuves et les élucubrations de l'esprit dépourvues d'applications pratiques. C'est pour ces estimables médecins que ce livre a été écrit et ceux-là, j'en ai la conviction intime, utiliseront au lit du ma-lade les documents qu'il contient.

Beaucoup de gens ont vu, dans le livre sur les petits moyens, une œuvre légère et d'une exécution facile; c'est parce qu'ils n'avaient pas lu le traité de médecine pratique de M. Piorry; car, s'ils l'avaient fait, ils se seraient bientôt aperçus que toutes les propositions qui, par leur ensemble, constituent la médecine du bon sens. ne sont que les conclusions logiques des 12,500 paragraphes dont l'ensemble constitue ce même traité. Ils n'ont pas sans doute réfléchi que les conseils contenus dans le livre sur les petits movens ont eu pour base l'expérience pratique d'un médecin qui, reçu en 1816, a été nommé, dès 1826, médecin des hôpitaux de Paris et que le concours a appelé en 1840 à la chaire de pathologie, et plus tard à la clinique de la Faculté. Ils se seraientépargné certains reproches déplacés s'ils avaient compris que M. Piorry avait commencé sa carrière par

#### NOTE RELATIVE A CETTE SECONDE ÉDITION

la publication d'une dissertation et d'un article sur le danger de la lecture des livres de médecine par les gens du monde (1) et qu'il ne pouvait avoir eu d'autre intention dans l'écrit qu'il publiait, que celle de faire un ouvrage utile aux médecins, utile à tous, lequel stigmatisant le charlatanisme, avait pour but, soit d'indiquer les moyens de soulager ou de guérir des maladies, soit de faire voir que la médecine, grâce aux applications de la physique et de la chimie à la science médicale, grâce aussi à la méthode sévère d'examen, de contrôle et de calcul que le progrès lui a imprimée; grâce encore aux documents qu'elle a empruntés aux arts et à l'industrie, est devenue simple et positive, compréhensible et élevée, et ensin, que son but humanitaire l'élève aux premiers rangs parmi les sciences utiles.

La première édition de ce livre, tirée à un nombre considérable d'exemplaires, a été bientôt épuisée. Destiné aux médecins, ainsi que le font voir les termes scientifiques et le tableau de la nomenclature qui s'y trouvent, cet ouvrage a été favorablement accueilli par les véritables praticiens. Tels articles malveillants dont il a été le sujet ont été l'œuvre d'auteurs qui n'ont pas vu de malades et qui fréquentent plus souvent les bibliothèques que les hôpitaux, les amphithéatres et les salles où l'on se livre aux expérimentations. Certaines gens n'ont pas craint de dire qu'il n'appartenait pas à

<sup>(1)</sup> Thèse de M. Piorry à la Faculté de Médecine, sous la présidence du venérable Hallé, 1819 article : livres du dictionnaire des sciences médicales.

# VI NOTE RELATIVE A CETTE SECONDE ÉDITION

a le qui la ba coulesseur de Faculté de s'occuper de tama de l'agracs, les autodors out lié que ce qui conits, a iss de energher à être utile : quelque-Victor Militar and the angle of date pien les choses minimes s'élève. a la qui tente d'aborder les grandes choses the many more qualities peut atteindre leur hauteur. Le 🔍 😘 . Amie au pedicure ignorant qui n'a pas aus auses et le mode de la production du mal a la aparament traité, est parfois suivi de la forand the chees dangereux, et même d'un ulcère se a esquisserend aux museles et aux os; l'épiderme in en par le dendille près de l'ongle, et dont la base man, provoque le developpement d'un panaris and the vives souffrances, et peut même compro- vie la plus foible diarrhée, en temps d'épi-- a tora anvie, si l'on n'y remédie pas, d'evaaccordes et mortelles, etc., etc.

The continues dirigees par de mauvaises pastic le vindicatives inimitiés, fussent-elles continue de come spirituelle, qui souvent leur de continue de continues printipule, qui souvent leur de continue de continue sur d'utiles écrits, s'en de l'equalitation de continue et au deutiles écrits, s'en de l'equalitation couvert en étant envieux, méchant et togra de comme la therapeutique simple, hygiétique consonnéelle, mottensive et humanitaire a triomple de continue au decluse qui a pris le caprice par bien de le les au decluse qui a fantaisie pour despara et les medicaments-poisons pour agents de trattement!

Entre les deux éditions du livre sur les petits moderne en médecine (de septembre 64 à octobre 1866), M. Piorry a publié un livre de huit cents pages in-8°, qui fait aussi partie de la médecine du Bon sens; car les préz ceptes qu'il contient sont fondés sur un fait on ne peut plus vulgaire, c'est-à-dire qu'un corps, quel qu'il soit. et que chaque partie de ce corps donnent, par la percussion, des sensations acoustiques et tactiles en rapport avec sa composition, sa structure, son épaisseur, sa contenance, etc. Le traité de plessimétrisme est entièrement pratique; il fait voir combien sont grandes et importantes les applications de la percussion médicate à la diagnose et au traitement des maladies. L'auteur est convaincu que les médecins qui auront lu attentivement la médecine du Bon sens verront que la conscience leur fait un devoir d'étudier avec une attention extrême une science et un art qui leur donnent les moyens d'apprécier pendant la vie l'anatomie des organes sains et malades.

A ceux qui veulent savoir ce que la médecine a acquis de positivisme et de précision, et combien sa marche est devenue assurée, je recommande la lecture du traité de plessimétrisme qui forme un résumé complet de ce qui a été fait sur ce sujet depuis 1826.

Ils y verront que la science qui apprend à soulager et à guérir les souffrances humaines, a désormais des bases et une méthode tout aussi sévère que les sciences physiques et mathématiques. Peut-être finiront-ils enfin par penser que les études si difficiles, si longues, et

parfois si périlleuses du médecin, méritent la reconnaissance des hommes, au moins'autant que celles qui conduisent aux découvertes astronomiques, ou à se distinguer dans l'art terrible de remporter des victoires.

On demandait, il y a peu de temps, à un médecin qui avait beaucoup vu et beaucoup réfléchi, comment il fallait s'y prendre pour atteindre un âge avancé, et tout en conservant une organisation convenable.

- Vous obtiendrez, répondit-il tout d'abord, un résultat si désirable en suivant les règles d'une hygiène morale et matérielle.
- Commencez, disait-il, par éviter tout excès, et combattez les passions mauvaises et tristes; la haine, la colère, l'envie, la vengeance, etc., qui entravent l'exercice des fonctions organiques, qui altèrent la respiration, l'action du cœur et du cerveau, et qui rendent vieux avant le temps. Sachez bien que le bonheur est comparable à une balle élastique qui revient sur soi alors qu'on la dirige sur autrui. Rien ne prolonge l'existence comme de voir heureux ceux qui vous entourent; la conscience d'avoir fait le bien et le constant désir de le faire, sont des raisons puissantes d'acquérir le courage nécessaire pour supporter les ennuis de la vie et les petites douleurs inséparables de l'existence.

Ne recourez pas sans nécessité à des médicaments inutiles ou dangereux; c'est une chose déplorable de rendre malades, par la crainte de périr, son corps et son esprit; la terreur continuelle du trépas semble l'attirer

HOTE RELATIVE A CETTE SECONDE ÉDITION moi; la mort semble redouter qui la brave; les épitais pestilentielles respectent d'ordinaire l'homme pi. courageusement, s'y expose; elles frappent le pualianime qui, redoutant l'air qu'il respire, l'aliment qui bi plait, le froid, le chaud, l'humidité, s'enveloppe de vètements épais, lesquels rendent l'exercice pénible et but perdre, par la sueur et la fatigue, une partie des éléments nutritifs, et, par conséquent, des forces.

Cherchez cependant à vous opposer, par des moyens simples et inoffensifs, aux indispositions trop souvent négligées, qui, abandonnées à elles-mêmes et s'aggravant avec le temps, donnent chacune une chance de souffrance et de mort.

Telle hémorrhoïde légère, dans le principe, et à laquelle la Médecine du bon sens remédierait si facilement, donnera peut-être lieu plus tard à une hémorrhagie suivie d'anémie, à une inflammation douloureuse de la partie où elle a son siège, à une fissure horriblement pénible, à une fistule, à un cancer incurable; les enduits de la langue qu'on n'aura pas le soin d'enlever, auront pour résultat le défaut d'appétit, la langueur des digestions, des accidents septiques, etc.; le tartre des dents accumulé sera plus tard la cause de leur chute, et par suite, du défaut de mastication et de tous les symptômes facheux qui en résultent. Dans un cas d'épidémie cholérique, arrêtez tout d'abord la diarrhée, si vous voulez prévenir un choléra mortel; remédiez à la rhinite initiale pour éviter une bronchite ou une pneumonite grave; si vous ne vous opposez

#### NOTE RELATIVE A CETTE SECONDE ÉDITION

pas à la stase prolongée des scories dans l'intestin, vous vous exposez à de dangereuses souffrances du tube digestif; si, par le défaut d'une scrupuleuse propreté, vous laissez séjourner des substances putrides sur votre peau ou dans les conduits ouverts à l'extérieur, il se peut faire que la moindre écorchure entraîne après elle des accidents funestes; le cor aux pieds que l'on ne soigne pas devient parfois un abcès ou un ulcère perforant, etc., etc.; encore une fois, chacunc de ces petites choses négligées, devient, comme il a été dit, une chance de mort, et si vous additionnez ces chances mauvaises, vous verrez tout d'abord que tel qui saura les éviter, non-seulement aura une meilleure santé, mais devra vivre mieux et plus longtemps que ceux qui n'agiront pas ainsi.

C'est parce que M. Piorry était convaincu des faits précédents qu'il a livré à la publicité la Médectine du bon sens; ce n'était certainement dans aucun autre but qu'il l'a fait, et son plus cher désir est que la lecture de ce petit ouvrage soit utile à l'humanité et à la science.

#### LA

# NÉDECINE DU BON SENS

DE L'EMPLOI

DES PETITS MOYENS EN MÉDECINE

RT EN THÉRAPEUTIQUE

Il est difficile de soumettre à un ordre scientifique et déterminé les nombreuses médications dont il va être question. Comme plusieurs d'entre elles se rapportent à des organes divers, il est à craindre, en les exposant d'une manière successive, de commettre des répétitions fréquentes. Quand ces répétitions auraient lieu, ce ne serait pas là un grand inconvénient; car il est préférable de parler deux fois d'un fait utile que d'oublier entièrement d'en faire mention.

Quoi qu'il puisse arriver de ces répétitions, je commencerai par exposer les procédés curatifs très-simples et très-inosses propres à remédier à certaines lésions des parties extérieures du corps de l'homme; puis je m'occuperai de moyens tout aussi peu compliqués et applicables aux soussrances des organes intérieurs; je terminerai par des considérations relatives à diverses méthodes curatives très-peu complexes et non dange-

12 DERMOPATHIES; PRÉCAUTIONS HYGIÉNIQUES reuses, propres à combattre quelques-unes des affections du système nerveux ou névraxe.

Le thérapisme simple et hygiénique des maladies de la peau (dermopathies) sera tout d'abord l'objet de mon étude.

# CHAPITRE PREMIER

MALADIES DE LA PEAU CONSIDÉRÉES EN GÉNÉRAL (DERMOPATHIES OU DERMIES) (1).

#### 1. Précautions hygiéniques.

Les grandes indications à remplir, alors qu'il s'agit de guérir les maladies de la peau, sont principalement les suivantes :

- 1. On doit éviter le contact sur les téguments des corps susceptibles de les altérer, de les léser, de les blesser d'une manière quelconque;
- 2º Il faut prévenir les frottements qui pourraient avoir lieu entre le surface malade et les parties qui peuvent la toucher;
- 3º Il convient d'abriter cette surface contre l'action de l'air:
- 4º Il est urgent d'empêcher que des matières malpropres, putrides ou purulentes viennent souiller la portion de peau affectée;
  - (1) Trailé de médecène pratique, par M. Piorry; t. VII, passin.

# NAMOPATHIES; PRÉCAUTIONS HYGIÉNIQUES

son duit enlever les concrétions, les croûtes qui se fament sur les régions du tégument où le mal a son sign; car il arrive fréquemment que du pus s'accume au-dessous d'elles, entretient le mal et cause des scidents graves. C'est principalement dans la variole milest utile de faire tomber de bonne heure les croûtes de lace, ce qui prévient les ulcérations profondes et les cicatrices qui en sont les conséquences. C'est au mojen de lotions avec l'eau tiède; c'est avec des onctions répétées avec l'huile que l'on parvient, dans la petite vérole, à détacher les pyolithes (pierres de pus, croûtes purulentes) de la face;

6º Il convient de favoriser la circulation dans ces parties, de manière à empêcher les stases de liquides;

7º En général, il est bon de maintenir la région aflectée dans une température douce et humide.

Or, c'est presque toujours par des procédés simples auxquels le bon sens conduit, que l'on satisfait aux importantes indications qui viennent d'être établies.

# 2 Soins de propreté, lavage, lotions, onctions diverses, bains, etc.

Avant tout, une extrême propreté, le lavage, soit avec l'eau tiède ou légèrement savonneuse, soit avec l'huile, alors qu'il s'agit de corps gras, soit même avec l'alcool, qui dissout les résines, sont d'une incontestable utilité (et le choix de ces matières doit être en rapport avec la composition des substances qui salissent la peau malade). C'est surtout pour les pauvres gens que

## DERMOPATHIES; SOINS DE PROPRETÉ

ce principe est on ne peut plus applicable. Dans mon service d'hôpital, je recommande aux infirmiers de veiller à ce que toutes les personnes qui y entrent prennent un bain. Si quelques circonstances s'y opposent, le corps de ces malades doit être lavé avec une éponge trempée dans l'eau légèrement échauffée.

Il n'est pas moins utile de détruire les parasites, qui bien souvent sont eux-mêmes susceptibles, comme nous le verrons bientôt, de causer des maladies de la peau et de les entretenir. On combat par des médicaments inutiles des dermopathies qu'il serait bien facile de faire cesser en faisant périr des acarus de la tête, du corps ou du pubis qui causaient et entretenaient ces affections. En général, pour obtenir ce résultat, on emploie l'onguent mercuriel, avec lequel on fait une ou deux onctions; pour éviter la salivation parfois causée par les frictions hydrargyriques, il suffit de la déposer sur la peau sans exercer de frottements. Cependant l'action du mercure appliqué sur les grandes surfaces est à craindre; pour éviter cet inconvénient, on peut porter, avec un pinceau, une petite portion d'onguent napolitain sur des points très-limités où se voient des acarus, et ils ne tardent pas à périr. La poudre de pyrèthre ou de Vicat, et peut-être toute autre substance pulvérulente très-fine et très-propre à boucher les trachées des insectes, sont suffisantes pour produire le même effet. Il n'est pas impossible qu'il en soit ainsi pour l'animalcule de la gale.

Il faut bien savoir que les acarus de la tête des enfants

unt jamais un mal utile et que, nés dans la malpronté, ils sont susceptibles de causer des accidents pares. L'utilité des insecticides est non moins grande pur assainir les lits sur lesquels le corps du mabérrepose, et il faut ne pas oublier que trop souvent un a pris des pétéchies (taches typhoïdes), pour des urticaires (éruptions semblables à celle que cause le toucher des orties), certaines dermopathies dues aux pirdres des insectes.

Je suis persuadé que l'ensemble des précautions hygiéniques dont il vient d'être parlé (pages 12 et suivantes), est d'une si grande importance que, dans mon opinion, le médecin qui les emploierait sans médicament, remédierait mieux à la plupart des maladies de la peau que celui qui les négligerait et aurait recours à des moyens pharmaceutiques variés.

Dermopathies (maladies de la peau) causées par des agents extérieurs, et que l'on fait cesser en prévenant l'action de ces causes.
 Démangeaisons ou prurit, prurigo, etc. — Inconvénients de la flancile.

Les démangeaisons dont la peau est si fréquemment le siège sont, dans bien des cas, aussi difficiles à guérir et même à pallier, que pénibles à supporter. Elles irritent le malade, lui rendent le travail difficile, et sont toujours portées à un tel degré qu'elles le privent de tout sommeil. Les médecins les plus expérimentés échouent trop souvent dans la curation de cette insupportable souffrance.

Les bains, les applications de substances tantôt acides (l'eau vinaigrée), tantôt aqueuses (les cataplasmes), tantôt narcotiques (le laudanum, l'extrait de belladone, etc.), stimulantes ou astringentes (le tannin, etc.), spécifiques (le plomb), plus ou moins cautérisantes (l'azotate d'argent, etc., etc.); certains traitements dirigés contre des maladies internes supposées plutôt que prouvées; et même l'arsenic, sont, tour à tour, employés avec plus de patience que de succès, et ne remédient guère à un prurit souvent insupportable.

A la suite de cette souffrance qui porte le malade à se gratter, se déclarent des boutons très-petits et très-peu saillants qui sont les points de départ de douleurs réelles. Chez les vieillards, on appelle ce mal le prurigo senilis; mais l'éruption dont il s'agit n'a pas moins fréquemment lieu chez des gens de tous les àges, et elle s'y déclare souvent avec une extrême vivacité. Eh bien ! si l'on étudie avec soin la peau de ces individus, voici ordinairement ce que l'on observe :

D'abord, chez les vieillards pauvres, chez les gens misérables, on trouve trop souvent les acarus dont il a été parlé, et qui donnent lieu à ce prurit qui se manifeste si fréquemment sur la tête des enfants et sur certaines parties du corps des adultes; évidemment, ici, en faisant périr les animaux qui causent la démangeaison, on remédie à celle-ci (1).

Relèguez au nombre des contes de vicilles semmes

<sup>(1)</sup> Voir page 14, etc.

cette maladie pédiculaire que des auteurs sérieux ont admise, et sachez bien qu'un vêtement malpropre, et non pas la peau elle-même, était, dans la plupart des cas que l'on a cités, le foyer ou le nid des accurus.

## 3 bis. Rougeurs, boutons causée par le contact direct de la fianelle.

Ailleurs, des rougeurs et des boutons, accompagnés aussi de démangeaisons très-pénibles, se déclarent sur diverses parties du corps contre lesquelles frottent constamment des vêtements de laine ou des tissus plus ou moins inégaux, saillants, rudes et pileux. Souvent il en arrive ainsi alors que ces habillements sont sales; mais ces mêmes vêtements, fussent-ils propres, occasionnent parfois, surtout chez les personnes très-impressionnables, les mêmes accidents. C'est principalement lorsque le dos fait habituellement une saillie arrondie en arrière, que ces démangeaisons et ces éruptions variées se déclarent. Elles sont dues à la pression et aux mouvements d'allée et de venue exercés par les tissus. Les autres parties des téguments qui recouvrent la poitrine sont aussi, à la suite de l'apposition directe de la flanelle sur la peau, atteintes d'accidents semblables, et il arrive même, si l'on ne reconnaît pas la cause du mal, ou si on le laisse s'invétérer, qu'il se manifeste de petites tumeurs qui s'abcèdent, des ulcérations suivies de taches rouges ou même de cicatrices désagréables à voir.

On a extrêmement abusé de l'application directe de

la fianelle et l'on a gratuitement supposé qu'en irritant la peau, elle portait le mal au dehors. C'est là une préoccupation d'esprit qui, née de la vieille théorie sur la dérivation et la révulsion (1), ne peut être admise par la science moderne; tout au plus cette application peut prévenir un refroidissement rapide du tégument par l'air extérieur. En ce sens, elle peut avoir de l'avantage, mais cet avantage subsiste en faisant doubler du côté de la peau, cette même flanelle par un tissu de toile bien doux et à demi-usé.

Beaucoup de malades qui m'ont consulté pour des dermopathies semblables, existant à la poitrine ou au dos, ont vu la démangeaison et les éruptions dont il s'agit, cesser, alors que, d'après mes conseils, ils ons pris cette dernière précaution.

 Procédés applicables à la curation des petites blessures de la peau.

Les moindres blessures de la peau ont leur danger, et par négligence, par de mauvais soins, elles peuvent donner lieu à des accidents graves et même mortels. Les grandes indications dans ce cas, sont:

10 De laver très-exactement la petite plaie; 20 d'extraire les corps étrangers qui y auraient pénétré; 30 de tenir élevées, le plus haut possible par rapport aux autres parties du corps, celles dont le sang coule; 40 d'établir, au besoin, une légère compression sur le point où

<sup>(1)</sup> Voyez mon discours lu à l'Académic sur la dérivation et la révul-

lleurhagie se manifeste. et, quand l'imbenent sonpius cesse, de rapprocher les barls de la blessaire et Uniter celle-ci contre le confact de l'air et des corps tragers.

lorque l'on parvient à obtenir es résultats, proque puois la petite plaie ne s'enfanne ou ne couse de buleur.

le taffetas ichtyocollé ou d'Angleterre, le collodium soul utilement employés dans les intentions précédentes; mais ce taffetas réussit seulement lorsqu'étant parfaitement humecté, il est devenu bien souple; lorsqu'il est convenablement appliqué et qu'on le laisse sécher sur la partie lésée. S'il est place sur la peau humide, il ne s'agglutine pas ét alors son emploi est tout à fait sans résultat; le collodium, en se desséchant, forme une membrane sèche et dure qui a beaucoup d'inconvénient.

En petit moyen encore plus simple et plus couvenable est de se procurer un morceau de baudruche gommée, de mouiller fortement le pourtour de la petite blessure, d'appliquer la baudruche du côté où existe la couche mince de gomme; celle-ci, en se fondant sur les entourages de la plaie, s'accole, recouvre la partie divisée et, se solidifiant bientôt après, maintient en contact, de la manière la plus parfaite, les bords de la solution de continuité. Cette baudruche est transparente, paraît à peine et laisse voir au-dessous d'elle l'état de la partie ma-lade; elle n'exige aucun appareil de pansement.

Évidemment, dans les casprécédents, c'est l'organisme

lui-même qui se guérit; l'art ne s'occupe que de maintenir les lèvres de la plaie en contact.

Toutes les eaux, toutes les pommades, tous les pansements du monde ne valent pas ici le taffetas ichtyocollé et surtout la baudruche gommée et appliquée de la facon dont il vient d'être parlé.

L'inconvénient de ces deux substances est de se dessécher; car alors leur contact devient très-incommode et elles tiraillent le tégument sur lequel elles ont été placées.

Aussi arrive-t-il que l'on préfère en général à ces médications le diachylum étendu sur du linge et auquel on donne le nom de sparadrap; malheureusement, cet emplâtre est presque toujours si mal préparé, qu'il ne colle pas et par conséquent ne remplit en rien l'offica que l'on en attend. Desséché dans les pharmacies, il n'adhère à la peau en aucune façon, et s'il arrive qu'on l'échausse au seu et qu'alors on l'applique, il se détache lors du resroidissement. Ailleurs il est étendu sur un tissu de fil ou de coton neuf et si peu slexible qu'il ne se prête en rien aux sormes et aux mouvements des parties. Tout médecin qui cherche à guérir par adhésion une plaie petite ou même grande, doit préparer lui-même l'emplâtre de diachylum, et cela au moment où il veut s'en servir.

 Préparation de l'emplatre de diachylum. — Taffetas recouvert de cet emplatre.

De tous les tissus que l'on peut employer pour for-

me la trame de l'emplatre de diachylum, celui qui russit le mieux est à coup sûr le taffetas assez usé pour tre flexible et assez résistant pour ne pas se déchirer aciement. On étend ce taffetas sur une table; prenant abra une lame de couteau échauffée soit au seu, soit à h flamme d'une bougie, soit dans l'eau bouillante. menière avec cette lame la surface desséchée d'un medaléon (ou bâton) de diachylum; la partie centrale de ce magdaléon, qui n'est pas altérée par l'air et par l'évaporation, est alors facilement coupée en tranches ninces. On étend celles-ci sur le taffetas avec la même ame échauffée, de manière à former une couche épaisse, et l'on obtient ainsi un emplatre tellement agghtinatif, qu'il adhère tout d'abord et par la plus légère application au doigt qui vient le toucher. Si l'on en découpe des bandelettes, elles collent si bien aux lèvres des plaies qu'elles les maintiennent parfaitement fixées.

L'utilité de cet emplatre est très-grande; il réussit parfaitement, alors qu'il s'agit de petites écorchurcs; mais c'est surtout pour les grandes plaies qu'il est extrèmement utile. Tenant de la manière la plus parfaite leurs lèvres rapprochées, il ne vacille pas, et prévient par sa parfaite adhésion le contact avec la peau de l'air et des substances putrides; il ne se dessèche que difficilement; il entretient le tégument dans une humidité salutaire, tandis que le collodium, la gomme, la gélatine, s'indurent par dessiccation et laissent évaporer les sucs cicatrisateurs exhalés de la plaie; il protège

22 DIACHYLUM APPLIQUÉ DIRECTEMENT SUR LA PEAU enfin contre les corps extérieurs les tissus dilacérés et dénudés.

Le plus souvent alors, au-dessous de cet emplâtre, la cicatrisation s'opère d'une manière très-prompte, et il ne se manifeste pas d'érysipèle autour de la plaie qu'il recouvre.

Pour bien comprendre les immenses services que pout rendre cette préparation, il faut se rappeler que l'opération la plus habilement pratiquée, si le pansement est mal fait, réussit fort mal ; tandis que l'on a vu des chirurgiens assez inhabiles comme dextérité, mais qui mettaient dans leurs pansements un soin extrême, réussir au delà de toute espérance.

Le taffetas recouvert de diachylum se plie, se moule sur la forme des parties qu'il recouvre; les liquides déposés entre cette substance et la peau ne se pourrissent pas, car l'air n'y parvient point, et par conséquent les sucs qui découlent des plaies ne se putréfient pas. S'ils pénètrent dans la circulation, ils ne déterminent pas les graves accidents qui surviennent alors que les matières septiques parviennent dans les vaisseaux.

6. Emplâtre de diachylum appliqué sans taffetas sur les parties malades, et recouvert de poudre de lycopode; cas où îl est utile. — Dermites périasiques ou érysipèles; variole, varices, etc.

Il est un moyen tout à fait simple et d'une application pratique immensément utile dans la curation des dermopathies (maladies de la peau), et auquel j'ai été naturellement conduit par mes recherches cliniques mission que des couches graisseuses solides et des applicant avoir sur la peau, et avoir sur la peau, le voici : on prend un magdaléon d'empistre étadylum très-récent préparé et très-agglutinatif; achause son extrémité à la flamme d'une bougie, et avoir le general pour ne pas brûler le tégument, puis un dépose à chaud une couche très-mince sur la partie de derme que l'on veut protéger contre les agents

etérieurs, et au moment où il est encore collant, on projette abondamment sur ini de la poudre de lycopode na touteautre poudre réduite à un état impalpable, à la-quelle on peut donner la couleur qui parait au malade la plus convenable. On peut encore faire fondre le diachylum dans un vase à une température de trente et

Il résulte de ces pratiques une sorte d'épiderme soide, et qui conserve assez d'onctuosité pour ne pas se dessecher, s'écailler et causer des tiraillements désagréables. Cette enveloppe, dont les poudres agglutinées et non des trames forment le tissu, ne se laisse péné-

quelques degres, et en faire alors une application sur la

partie où le mal a son siège.

elle prévient la dessiccation, retient au-dessous d'elle l'humeur de la perspiration et se conserve appliquée pendant des jours, des semaines et des mois; je l'ai vue se polir à sa surface par l'allée et venue des vétements et ne pas se détacher. Son épaisseur, sa consistance, empéchent dans beaucoup de cas le contact douloureux des corps étrangers. Alors que l'on veut l'enlever, il

trer ni par l'air, ni par la lumière, ni par l'humidité:

24 DIACHYLUM APPLIQUÉ DIRECTEMENT SUR LA PRAU suffit, pour y parvenir, de la dissoudre dans l'huile d'olive ou d'amande douce.

Les cas dans lesquels l'application du diachylum lycopode a réussi au delà de toute espérance bien que l'invention que j'en ai faite date à peine de quelques mois, sont on ne peut plus nombreux, et parmi eux, je citerai les suivants:

- 1º Le prurit (démangeaison): soit qu'il s'agisse de celui qui (p. 16) a pour siége principal les téguments du dos, sur lesquels les vêtements, les bretelles, par les frottements qu'ils causent, blessent la surface cutanée; soit que l'on veuille combattre la démangeaison insupportable que provoque quelquefois, lors de la marche, le contact des pantalons sur la peau des mollets, alors qu'ils font en arrière une saillie prononcée; soit enfin que l'on veuille remédier au prurit existant à la surface des lèvres vulvaires ou du tégument du pourtour de l'anus, ainsi que cela a lieu par suite de la présence des hémorrhoïdes, etc.
- 2º L'urticaire, dont on calme presqu'instantanément les démangeaisons par la poudre de pollen de Pyrèthre (poudre de Vicat) qui peut-être agit quelquefois ici comme insecticide.
- 3° Les inflammations superficielles de la peau dites érythèmes, tels que l'intertrigo (rougeur des téguments entre deux parties qui se frottent), les brûlures, les souffrances des téguments à la suite de l'application des vésicatoires, la rougeur douloureuse, suite de l'insolation, etc.

DIACHYLUM APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LA PEAU 25

4° De petites ulcérations cutanées et très-superficielles, quelle qu'en soit la cause (p. 12).

8º Des dermites extensives (érysipèle, dermites périasiques) les plus légères comme les plus graves, et sai eu dans ma clinique des cas de ce genre aussi heureux que remarquables. Que de sois nos-élèves n'ont-ils pas vu de pauvres gens, ayant été atteints d'érysipèle de la face menaçant la vie, chez lesquels le mal avait été aubitement arrêté par l'application sur la surface enfammée du diachylum lycopode! Sur un banquier de mes amis, âgé de soixante-dix ans, un semblable succès a été obtenu; la paupière gauche seule a été très-malade, parce que l'enveloppe protectrice n'avait pu y être appliquée.

6° Des varioles très-graves, et j'ai encore présent à l'esprit le fait de cet homme couché au n° 6 de la salle Saint-Charles, qui, entré au troisième jour de l'éruption d'une vario-dermite assez grave, eut la moitié de la figure et du nez couverts de diachylum lycopodé; ces parties ne se tuméfièrent pas, il n'y eut pas de cicatrices, tandis que la joue opposée augmenta considérablement de volume et fut le siège de dépressions cicatricielles.

Je me souviens surtout d'un malheureux, couché au n° 24 de la même salle, atteint d'une petite vérole confluente et dont les jambes et les cuisses se couvrirent d'ulcérations répandant une odeur infecte. Il dut la vie aux applications du diachylum lycopodé faites pendant plusieurs jours avec un soin extrême par Henri Devolx, infirmier intelligent, qui, tenant peu de compte du pé-

ril qu'il courait, ne songea qu'à conserver le malade.

Les applications pratiques du moyen si simple dont il vient d'être parlé, sont innombrables et ne peuvent être toutes prévues; mais tout porte à croire que, sans les diverses lésions du tégument des jambes qui survienment consécutivement aux varices, le diachylum lycopodé sera d'une extrême utilité. Il n'est même pas impossible qu'en appliquant sur la peau relàchée qui recouvre les phlébectasies, ou même certaines hernies (les petites hernies ombilicales, par exemple), une couche très-épaisse de diachylum recouvert de lycopode ou de toute autre poudre porphyrisée, on puisse former ainsi un tégument artificiel, capable de maintenir les varices ou veines dilatées (phlébectasies) et les intestins s'échappant de leur cayité naturelle. Je reviendrai plus tard sur ce sujet.

On peut couvrir de ouate les deux mains des variolés pour les empêcher d'enlever les croûtes du visage.

### 7. Moyens simples à employer contre les brûlures légères et superficielles.

La plupart des moyens généralement employés contre les brûlures sont d'une faible utilité pratique. Avant tout, ce qu'il convient de faire dans de tels cas, c'est, au moment même où le mal vient d'être produit, de soustraire le calorique qui l'a causé en plongeant pendant quelques minutes la partie brûlée dans l'eau froide, et surtout dans celle qui contiendrait quelques fragments de glace, L'indication est ensuite d'empêcher le contact

de l'air et des corps étrangers et cela comme s'il s'agissuit d'une lésion de toute autre nature.

Dans ce cas donc, ainsi qu'il a été dit pour les petites blessures (p. 18), ce qu'il y a de mieux à saire est d'appliquer sur la partie lésée, et au moment où elle vient de sortir de l'eau, une couche de taffetas enduit de diachyfam très-agglutinatif et de le maintenir avec un linge qui, pour s'accommoder à la tuméfaction qui ne manquera pas d'avoit ultérleurement lieu, n'exercera qu'une compression légère. S'il arrive, comme il en advient alors que la bralure est forte, étendue ou profonde. que les parties qui en sont le siège deviennent rouges, chaudes et enslées, on tiendra la partic lésée le plus élevée possible et on la recouvrira d'un cataplasme de farine de graine de lin et d'eau de guimauve. Lorsque la congestion sanguine et la douleur se seront dissipées, on reviendra aux applications de taffetas enduit de diachvlum.

Ce traitement si simple est applicable à tous les degrés de la brûlure et convient tout aussi bien dans le cas où se manifeste une simple hyperémie (augmentation de circulation sanguine) que dans les circonstances où il s'est forme une collection de sérosité sous l'épiderme (ampoules, phlyctènes, etc.), ou encore dans celles où les tissus détruits par l'accumulation du calorique ne sont plus que des nécrosies (escarrhes gangréneuses) qui doivent se séparer plus ou moins tard des parties sous-jacentes encore vivantes, mais rendues malades par la cautérisation. Ce n'est pas ici l'emplatre qui, par des propriétés médicamenteuses, guérit la brûlure, c'est l'organisme qui remédie aux lésions causées par le feu. Le diachylum sert à la curation en s'opposant à l'action des corps extérieurs qui blessent les parties dont l'épiderme est altéré ou détruit. Cet emplatre empêche la putréfaction du pus qui se forme sur la surface dénudée et rend ainsi inoffensive la résorption de ses éléments constituants. Au-dessous de la couche emplastique, une cicatrice convenable se forme.

Des considérations analogues aux précédentes sont aussi relatives à l'application directe du diachylum (rendu liquide par une douce chaleur) sur de légères brûlures dans lesquelles l'épiderme n'est pas soulevé.

 Traitement des brûlures étendues à une grande surface de la peau; combustion des vêtements suivie de la cautérisation du tégument,

C'est une affreuse chose que de voir des femmes, de jeunes filles, parées pour les fêtes, passer auprès d'une bougie ou d'un brasier et trouver, dans une fraiche parure, un horrible appareil de torture et de mort.

Je ne rappellerai pas les catastrophes déplorables dont le triste tableau est présent à la mémoire de tous. Il est préférable d'indiquer les moyens de prévenir de tels malheurs et de dire ce que l'on peut faire pour y remédier autant que possible, que de placer ici des phrases inutiles.

3

le viceneme de contra. Marcol con marco i inne en not el legar, s'embanament avec me projector de des les games, ses unhes, aux marcolles contra, prolative une promocitimene mile, quavant partient nadie de venir aux marcolles de seles qui ses morces, à pose est dispe incrediere de miles converie et decerbes.

Cette incondemence rapide to past estatue compi se rappelerar que le composition d'une passire luinousmeternet dans le composition d'une passire luinousmepropre à rempiacer celle qui est lucace de suspèce, de charges et de soulve. Les fils de lin et de composement auni très-facilement informanièles.

La baine, au constraire, et même a sont, aum que toutes les autres substances aumanes, ne neuem qu'en se lour-souffant. Il faut beaucoup plus de temps pour les consumer, et la propagation de leur flamme est beaucoup plus leure que celle des tissus formes ever des végétairs. La conséquence furnée de cert est que tous les vétements qui sont plus exposés à l'actual du leu doivest, autant que possible, être formés de leine ou de soie.

Il parait que certaines préparations des molles les tendent très-difficiles à s'enflammer. Tous les vêu-ments dont il vient d'être parlé devraient être nioni apprétés :11.

<sup>(</sup>i) L'amidon dit incombustible 'rus Saru-Vincent-de-Paul at San et brite que leutement, et est deficiement inflammatile. Les quel ques expériences que Jai faites à ce sujet, sur diverses emilies partires de cette substance, qui devrait parteut remplacer l'amidon definire, ne me laissont pas de doute à cet égard.

Il est de toute évidence que la crinoline est la cause la plus ordinaire des accidents terribles dont il est ici question. Pour peu qu'une femme se baisse alors qu'elle porte cet immense panier renouvelé de modes surannées, il se relève en arrière et d'une telle façon qu'un brasier situé quelquefois à près d'un mètre de la femme alors qu'elle se tient debout, enslamme cet attirail de coquetterie qui devient un instrument de mort. Mais comment la raison parviendrait-elle à maintenir dans ses écarts le caprice de la mode? Comment persuader à nos dames que cette exagération ridicule des vêtements est moins gracieuse que les formes admirables de la nature? Ah! certes, la crainte même de périr brûlées n'arrêtera jamais la fantaisie des femmes et ne leur permettra d'écouter les conseils sévères de l'hygiène; mais, au moins, qu'elles évitent ces excès de dimensions qu'elles donnent à leur crinoline ; car le danger de celle-ci augmente à mesure que sa circonférence devient plus grande; qu'elles la choisissent à ressorts très-flexibles, car ceux qui sont très-sermes ne cèdent pas à la pression exercée sur eux; et il en résulte que les malheureuses qui en portent de semblables ne peuvent être secourues, alors que la flamme les entoure, et que sous cette grande cage toujours béante où l'air bénètre, le feu se propage et brûle les vêtements appliqués sur la peau, alors même que des bras énergiques pressent sur l'acier élastique qui ne cède pas! Que les crinolines soient donc faites en tissus de laine et jamais en coton, et otte le caprice cède un instant à la voix de la prudence!

## THUTEMENT DES VASTES SETURES

Pisos ici une remarque qu'il scrit bien tille de vigiser. C'est que, pour parvenir à éteindre la lame qui consume une crimoline, il ne faut pus cherter à presser sur celle-ci : les ressorts qui en forment à darpente s'opposeraient à son splatissement, et l'air t'en continuerait pas moins à alimenter le feu. C'est à une de cela que la flamme ne s'éteindrait pas même e, dus l'intention de l'étouffer, la malheureuse femme m roulait à terre. Une des principales ressources senit ici de saisir le bord de la crinoline et de détacher su d'arracher ce vêtement si dangereux. On ferait en même temps des tentatives pour se rendre maître du feu par la projection de l'éau. Il serait encore très-utile,

si l'ou en avait le temps et la possibité, de recouvrir la léte avec un drap mouillé. Pour se rendre maître du

feu, l'immobilité de la victime est indispensable.

Lorsque le feu, quels que soient son siège et son étendue, a envahi les téguments et causé des blestures, que convient-il de faire? Eh bien! c'est toujours de remplir les indications dont j'ai parlé à l'octasion des cas de lègères brûlures (p. 26); c'est donc de soustraire le calorique en excès par l'eau très-froide; c'est d'abriter les surfaces comburées contre le contact de l'air; c'est, plus tard, d'empêcher la putréfaction du pus qui rend l'absorption de ce liquide si dange-

Pour obtenir des résultats si désirables, le meilleur des moyens, à coup sur, est le diachylum étendu sur le taffetas ou appliqué directement sur la peau et recouvert de poudre de lycopode, ainsi qu'il a été dit précédemment (p. 21 et 23).

## 9. Influence fâcheuse de certains vêtements sur la peau.

Rien ne prédispose plus aux varices et à diverses dermopathies consécutives à celles-ci, que des liens serrés et portés au-dessus des mollets et même des genoux. Ces liens gênent le retour du sang et les veines se dilatent au-dessous d'eux. J'ai remédié fréquemment à des maladies de la peau, déterminées et entretenues par une semblable cause, en remplaçant la jarretière par un ruban qui fixait, ainsi qu'on le fait pour les enfants, le bas à la ceinture.

En général, il est d'une immense utilité que les vêtements exercent, sur les divers points du corps qu'ils recouvrent, une compression égale et légère; aussi, voyez ce qui arrive aux semmes dont la taille est serrée par une étroite ceinture : la peau de cette partie rougit, il survient une dermite superficielle et même de petits abcès, des taches rouges d'abord, puis bleuatres, qui se dissipent seulement alors que l'on a sait cesser la pression circulaire que le lien avait causée. Voici un remarquable exemple de l'instituence d'une compression inégale sur la production des maladies de la peau.

Un jeune malade de mon service, à la Pitié, portait habituellement des bretelles très-serrées. Or, il fut atteint d'une éruption de variole (variosi-dermite) médiocrement grave et, tandis que le tégument restait presque partout intact sur la poitrine, les points qui correpordaient aux bretelles étaiens le siège de boutons réceiques si confluents, qu'ils y dessinaient exactement la forme de ces liens.

M. Couches grainmenses, emplatres grainseux appliqués sur la penu.

la plupart des inflammations superficielles de la peut, telles que : érythèmes, engelures, brûlures au peut, telles que : érythèmes, engelures, brûlures au peut degré, etc., etc, sont singulièrement calmées, et souvent très-promptement guéries par l'application tes corps gras. Ce n'était pas sans utilité que les Romains et la plupart des peuples de l'antiquité se fainient pratiquer parfois, matin et soir, et ordinairement après le bain, des onctions avec l'huile d'olive. Cette huile réussit très-bien dans plusieurs dermopathies, ainsi que nous allons bientôt le dire; mais un mélange graisseux très-consistant, et plus utile encore dans des cas pareils, est celui-ci :

Faites sondre à une chaleur modérée et mieux au bainmarie; évitez surtout d'ajouter de l'eau à cette mixture.

Pour s'en servir, on échauffe légèrement le mélange ou on en gratte la surface, de façon à pouvoir l'étendre en couche épaisse sur les parties de la peau malade. Audessous de cet emplâtre graisseux, que l'on renouvelle plusieurs fois pur jour, très-ordinairement les érgsipèles palissent et sont arrêtés dans leur marche, les boutons de la petite vérole ne prennent pas de développement et les légères inflammations de la peau se guérissent.

Ce moyen si simple était celui que j'atilisais presque constamment avant que j'aie eu recours aux applications de diachylum lycopodé, dont il a été parlé (p. 17), et qui le remplace avantageusement. La malpropreté de la graisse qui fuse sur le tégument, la rancidité dont elle est susceptible, sa transparence qui permet l'action de la lumière, la facilité avec laquelle elle s'enlève au moindre frottement, ce qui force à en renouveler souvent les couches déposées, m'avaient depuis longtemps conduit à ajouter de la fécule pour en augmenter la consistance, ou du charbon pour la noircff; mais le diachylum lycopodé ne présente aucun des inconvénients qu'elle pouvait avoir, et réussit parfaitement, soit dans l'erysipèle (dermite périasique), soit dans l'eruption de la petite vérole (variosi-dermite) (p. 25).

L'emploi des moyens précédents est extrêmement utile dans les cas nombreux où l'on est incertain de savoir si une inflammation, une tumeur de la peau, reconnaissent ou non une cause interne ou virulente. Presque toutes les dermites simples, et dans lesquelles la peau n'est pas désorganisée ou dégénérée, se dissipent promptement sous l'influence de la médication précédente, tandis que celle-ci échoue alors qu'il s'agit d'une cause dite spécifique. Catte considération est de la plus haute importance.

## WHERE DE LA PEAU; WHITOU

Il mile de la variosi-derunite, il arrive parkés que in mil se former des croûtes épaisses, formées par du pa coccété (pyodermolithes), qui, prenant une appama conée, semblent végéter, tombent après un certin lang, et malbeureussement se renouvellent.

de trouve au-dessous d'elles une surface tumédies, une, granuleuse, saignante, une sorte de pustule lité, ségétant des sucs qui se dessèchent en recommutainsi les granulations végétantes. Il suffit, pour tuédier à ce mal, dont l'aspect est on ne peut plus lispacieux, de faire tognber la pyodermolithe concrétie de pus sur la peau) avec des cataplasmes; de touter la surface saignante avec la pierre infernale avec du téletas enduit d'une couche de diachylum.

II. Raicus de la peau causée par la desquamquion de l'épiderme ; ichtyose des auteurs.

Il est un état particulier des couches extérieures de la peau, dans lequel l'épiderme est extrémement rude, se fendille sous forme d'écailles, et qui a reçu le nom d'ichtyose, à cause de sa ressemblance avec le tégument de certains poissons.

Cette affection est ordinairement congénitale et tient à une organisation native à laquelle on ne peut remédier par des moyens hygiéniques ou pharmaceutiques. La rudesse de la surface cutanée, les productions furfuracées qui s'en détachent, sont, pour les personnes qui en sont atteintes, les sources d'inconvénients qui les désespèrent. Or, il est un moyen bien simple, non pas de faire dissiper l'ichtyose, mais bien de rendre trèsdouce la peau de ceux qui en sont affectés.

Appelé en consultation par l'un de mes chefs de clinique pour un jeune Grec dont la surface tégumentaire
présentait au plus haut degré la disposition ichtyosique, je pensai à faire sur les téguments, qui étaient
très-inégaux et très-âpres au toucher, des frictions réitérées avec la pierre judéenne (1), sorte de composition
qui use la barbe par une sorte de râpure, et qui rend
la peau extrêmement polie. Sous l'influence de cette
pratique, une très-grande proportion de lamelles épidermiques se détachèrent sous la forme de farine, et
la surface cutanée devint très-promptement aussi
douce qu'elle peut l'être chez un homme bien portant.

Sans doute que peu de jours après, l'inégalité, la rudesse du tégument a dù reparaître; mais il n'y avait plus qu'à réitérer les frictions avec la pierre dont il s'agit pour ramener la peau à une condition telle que son contact n'eût rien de pénible. En ayant donc pour le tégument frappé d'ichtyose les soins journaliers dont il vient d'être parlé, on fera dissiper la plupart des inconvénients attachés à cette insupportable circonstance d'organisation.

<sup>(4)</sup> On trouve cette pierre au n° 14 de la galerie Delorme. Elle ne me paraît être autre chose que de la pierre ponce très-finement pulvérisée, et dont la poussière (que l'on a colorée avec l'indigo) est réunie en masse au moyen de la gomme.

 Position élevée, compression de la peau congestionnée, enflammée ou saignante.

Dans un grand nombre de congestions, d'inflammations de la peau (dermémies, dermites), dans les hémorrhagies qui ont lieu par sa surface divisée ou ulcérée (dermorrhémies), dans les souffrances chroniques du tégument, suite de troubles dans la circulation veineuse, les moyens qui sont très-ordinairement utiles sont, d'une part, la position élevée, par rapport au reste du corps, des parties malades (1) ou de celles dont le sang coule, et de l'autre une compression circulaire pratiquée avec quelques petites pièces de linge et une bande roulée; c'est surtout pour les morsures de sangsues, pour les petites plaies superficielles, pour les varices ouvertes, que ces pratiques réussissent; mais lors de l'ouverture de petites artères sous-cutanées, dans les érvsipèles ét dans beaucoup d'autres dermopathies, elles sont encore très-utiles.

## 13. Maladies de la peau (dermopathies) considérées en particulier.

Pour remédier aux diverses affections de la peau, considérées en particulier, il est un grand nombre de moyens en apparence très-secondaires, et cependant d'une utilité extrème, dont je vais faire l'énumération, en suivant ici l'ordre topographique et en commencant par le cuir chevelu.

<sup>(1)</sup> Voyez mon mémoire sur l'influence de la pesanteur sur le cours un sang dans le procédé opératoire de la percussion médiate.

 Maladies du cuir chevelu. — Parasites, ulcerations, scrofules, écrouelles du cou.

Il est extrêmement utile de remédier aux excoriations de la peau qui recouvre le crâne, les oreilles, la face, etc., et de faire cesser l'action des causes qui peuvent y donner lieu. C'est précisément pour cela qu'il faut absolument détruire les acarus dont il a été déjà parlé (page 14). Ces parasites portent les enfants à se gratter, et, par suite, à se déchirer la peau; de petites ulcérations en sont souvent les suites; elles se couvrent de croûtes formées par du pus qui se dessèche. Toute excoriation du cuir chevelu sécrétant des liquides qui s'altèrent, quelque peu étendue qu'elle soit, peut devenir une voie d'introduction dans les vaisseaux lymphatiques pour des sucs altérés. De là résulte la tuméfaction des ganglions du cou, si improprement appelés glandes, et dont les engorgements ont été désignés ridiculement sous le nom de scrofules.

Quand, chroniquement, ces ganglions s'indurent, ils forment une sorte de chapelet au-dessous de la màchoire, et deviennent souvent le siège d'inflammations latentes et d'abcès à marche plus lente encore. Une fois ces premiers accidents produits, il s'en déclare une foule d'autres, et ce n'est pas une cause inconnue, ce ne sont pas des scrofules voyageant fantastiquement dans le corps de l'homme, qui président à la manifestation des ecrouelles. Laissons le bon peuple d'autrefois donner aux rois de France le privilège de remédier à un tel mal

THE PARTY IN THE PARTY IN RIMOSDIA DE LETE E ASSE TO BUT E BLOCK DE LETTER SE DE MANDE DE LETTER DE DOTTO IS INCHE & 2 PE ME & THROUGH PARTY STEPHENS & STATE OF PROPERTY AM I COME IS SOME POR IS MAIN HO toks on ever questiones consignations (increase intagrique es de la properté (L. 14 . institutes es min de la tide pour mears i m es suches supe-RUS: WORDER HIS DESIRES CONTROLLED CONTROLS FROM THE PROPERTY OF THE PARTY STATES AND ASSESSED. tir avec le d'activism igraquée : 22 . 14145 suit 15 picautions bien simples qui surveix pervendrair es organisments glaudinisties de pinnic empiremanes. ent du con, soit même d'entres peries du corpe l'i 🕿 ps jusqu'eux erroperes decreas das gournes. leigne, etc., autyreles le Campina procione de re-Bette, et actuellement fai sous les veux un jeune enlant dont la tête était couverie par une nomese mantie de croûtes dites teligneuses, et etiez serves a monde droite du cuir chevelu fui traise sans amenication ner la simple propreté et les cataplasmes, tabilis qu'en pen de jours l'autre moitié, pansée avec l'emparé arratinant saupoudré de lycopode, fut ramenée presque de suite à l'état de santé.

 Lieu sur lequel drévent être pratiquées les frontons dans les ens de ganglions du con enflammes.

Remarquons, à cette occasion, que si l'on veut renédier, par des frictions médicamentenses, à des engorgements ganglionnaires, il est absurde et antiphysiologique de les pratiquer sur la peau même qui recouvre
ces ganglions. En effet, les vaisseaux lymphatiques qui
naissent de cette portion de tégument ne s'étendent pas
aux prétendues glandes dont il s'agit, et ne peuvent,
en conséquence, y porter les substances actives que
l'on emploie; ils les charrient beaucoup plus loin. Tel qui
veut traiter les malades sans tenir compte des notions
anatomiques et physiologiques s'expose à commettre de
grossières erreurs.

C'est au contraire, sur les régions de la peau où les vaisseaux lymphatiques des ganglions malades ont leur origine, c'est-à-dire sur des parties où le mal primitif a eu son siège, que l'on doit chercher à faire pénetrer les médicaments destinés à agir contre les engorgements cervicaux.

Je crois être le premier qui, ayant fait cette remarque, ai suivi la pratique dont il s'agit, pratique qui a souvent été utile à mes malades. Se conformer actuellement à cette habitude routinière, qui consiste à faire des frictions médicamenteuses sur des ganglions engorgés, n'est en rien conforme aux lois de la physiològie éclairée par l'anatomie. Seulement, des pressions momentanées ou persistantes exécutées sur ces mêmes ganglions ont quelquefois de l'utilité.

### 16. Décollements de la peau, suites d'abcès sous-cutanés.

Ne cherchez pas, par des médicaments internes ou externes, par des applications de pommades variées, à pini les décollements de la peau, suites de la supparaim leute des ganglions engorgés du con: cesuoceus unient sans utilité aucune, car les parties malades prisentent alors de teiles conditions organiques, qu'elles te peuvent se cicatriser spontanément.

Des injections pratiquées au-dessous de cette pear unincie, avec de la teinture d'iode élendre de deux lois son poids d'eau, ainsi qu'une compression méthodique, suffisent en général pour guérir. S'il n'en arrive pas ainsi, c'est au chirurgien d'enlever, avec des ciseaux, les portions décollées du tégument, tandis que le médecin doit renoncer à administrer de prétendus spécifiques antiscrofuleux, qui n'ont, dans de tels cas, aucune efficacité. Il me serait facile de citer sur ce sujet des faits de guérison tout à fait remarquables et dans lesquels une infinité de médications variées avaient été depuis plusieurs années inutilement employées.

## 17. Boutons à la face [acné, viens, mentagre).

Un grand nombre de personnes sont sujettes à certaines dermites circonscrites, saillantes, de peu d'étendue, ayant une forme demi-sphérique, et qui, en général, ne tardent pas à être suivies de petits abcès; ceuxci s'ouvrent et laissent après eux des surfaces rouges de plusieurs millimètres de diamètre. On a donné le nom d'acné, de varus, à cette très désagréable affection qui paraît avoir pour siège les follicules pileux ou graisseux de la peau du visage, du menton ou même d'autres parties du corps. Ce mal se reproduit avec une déplo12

rable persistance, et l'on voit des gens en être atteints sur le front, la face, le menton surtout, et avec une telle confluence que les traits en sont déformés et que la peau est parsemée de ces boutons souvent recouverts de croûtes jaunâtres et dures. Il est trop vrai qu'ordinairement la plupart des médications échouent contre cette affection. Des moyens hygiéniques ont eu, chez plusieurs personnes qui m'ont consulté pour de semblables cas, une utilité marquée.

Souvent c'est sur les points où la barbe existe et où on la coupe avec le rasoir, après l'avoir ramollie par du savon, que les accidents dont il s'agit surviennent. Il y à lieu de croire que l'action alcaline de ce savon ; que le tranchant mal affilé du rasoir, sont pour beaucoup dans la manifestation de ces tumeurs inflammatoires de la peau (dermocélites). Rien ne m'a été plus utile, dans des cas semblables, que de faire pratiquer, immédiatement après que la barbe vient d'être faite, des onctions sur la partie rasée, avec la graisse consistante (page 33) l'huile d'amandes douces, ou même d'olives. On peut aussi employer, dans de tels cas, avec avantage, de la poudré de lycopode ou de riz, avec laquelle on saupoudre la surface du tégument.

Se servir d'un rasoir bien affilé, que dirige une main légère et adroite, ou encore couper la barbe avec des ciseaux très-plats, l'user avec la pierre ponce en poudre fine, enfin laisser croître sa barbe et ne pas blesser la peau par l'application de corps qui l'altèrent; telles sont les précautions vulgaires qui réussissent souvent

POCTOSS BC FRANT BY MS THE nia ici que des médicaments dançana et melin minux que les gens qui obcissent à la muine en à is perentions décorées du nom d'enjarient ne nonneu pas de recommander.

## 48. Donners du frant et des temps.

De petites turneurs enflammées, très-analogues aux modentes, sous le rapport de leur apparence et peuttire des éléments de la peau où elles out leur siège, se lédarent souvent au front et aux tempes. Il es est parmi elles qui sont causées et entreternes par le contict et le frottement des cheveux. Ces boutons résissent ressià un grand nombre d'applications locales, et le taffetas recouvert de diachylum, ou mierz le diachylum bropodé, aura dans ces cas une utilité marquée : mais un des movens qui m'ont ici le mieux réassi est de faire relever les cheveux de saçon à ce qu'ils cessent de tomber sur les téguments du front.

# 19 Gilets de fianelle, parasites caussa: diverses maindes de m

Des dermocélites analogues aux précédentes se manisestent très-fréquemment sur la peau du dos et de la poitrine, et donnent lieu parfois à des abces sous ou intra-cutanés ressemblant plus ou moins à des furondes. C'est souvent le frottement des téguments par un gilet de flanelle ou par des vétements plus ou moins rudes, qui donne lieu à ces éruptions, et il m'a suffi quelquesois de faire enlever le gilet de laine norté sur la

## BOUTONS DU FRONT DE CAUSE VIRULENTE

peau, ou de le faire doubler par un tissu très-doux au toucher, pour prévenir l'apparition de ces désagréables affections. C'est particulièrement chez les personnes dont le dos est arrondi et saillant, que les boutons dont il s'agit se déclarent, et l'un des meilleurs moyens à employer alors est de faire tenir le corps redressé, de façon à ce que les vêtements frottent la région dorsale avec moins de force. Chez les gens malpropres, les acari corparis et ceux du pubis (qui se propagent au loin chez les personnes dont le système pileux est très-développé,) occasionnent quelquefois des dermocélites pareilles, et, en détruisant ces insectes par les moyens qui ont déjà été indiqués, les boutons dont il s'agit se issipent promptement.

### 20. Boutons du front dus à des causes virulentes.

Trop souvent les dermocélites du front sont liées à une altération de sang due à une cause virulente, et alors, elles ne cèdent qu'à un traitement spécifique dont l'exposition ne rentre pas dans le plan de cet ouvrage.

 Maladies de la peau causées soit par les frottements des parties du tégument en contact, soit par l'action des poils récemment coupés.

N'oubliez jamais, quand il s'agit de remédier à quelques lésions existant entre deux parties en contact habituel (intertrigo des auteurs), de ne jamais couper ou raser les poils qui peuvent les couvrir, cela n'est utile que dans les cas où il faut y pratiquer quelque opération. Si l'on ne suit pas ce précep!c, il arrive, lorsque les poils repoussent, qu'ils forment des pointes piquantes, dont l'ensemble constitue une sorte de brosse qui, non-seulement cause, lors des frottements qu'exécutent les parties juxtaposées, une sensation pénible, mais encore donne lieu à des inflammations assez vives.

Ces considérations sont applicables aux aisselles, aux environs du fondement, et à la partie interne et supérieure des cuisses.

Si ces accidents avaient lieu, on pourrait y remédier avec la pierre judeenne (page 36), avec des compresses de linge fin et demi-usé, ou encore avec du diachylum recouvert de poudre de lycopode, etc., et l'on devrait surtout recommander de laisser repousser les poils si maladroitement coupés. Nous noterons quelques applications de ces faits lors de l'étude des petits procédés thérapiques applicables aux orifices des organes des sens.

 Maladies de la peau de l'ombilic. — Inconvénients des boutons de pantalon qui font saillie sur le nombril.

Plusieurs personnes m'ont consulté pour une douleur qu'elles éprouvaient dans la région ombilicale; à la suite d'un développement assez considérable du ventre, l'ombilic faisait une saillie assez prononcée, et l'on sentait une sorte de relâchement de la ligne blanche, sur un point où l'intestin venait se présenter; une hernie se formait; son inflammation et son obstruction pouvaient

## 46 MOYEN DE CONTENIR LES HERNIES OMBILICALES

devenir dangereuses au point de compromettre la vie. Je cherchai donc quel était le siège positif et la cause de la souffrance dont ces personnes se plaignaient; je constatai d'abord que cette douleur avait lieu au nombril, sur lequel venait à presser la ceinture du pantalon, et bientôt je m'aperçus avec quelque surprise que le bouton qui maintenait cette même ceinture avait été attaché en dedans par le tailleur, et qu'il formait un point de compression tranchant sur sa circonférence. Dans les mouvements d'allée et de venue qui avaient lieu, soit de haut en bas, soit d'un côté à l'autre, ce bouton devait nécessairement irriter les parties dont il vient d'être fait mention. Je sis placer en dehors le moyen d'attache dont il s'agit; il cessa de correspondre au nombril et la douleur se dissipa complétement. Une ceinture trop serrée, les cordons de robes ou de jupons, peuvent avoir chez les femmes les mêmes inconvénients; il est bon d'en être averti.

Dans des cas de ce genre, et alors que l'on veut éviter la compression de l'ombilic, il sussit de placer de chaque côté de cette partie et au-dessous de la ceinture une pelote mince et large, qui prévienne le contact du lien circulaire dont il s'agit avec l'ombilic faisant saillie.

### 23. Moyens très-simples de maintenir de petites hernies.

Un propriétaire de Reims, dont le ventre était trèsvolumineux, me consulta pour des accidents dont le tube digestif était le siège, et qui étaient suivis d'une névral-

## OFFICE POUR LA CURE DES RENIES

neintercostale s'élevant vers l'épaule gauche. Ce monseur était atteint d'un éraillement de la ligne blanche. situé près de la dépression ombilicale, et de la sortie par et éraillement d'une très-petite partie de l'intestin. Un landage très-pénible à supporter servait à contenir incomplètement cette hernie, tandis qu'il suffisait d'une pression très-faible avec le doigt pour empêcher le viscère k wrtir par la petite ouverture qui lui licrait passage. Or. e se ramollir un fragment de diachylum en magdaléon. je lui donnai la forme de la dépression ombilicale. et, lui conservant une hauteur un peu plus grande que celle-ci, je le consolidai dans la fossette dont il s'agit. de la manière suivante : une couche de diachylum fut anpliquée à chaud sur la peau qui recouvrait la dépression offerte par le nombril; par-dessus, je placai le fragment d'emplatre que j'avais façonné, et je recouvris le tout avec une pièce de taffetas noir enduite aussi de diachylum très-agglutinatif et dépassant de trois centimètres le pourtour de l'ombilic. La ceinture du pantalon, pressant sur la partie saillante de ce petit appareil. sustit pour contenir a dmirablement la hernie, ainsi que me l'affirma deux jours après le malade, qui était ravi de n'avoir plus à porter un bandage très-incommode. l'ai recueilli, depuis l'époque où j'ai vu ce malade. un grand nombre d'observation analogues.

24. Excision d'un fragment de peau lâche et amincie, pour contenir une hernie, pour remédier à une dilatation de veine et pour effacer des rides (1).

Il y a bien longtemps que j'ai soumis à l'un de mes honorables collègues, M. le professeur Malgaigne, de regrettable mémoire, une idée relative à la curation et surtout à la palliation des hernies inguinales et ombilicales, idée dont l'exécution ne lui parut pas avoir de chances de succès. Cette opinion, d'un homme qui a si bien étudié l'histoire de ces affections, m'a empêché jusqu'à présent de mettre en pratique ce que des faits, d'ailleurs remarquables, m'avaient conduit à supposer possible.

En effet, lorsque chez les gens dont la peau est amincie, très-extensible et làche, on en pince une partie, plus ou moins grande, entre les doigts et sur l'un des côtés de l'ouverture par laquelle s'échappe l'intestin; si l'on tend ainsi le tégument au-devant de cette même ouverture, il arrive que la hernie qui, un moment auparavant, sortait avec une facilité extrême, se trouve maintenue pendant tout le temps que le pincement de la peau a lieu.

Une chose du même genre est observée dans les cas de dilatation de veines existant chez les personnes dont la peau est relàchée. Les varices disparaissent, alors qu'une partie du tégument, située près d'elles, est assez

<sup>(4)</sup> Certes, il ne s'agit pas ici de petits moyens, mais bien d'opérations chirurgicales. Je ne mentionne ici ces opérations, que pour en faire connaître la possibilité et quelquefois l'utilité.

proce pour que la peau qui recouvre la veine malade sui lendue; des faits cent fois constatés dans mon hôpital, la rétraction du varicocèle lorsque la peau se refroidit, la manière dont on pourrait faire disparaître les rides en enlevant une petite portion de la peau des tempes, etc., etc., m'ont conduit à croire que l'on pour-nit contenir plus facilement les hernies et les empêcher de sortir aussi facilement en excisant ou en cauterisant une portion assez large de peau, non pas sur les ouertures où les hernies intestines s'échappent, mais aux dépens des téguments qui recouvrent les parties qui l'entourent. L'avenir seul permettra d'apprécier ce procédé à sa valeur réelle.

### Dermopathies du siège; soins à leur donner. — Extrême importance de ceux-ci.

Les moyens hygiéniques ou d'une application trèssimple dont il va être actuellement parlé, ont une telle importance qu'ils sont, dans bien des cas, suffisants pour conserver la vie des malades. Je veux parler de ceux que l'on peut utilement employer dans cette partie de la peau qui recouvre les régions du corps en contact avec les lits, et qui sont plus ou moins souillées par l'urine ou les fèces.

Longtemps on ne s'est guère occupé des dermopathies de la région sacrée (celle qui correspond à la partie postérieure du bassin) que d'une façon empirique et pour s'opposer tant bien que mal aux ulcérations et à la gangrène de cette partie. Il y a plus de 20 ans, je fis

1

voir que ces affections constituent une série d'états pathologiques qui se succèdent et qui commencent par des rougeurs, des ramollissements, des boutons inflammatoires, des ulcérations, et finissent par des gangrènes qui, s'étendant, se propageant dans les tissus situés au-dessous de la peau, causent d'affreux abcès, bientôt suivis de la résorption de sanie purulente et putride, de pyosepticémie et de mort.

Plusieurs de mes élèves ont fait de mes travaux sur cet important sujet l'objet de leur dissertation inaugurale (1).

Dans plusieurs de mes ouvrages, je suis revenu sur ce point de pathologie pratique. Je me borne à Indiquer ici les moyens très-simples à l'aide desquels on arrête presque toujours la marche de ces terribles dermopathies qui s'observent si fréquemment : soit dans les collections de symptômes dits sièvres typhoïdes ; soit dans les lesions de la moelle (myélopathies) suivies de paralysie des membres inférieurs; soit encore chez certains vieillards affaiblis; soit même dans tous les cas où les malades restent habituellement couchés sur le dos.

26. Moyens très-simples de faire que la région sacrée ne reste pas toujours en contact avec le lit.

Avant tout, on doit, autant que possible et tout en recommandant une extrême propreté, faire varier la

(1) M. le docteur Blanchet, chirurgien actuel des sourds-muets, M. le docteur Guichard et autres. M Chotomsky a fait aussi des dessins coloriés de cette éruption si dangereuse.

position du malade. Pour y parvenir, on a proposé beaucoup d'appareils dispendieux ou difficiles à mettre en pratique. En voici un des plus simples que, dans mon service à l'hôpital de la Charité, j'emploie avec le plus grand succès. Un lien est attaché à l'un des poignets : il doit être assez large pour ne pas blesser la peau. Ce lien se fixe à la barre du lit et maintient le corps couché sur le côté opposé au membre sur lequel la ligature est fixée. Dans cette position, le siège, loin de reposer sur les draps, est inévitablement relevé et ne reste en contact ni avec ces mêmes draps, ni avec les matières fétides dont ils sont salis; alors encore la pesanteur, la compression, les frottements n'influent pas sur cette partie de façon à aggraver les dermopathies dont elle est le siège. Bien entendu qu'alternativement on fait placer le patient sur l'un et l'autre côté, et même quelquefois sur le ventre; car, si l'on n'avait pas cette précaution, il se déclarerait à la hanche, devenue déclive, ce que l'on voulait éviter pour la région postérieure du corps.

### Fissures longitudinales de la région sacrée. — Leurs causes et leurs dangers.

Il est une variété des dermopathies de la région sacrée dont la gravité est extrême : je veux parler d'une fente linéaire qui quelquesois est assez prosonde pour parvenir jusqu'à l'os sacrum, et qui augmente à chaque mouvement de latéralité exécuté dans le lit par le bassin. Cette terrible lésion, dont la sorme allongée est singulière, est, comme je l'ai fait voir, le résultat d'une déchirure que des mains aussi inhabiles que bien intentionnées déterminent en tirant maladroitement sur les téguments des hanches, alors qu'il s'agit de retourner le malade. Dans ce cas, la peau, ramollie vers la région sacrée, cède à la traction exercée par l'aide inintelligent, qui, à son insu, blesse à mort le malheureux couché sur le lit de douleur.

Pour éviter un tel malheur, il faut, alors que l'on retourne le malade, avoir le soin de ramener en dedans la peau de la hanche et prendre un point d'appui, non pas sur cette enveloppe, mais bien sur les os du bassin. Cette petite précaution, si utile pour prévenir la grave déchirure dont il vient d'être parlé, l'est encore pour empêcher son extension.

## 28. Traitement des dermopathies de la région sacrée.

Si l'on veut empêcher la peau du siège d'être blessée par les frottements que les draps exercent sur elle, il convient de fixer entre ceux-ci et le corps du malade : soit une pièce de linge très-fin; soit un large morceau de peau blanche très-douce; soit tout autre corps membraneux analogue, et de recouvrir ces substances de poudre de lycopode.

On s'est servi dans la même intention d'un matelas de caoutchouc, gonsié par de l'air ou tumésé par de l'eau; les coussinets, creusés dans leur centre, dont l'usage est assez général, ont le très-grand inconvénient que, sous l'insluence de la déclivité et de la pres-

space is sometime.

les l'anserien de prévente les ampaires, le lelamaires, le remailléement des lécules à mire les de l'empêcher on de guiere les lleures à mire les de la minure graineure donné le série partique prévidennts pape 21 ; l'el en remare sons, dans des ces patris, à de la fémile et à du son. Célui-et à l'émper intervisions, lorsqu'il à agricult d'ubéculous probable de la peux qui remajorer la région sonse, de s'immer rate le régument et les parties sons-james, de tele sote que la peux se détacte, se route en quelque sorie tar ele-même par su face enterne, de liqui à auxneuer la gravité du mai.

Les emplaires les plus varies, la poudre de charbon on de quinquina, out été aussi employés dans l'autotion de remidier aux accidents dont il est ini question, et out en, en général, peu d'ellicacité. On se peut en dire outent des applications our la région sucrès de dachylem hympodé (page 26).

Depuis que j'ai découvert ce mode de pausement si utile, j'ai vu un assex grand nombre de maintes atleints à la peau du busain, de congestions, de ramellistements, de philographies, de boutons et même de petites ulcirations, et j'ai récouvert ces parties malades, dans une étendue correspondante à celle de ces lésions.

## 54 MOTENS DE REMÉDIER A LA GANGRÈNE

d'une couche de diachylum appliquée à chaud et recouverte de poudre de lycopode. Cet appareil a parfaitement tenu, il a protégé la peau : soit contre le contact de l'air, des draps, des corps inégaux ou fétides, soit contre les frottements; il a permis à des cicatrices de se former; il a arrêté le mal dans sa marche terrible, en sorte que ce procédé, en apparence de si peu d'importance, est devenu pratiquement l'un des plus utiles et des plus propres à conserver la vie des malades. En effet, bien que l'altération du sang dite septicémie soit pour beaucoup dans les nécrosies ou gangrènes qui se développent à la suite des dermocélites de la région sacrée, et tienne ainsi de la nature du charbon, il est impossible de nier que le contact des matières fétides qui s'échappent de l'anus et des voies urinaires soit une cause très-active de ces terribles accidents qui participent ainsi des caractères de la pustule maligne.

### 29. Moyens de prévenir la putréfaction des escarrhes.

Quant aux escarrhes, c'est-à-dire aux parties mortifiées qui succèdent aux différentes lésions dont it vient d'être parlé, si l'on veut empêcher que les produits putrides qui s'en écoulent empoisonnent le sang par pénétration dans les vaisseaux, il est évident qu'il faut conserver ces escarrhes, et il y a bien longtemps (et antérieurement à toutes les recherches que l'on a faites avec le coaltar, avec l'acide phénique qui en diffère si peu) que je me suis servi, pour arriver à ce résultat, des moyens les plus vulgaires, et qui ont produit le même estet que ce même coaltar. La phrase suivante, consigrée dans mon Traité de médecine pratique, suffira pour indiquer quels sont ces moyens. « Il faut dessé« cher, saler, alcooliser, tanner, créosoter, momissier « les tissus frappés de mort, empêcher ensin leur dé« composition, » et cela pour saire qu'ils n'empoisonnent pas le malade et que la nécrose ne s'étende pas.
(Traité de médecine pratique n° 4833, 7989).

### On doit éviter de faire saigner les parties vivantes et adhérentes aux escarrhes.

J'ai cité des cas nombreux de mon service dans lesquels d'épouvantables gangrènes, ayant envahi des parties considérables de la peau, et, par exemple, les téguments qui recouvrent le sacrum, le coccyx, les fesses, les organes génitaux externes de la femme, le haut des cuisses, etc., avaient été arrêtées dans leur marche progressive par l'emploi des moyens précédents. Ces tertibles nécrosies, grâce à la momification des parties mortifiées, n'avaient pas été suivies de septicémie et de la mort. ((Traité du diagnostic, Traité de médecine pratique, ibidem.)

Pour obtenir des résultats aussi heureux, il faut beaucoup de soins, d'attention, de persévérance, et, surtout, on ne doit exercer aucun tiraillement sur les tissus frappés de mort. Ces tiraillements produisent la déchirute des vaisseaux encore adhérents, et causent ainsi la pénétration des sucs putréfiés dans le sang veineux et, par suite, dans la circulation générale.

31 Gangrène sénile. — Traitement très-simple, mais très-utile. — Cas remarquables.

Il est une affection non moins grave que les précédentes, et pour laquelle on emploie, sans beaucoup de chance de succès, les médicaments les plus nombreux. tels que l'opium, le quinquina, etc.; or, la position du corps et des parties malades, secondée par l'action d'une chaleur modérée et par des frictions, est, dans ce cas, au contraire, d'une immense utilité. Je veux parler de la gangrène, dite sénile, qui attaque d'abord la peau et les autres parties constituantes des orteils, et s'étend successivement de proche en proche aux autres régions des membres inférieurs. Cette nécrosie, précédée d'une dermite stasique et de douleurs souvent atroces, reconnaît en général pour cause la gêne du cours du sang dans les artères, due à des concrétions calcaires dans les parois de ces vaisseaux (artériolithies), et parfois aussi à des obstacles au cours du sang dans les veines. Dans les cas d'artériolithies causant ces nécrosies, le sang arrive encore avec un certain degré d'énergie aux tissus qui menacent de se mortifier; mais l'impulsion qu'il reçoit n'est plus assez forte pour parvenir, à travers les capillaires, jusqu'aux veines; de là des stases phlébiques suivies de mortifications. Ces considérations, appuyées sur des faits recdeillis à la Salpêtrière et a la Pitié, m'ont conduit, dans un cas

recueilli chez M. Y..., près Châteaudun, à un résultat admirable : les orteils étaient le siége d'une phlegmasie rolacée et de refroidissement; les artères des membres inférieurs battaient très faiblement, et d'affreuses douleurs se faisaient sentir sur la partie malade et dans les ners sciatiques. Je fis élever les extrémités inférieures sur des coussins, et la rougeur violacée ainsi que la douleur, diminuèrent tout d'abord; on maintint les parties dans cette position et à une douce chaleur. Quelques doses de sulfate de quinine furent données à cause d'une tuméfaction remarquable de la rate et d'une périodicité marquée dans le paroxysme des douleurs; tout d'abord les accidents se dissipèrent, et le malade, qui était fort âgé, guérit si bien de son mal qu'il vécut encore plusieurs années.

 Durillons de la plante du pied caus's par des saillies de la semelle; cors aux pieds. — Traitement.

La moindre circonstance physique ou mécanique, vemant à agir d'une manière constante sur l'organisation, peut donner lieu à des résultats sâcheux et même trèsgraves. J'ai été consulté par des personnes qui éprouvaient la plus grande dissiculté à marcher, parce que toutes les sois qu'elles appuyaient le pied sur le sol, elles ressentaient une vive douleur sur l'un des points de la surface plantaire. C'était principalement au milieu de l'éminence qui correspond à l'extrémité postérieure de la première phalange du gros orteil, ou audessous du talon que cette soussrance avait lieu. Une fois même, le siège du mal était au milieu de la face inférieure de la dernière phalange de ce même orteil. Or, l'examen attentif du point où la douleur se déclarait me fit voir un épaississement considérable de l'épiderme endurci, qui faisait une saillie prononcée au dehors, et qui proéminait bien autrement encore en dedans. Je recherchai quelle pouvait être la cause d'une lésion circonscrite à un point si rétréci, et j'examinai la chaussure. Je trouvai bientôt la raison physique du mal dans la semelle sur laquelle le pied portait; le cordonnier avait laissé dans cette semelle un clou, un fragment de bois, ou une saillie considérable d'un cuir trèsdur, sur lesquels la surface plantaire s'appuyait alors que la marche avait lieu; de là l'épaississement de l'épiderme qui s'était produit, ainsi qu'il en arrive : pour la pulpe du doigt de l'artiste qui appuie sur la corde du violon ou de la basse; pour le talon serré dans un soulier étroit; pour les orteils emprisonnés dans une botte rétrécie, etc.

De telles lésions, si peu importantes en apparence, sont bien autrement graves qu'on ne le pense, et s'il est vrai, comme chacun le sait, que des cors aux pieds mal soignés ont été suivis d'ulcérations, d'abcès, de carie ayant nécessité plus tard l'amputation d'orteils, etc., tout me porte à croire que l'épaississement de l'épiderme à la plante du pied, non-seulement gêne la marche et fait souffrir, mais encore est susceptible de produire la dangereuse affection à laquelle on a donné le nom d'ulcère perforant du pied (1).

(1) Voyez l'avant-propos.

Les moyens de prévenir et de guérir les lésions précédentes sont presque complétement hygiéniques; ils peuvent se résumer ainsi:

- 1º Faire rentrer dans le cuir les clous, les chevilles, les saillies des semelles qui correspondent aux points du pied où existe le mal, et faire pratiquer dans la chaussure, à la place qu'ils occupaient, une légère dépression où puisse se loger l'épiderme épaissi.
- 2º Faire confectionner des formes pour la chaussure qui représentent d'une manière outrée les saillies que le pied présente au niveau des orteils, de façon à ce qu'en mouillant le cuir de la botte ou du soulier sur ces formes, le cuir, en se desséchant, conserve la disposition du bois et offre une dépression dans laquelle le cor, les durillons, les tumeurs dites oignons puissent être logés à l'aise.
- 3° Éviter, surtout, les chaussures très-étroites ou encore celles qui sont trop larges, dans lesquelles le pied vacille et vient frapper à chaque instant sur la surface du cuir.
- 4º Placer autour de la saillie épidermique (cors, durillons, oignons, etc.) une rondelle composée de plusieurs couches de taffetas enduit de diachylum, placées au-dessus les unes des autres et percées au centre d'un trou circulaire dans lequel se trouve engagée la production épidermique, et cela d'une manière assez profonde pour que la pression de la chaussure s'exerce sur la rondelle et non pas sur le point malade.
  - 5° Il faut couper (avec un instrument bien affilé et

propre) en couches très-minces, la masse d'épiderme endurcie, et en enlever davantage au centre que vers la circonférence, de façon, encore, à ce que les points les plus douloureux du mal étant plus évidés que les alentours, ces points cessent de pouvoir être comprimés.

Ces moyens si simples suffisent presque toujours pour remédier aux cors, aux oignons, etc., et sont bien préférables à toutes les méthodes dangereuses qu'emploient d'ordinaire, dans des cas pareils, tant de gens qui s'intitulent pédicures.

33. Maladies de la peau et des jointures du gros orteil causées par des plis de la chaussure et simulant la goutte aux pieds.

Les accidents symptomatiques, initiaux ou même caractéristiques de l'affection désignée sous le nom de goutte (oxurémie), consistent, comme on le sait généralement, en une inflammation aiguë de la peau et du tissu cellulaire qui recouvre et entoure l'articulation de la première phalange du gros orteil avcc le premier os métatarsien. C'est dans cette jointure, que, lors de la marche, se passent les grands mouvements du pied, et il en résulte que l'empeigne des chaussures, sur le point qui correspond au centre de ces mouvements, est sans cesse tantôt fléchie et tantôt redressée, de façon à former un pli dont la saillie est en dedans et la dépression en dehors. C'est précisément sur l'endroit où l'articulation se trouve, que cette saillie vient presser, et si le cuir de l'empeigne est très-dur, il arrive que la peau et même la jointure sont blessées et s'enflamment.

li homme, robuste et sobre, jouissint d'une bonne sule, qui n'avait pas eu d'attaque de goutte, et doat per et la mère n'avaient jamais été atteints de cette ilection, ni de gravelle, me consulta fort inquiet qu'il itali, alors qu'il fut pris d'une douleur avec rougeur tire, chaleur brûlante et tuméfaction considérable de it partie du pied dont je viens de parler. Constatant l'absence des circonstances générales sous l'influence desquelles se manifeste ordinairement l'oxurémie (excès l'acide urique dans le sang, diathèse goutteuse) (1), je therchai avant tout, suivant mon habitude, si quelque caux materielle n'avait pas donne lieu à ce phénomène local, et j'examinai avec soin la botte du patient. Le mir en était très-épais et très-consistant, et précisément sur la partie qui correspondait au point le plus douloureux, je vis que le pli que j'ai signale était profond et que sa saillie interne se trouvait très-prononcée. Lorsque M. X..., était chaussé et qu'il marchait, le pli se dessinait plus fortement encore, la saillie intérieure devenait considérable, et, alors, la douleur était on ne peut plus vive ; la pression extérieure occasionnait une souffrance beaucoup plus aigue au niveau du pli du cuir que partout ailleurs. Depuis huit jours, le mal augmentait sans cesse. Ma diagnose fut qu'il ne s'agissait pas d'une attaque de goutte, mais bien d'une simple lésion de cause extérieure. Je sis couper la botte sur ce point; à la place du cuir un morceau de taffetas noir

<sup>(1)</sup> Traité de Médecine pralique par M. Piorry, article Agréssie, 1. III.—Traité de la goutte, par M. le docteur Galtier-Boissière.

fut placé; le lendemain le mal fut calmé; le second jour il n'existait plus. M. X..., porta ensuite et pendant quelque temps des bottes en chevreau. Le mal récidiva trois ans après, et alors encore, la même cause avait déterminé le même effet, et, tout d'abord, la même précaution hygiénique remédia aux accidents. Depuis cinq ans, M. X..., ne porte plus que des bottines trèsmolles et très-flexibles, et le mal n'a pas reparu.

Cette observation doit démontrer aux diathésimanes, qu'avant d'admettre l'action de causes internes présumées, il faut d'abord bien constater qu'il n'existe pas certaines circonstances locales qui causent et entretiennent les lésions.

### 84. Engelures.

La dermite, d'abord aiguë, puis chronique, causée par le froid, et surtout par le froid humide, à laquelle on a donné le nom d'engelures, et que l'on aurait tout aussi convenablement appelée rhumatisme que les douleurs musculaires qui sont désignées par ce nom, puisque, suivant les auteurs, ce sont les mêmes circonstances qui leur donnent naissance; les engelures, dis-je, ne sont, en général, guéries ou même palliées que si l'on évite l'action des causes : froid et humidité. Les cataplasmes, les bains locaux, l'application de la neige, de la glace, les ablutions avec le vin, l'alcool, les médicaments dits astringents, les pansements avec le cérat, etc., échouent presque toujours. Or, un grand nombre de raisons, fondées sur l'analogie, me portent

## PANARIS OU DACTYLITES

à penser que l'emplatre de diachylum, applique sur les doigts enstammés par le froid, et recouvert d'une touche pulvérulente, telle que celle de lycopode, de riz, etc. (p. 22), abritant les parties malades contre le froid, l'humidité, l'air, les corps extérieurs; maintenant une humidité tiède sur la peau, se prétant aux mouvements des parties, serait très-utile pour la curation des engelures. Cette application aurait, sans doute, les plus grands avantages, et cela, soit qu'il s'agisse de calmer les engelures enstammées, soit qu'il faille favoriser la cicatrisation des ulcères qui en sont les conséquences.

# 35. Panaris (dactylites).

Des considérations du même geure sont applicables aux dactylites, dites panaris, et surtout à celles qui enlourent l'ongle (dactylites périonyxiques), et auquelles le vulgaire, et même les médecins, donnent l'absurde nom de touraiole.

Cette tourniole, dont les suites sont souvent si graves, et telles qu'elles entraînent parfois la chute de l'ongle, la carie de la dernière phalange, des abcès dans la gaine des tendons, est très-ordinairement causée par l'éraillement, le décollement, la saillie de petits lambeaux épidermiques, qui souvent existent sur la face convexe de l'extrémité du doigt. Ces productions étant sans cesse touchées et détachées des parties sous-jacentes, non-seulement provoquent de la douleur, mais encore déterminent des inflammations plus ou moins

64

vives de la peau qui entoure l'ongle. Or, on remédie très-bien aux échardes, aux douleurs et aux accidents qu'ils causent, d'abord en les coupant très-près, puis en recouvrant leur base avec une couche de diachylum lycopodé.

### 36. Ongle rentré dans les chairs.

L'ongle rentré dans les chairs, affection légère en apparence, résiste si bien aux méthodes chirurgicales par lesquelles on la combat, que l'on emploie contre cet état pathologique les moyens les plus graves et parfois les plus dangereux; il m'est arrivé deux fois de guérir ce mal par des procédés bien simples. - Une des indications principales est d'empêcher toute compression sur la partie externe du gros orteil, de façon à ce que la peau qui tend à le recouvrir de plus en plus, ne se trouve plus pressée de dehors en dedans. Eh bien, dans ce cas : faisant pratiquer encore sur le point qui y correspond une large ouverture à la chaussure; cautérisant fréquemment sous l'ongle avec l'azotate d'argent; pansant avec le taffetas enduit d'emplatre diachylum; maintenant la partie malade dans un état de propreté minutieuse; j'ai vu en quelques semaines les accidents que cause l'ongle rentré dans les chairs se dissiper complétement.

#### 37. Abcès sous l'ongle.

Pour terminer ce que j'avais à dire sur la curation, par des moyens simples et hygiéniques des dermites, considérées en général et en particulier, je n'ai plus qu'à dire un mot de la manière d'ouvrir les petits abcès qui se forment sous les ongles, et, cela, soit spontanément, soit sous l'influence d'un corps étranger, aiguille, éclat de bois, etc., etc. C'est à un de mes collègues de l'Académie, M. Hervez de Chégoin, que je suis redevable de la connaissance de ce procédé, qui est, en général, peu connu; il ne faut pas ouvrir cet abcès avec le bistouri : il suffit de râper peu à peu l'ongle, sur le point où cet abcès se voit, avec un corps tranchant et bien affilé, pour arriver jusqu'au pus et pour l'évacuer.

# CHAPITRE II

# MOYENS SIMPLES ET UTILES DANS LES MALADIES DES YRUX

J'ai étudié, dans le chapitre qui précède, l'action thérapeutique qu'exercent sur les dermopathies quelques moyens, en quelque sorte, vulgaires, d'un emploi facile et qui ont souvent plus d'efficacité que des traitements en apparence plus actifs, mais, en réalité, moins utiles. Je vais, actuellement, parler des médications rèssimples que l'on peut employer sans danger et souvent avec succès contre certaines omr sopatimies et quelques otopathies, c'est à-dire contre livers es ffections des yeux et des oreilles.

### 38. Petits corp setra ngers e ntre les paupières et l'œil.

Et d'abord, il arrive souvent que de petits corps étrangers, difficiles à apercevoir et que l'on extrait encore avec plus ce pei ne, s'introduisent entre les paupières, blessent la conjonctive, et deviennent une source de douleurs et d'accidents plus ou moins graves. On a proposé, pour enlever, ou au moins pour dépla-

a a corps. qui remoure querie les inc nu la paupière supérieure d'une peute manunu qui de soul pas saus maine. Le provide surrant n'i réassi le plus servent : on s'esser lien, per me home pression. On priest sie is mouteure as mus vivepuis on porte tout à fait en déclars à paupaire descrimes, qui d'ailleurs est très-mains; at appaie sous sur l'œil à travers ce veule muscuis-mentirement fu le fait de façon à ce qui aucun corps de sueigne vianne ne puisse passer sur le point compenné entre l'en e le repli qui le recouvre. Alors on tire per à per et designe le paupière, et presque toujours, suit de premier comsoit à une seconde ou a une trasseme resense, le carre étranger déplacé est rejoire vers le grain aine de fæil, et cesse complétement de traiser des ducleurs un une congestion inflammatoire.

Un autre procédé, non moins utile deus le cas où un corpuscule s'est introduit au-dessous de la pampière supérieure, consiste à la soulever, puis à la tirer en bas au-devant de l'inférieure; alors les cits de pelle-zi forment une sorte de pinceau qui, balayant de haut en bas la conjonctive qui revêt en dedans la pampière supérieure, enlève ainsi le corps étranger.

### Informations légères de l'œil. — Opiritalimes or commins ilgères. — Utilite du suifaie de nue.

Les ommites ou ophthalmies légeres, survoit selles auxquelles donnent lieu les exces d'études et les veilles, commites qui déterminent une pénible démanges.

vers cette partie de l'angle interne de l'œil que l'on appelle caroncule lacrymale, se dissipent très-promptement et souvent en vingt-quatre heures, par l'introduction entre les paupières d'un fragment très-petit de pommade dite de Lyon, ou mieux encore d'une goutte d'un mélange composé de 5 centigrammes de sulfate de zinc, de 25 grammes d'eau très-pure (ou mieux d'eau distillée), et d'une très-petite proportion d'eau de roses (dont on peut se passer). Pour introduire cette eau, la tête du malade est renversée en arrière, les paupières sont écartées par un aide, et on laisse tomber une goutte du liquide, s'écoulant d'un cure-dents ou d'une plume qui y a été trempée.

#### Compression et injections dans l'ophthalmie grave avec œdème inflammatoire des paupières.

Dans la très-grave épidémie d'ommite ou d'ophthalmie qui, à la suite du choléra, a régné en 1832, parmi les orphelins de la maison de refuge, et dont j'ai publié l'histoire dans ma clinique de la Pitié, il se déclarait une tuméfaction considérable, inflammatoire et cedémateuse des paupières. Entre celles-ci et le globe de l'œil avait lieu un écoulement puriforme abondant que sécrétait la membrane conjonctive couverte de granulations; les paupières restaient closes, et au-dessous d'elles, les ulcérations de la cornée transparente se déclaraient, et même souvent l'œil se perforait et se vidait. Le mal était contagieux, et le pus qui s'en écoulait communiqua cette terrible affection à l'une des

sœurs du service. Les faits conduisirent à admettre que cette affreuse ommite avait été causée par des miasmes produits et dégagés à la suite de l'encombrement d'un grand nombre d'enfants dans un espace étroit. Or, tous les moyens généraux et locaux : sangsues, purgatifs, lotions, azotate d'argent, sulfate de zinc, etc., échouèrent, et les seules médications qui furent vraiment utiles se bornèrent aux plus simples et en même temps aux plus rationnelles, je veux dire : à des soins de propreté, à l'aération, à des injections fréquentes d'eau pure entre l'œil et les paupières, et à la compression de la tumeur formée par celles-ci, au moyen de ouate placée sur l'œil, et maintenue par un bandage roulé.

Les injections avec l'eau distillée et tiède, très-fréquemment réitérées entre le globe oculaire et la paupière, sont essentiellement utiles et doivent être toujours employées dans toute ophthalmite, alors que du pus, contagieux ou non, s'accumule au-dessous des paupières. S'il arrive, en effet, qu'on laisse séjourner ce liquide dans un tel lieu, il s'altère, devient septique, blesse, congestionne et ulcère la conjonctive, et peut causer des kératelcosies (ulcération de la cornée), des taies (akérato diaphanies) et la perte de l'œil.

# 41. Œdème ou hydrethmie des paupières causée par une lunette dite pince-nez.

L'œdème non inflammatoire des paupières (hydrethmie blépharique) est assez rarement observé. Dans un cas particulier, c'est par une simple précaution hygié-

### 70 LUNETTES CAUSANT L'OEDEME DES PAUPIÈRES

nique que j'y ai remédié, tandis que les médicaments actifs les plus variés n'avaient en rien réussi. La raison de ces résultats si différents était que, dans cette dernière médication, la cause anatomique du mal demeurait inconnue et que l'on avait pu la constater dans la première. Voici l'abrégé de ce fait :

Un créole, àgé de cinquante ans, fut atteint d'un gonflement considérable des deux paupières; de chaque côté, le pourtour des orbites ainsi que la partie supérieure du nez participaient à la tuméfaction, due évidemment à une collection sereuse et non inflammatoire, survenue dans le tissu cellulaire de ces parties. On avait eu recours avant moi à des purgatifs, à des diurétiques, à divers médicaments qui n'avaient produit aucune amélioration dans les symptômes observés.

J'examinai successivement les reins et l'urine, le cœur, le foie, la rate: nulle part je ne pus constater de lésions susceptibles de donner lieu à l'œdème ou hydropisie générale (je laisse, bien entendu, à des médecins fantaisistes l'admission d'une cachexie œdémateuse ou hydropique). Faisant grand cas des travaux de Ribes; de Magendie, de Bouillaud, et ayant souvenir de plusieurs faits remarquables observés par moi, dans lesquels des hydropisies consécutives avaient été les suites d'oblitérations veineuses, j'appelai l'anatomie à mon aide; je me rappelai que les veines de la région dorsale du nez (veines nasales) rapportent le sang et la sérosité des paupières et de la peau de la région rhi-

nique dans la circulation générale, et je remarquai en même temps que le malade portait une lunette pince-nez dont le ressort était très-serré. Au-dessus dulieu sur lequel portait cette lunette, les veines nasales étaient distendues; au-dessous elles étaient vides. Il était naturel de penser que la compression de ces vaisseaux déterminait le mal.

Je fis ôter les lunettes; le soir il n'y avait plus d'œdème. On les replaça le lendemain, tout d'abord l'enfure reparut; et, à quatre reprises, l'hydropisie cessa on se manifesta; suivant que le pince-nez n'était plus en place ou y était remis. La relation de la cause à l'effet étant évidente, la guérison radicale suivit le conseil que je ne manquai pas de donner d'éviter toute compression ultérieure des veines nasales par le pince-nez. On ne saurait croire combien il est utile dans les inflammations, dans les hydropisies générales ou partielles, de tenir compte de l'état des branches et des troncs veineux qui ramènent le sang des parties malades.

#### 42. Tumenr lacrymale, compression préventive.

La tumeur qui se forme quelquesois au-dessous de l'angle interne de l'œil, près du nez, et qui est due à la rétention et à l'accumulation des larmes dans leur réservoir (appelé sac lacrymal), tumeur à laquelle j'ai donné le nom de cystodycrasie, est presque toujours suivie de l'inflammation, du ramollissement et de la persoration de la cystodycre (sac des larmes), persor

ration qui constitue la fistule lacrymale. Cette lésion est difficile à guérir, et on peut, dans quelques cas, ainsi que cela m'est arrivé trois fois, la prévenir par le procédé suivant:

Un doigt est porté sur les canaux et les points lacrymaux situés à la face interne du rebord libre des paupières, près de l'angle interne de l'œil, de manière à empêcher tout reflux des larmes de ce côté; en même temps, on presse sur la tumeur, de haut en bas et dans la direction du canal nasai situé près du nez. Par cette manœuvre, on cherche à surmonter l'obstacle qui s'oppose à la sortie facile des larmes par son conduit d'excrétion. En continuant pendant quelque temps cette manœuvre, en pressant avec un certain degré de force, en renouvelant ce moyen tous les jours pendant plusieurs semaines, et en le faisant surtout lorsque la tumeur est très-pleine de liquides, on obtient des succès inespérés. Éviter une opération au moyen de médications simples, doit être le but de tout médecin consciencieux, et les faits m'ont prouvé que le mode de curation précédent peut quelquesois sussire pour remédier à la tumeur lacrymale.

Dans un cas où, chaque matin, existait une tumeur lacrymale, je suis parvenu à faire dissiper celle. ci en faisant fermer la bouche par la contraction des lèvres, et les narines avec les doigts, et en faisant pratiquer une inspiration forcée. Le vide pratiqué dans la poitrine a eu pour résultat, dans ce cas, l'aspiration par

# VILLERS DES PAIRES

le cami mont des incomes accompanies fons in sum mont obstrat cu rétrési.

II. Reprochament et occionient den promième per des manueurs applicientives; ununcaque de un promiée. Montere remongantes et

Il est un appareil on ne peut plus simple, mais à me extrême utilité, qui, dans plusieurs affections des yens, n'a donné des résultats tres-evantageurs. Je veux pur-ler des handelettes de taffetas irisépiculé, dis l'ange-terre, ou, encore, de taffetas reninis d'un course mucre de diachylum extrémement aggiutinaté, appliquees sur les poupières, de façon à les empécher de s'écurier et a maintenir l'occlusion de l'eril.

Voici comment on emploie ce majon: en decampe trois de ces bandelettes de faças: a leur danner manne à cinq centumètres de long sur un demi-centumente de large; on recommande au malade de fermer res-estacement l'œil par le rapprochement des pasqueres, et aines on applique les bandelettes à un demi-centimente l'une de l'autre, de façon à ce qu'une moitié de ces peuts appareils soit fixée sur la paupière supérieure, saufis que l'autre est adhérente à l'inférieure. S'il s'agit de méfetas ichtyocollé, on humecte parfaisement competentant de l'appliquer, et on le luisse se dessecter campetement pour eviter que les paupières s'ecurtent, car, saus cette précaution, elles ne manqueraient pas de le faire, et alors l'oblitération de l'œil n'aurait pas less.

<sup>(1)</sup> Traité de Médecine pratique, t. VIII. > 11:45.

Si l'on emploie le taffetas recouvert de diachylum, on le place de la même manière et l'occlusion s'opère de suite.

Dans ce dernier procédé il arrive trop souvent que la chaleur de l'œil fait fondre l'emplatre et que les paupières ne restent pas fermées.

Par l'occlusion de l'œil on obtient les avantages suivants:

- 4. On évite à la surface oculaire le contact de l'air;
- 2º On prévient celui de la lumière;
- 3° On empêche le clignotement, c'est-à-dire le mouvement instinctif des paupières, qui fait que les surfaces de la conjonctive ou de la cornée, divisées ou enflammées, soient lésées par un frôlement continuel ou réitéré;
- 4° On prévient les alternatives de température et surtout l'influence des courants d'air froid, si redoutés par les malades;
- 5° On force l'œil à ne pas agir, à se reposer, et chacun sait que, dans un grand nombre de cas, suspendre l'action d'un organe est un moyen puissant pour guérir ses maladies:
- 6° On retient les larmes entre les paupières et l'œil, de manière à ce que l'air ne dessèche pas la surface oculaire, et à maintenir celle-ci dans une humidité tiède propre à remplacer avantageusement les cataplasmes;
- 7° On ne se trouve plus dans la nécessité d'appliquer sur les paupières, alors que l'on veut en maintenir l'oc-



# OCCLESION DES PARPIÈRES

chion, les appareils pesants qui, lois de remédier aux ophhalmies, ne font qu'en augmenter l'intensité.

Les nombreux avantages expliquent du reste l'atilité entine que, dans des cas variés de maladies des yeu, présente l'occlusion des paupières par le procédé dont il vient d'être parlé.

M. Galest pas en Angletorre, mais à Paris, que l'on a imaginé et employé d'abord. l'occlusion des puspières.

On n'excusera, j'espère, si je rappelle ici que j'ai le prenier mis en usage la méthode dont il s'agit. C'est vers 1838, dans un temps où l'émeute régnaît à Paris, que, dirigé par des idées physiologiques sur les mouvements des paupières, sur les effets du frottement des deux lames de la conjonctive entre elles et sur les fonctions de l'œil; c'est vers 1838, dis-je, que dans un cas d'ommite qui avait résisté à divers traitements, j'appliquai pour la première fois des bandelettes de taffetas ichtyocollé. Le succès de l'occlusion fut tel, ici, qu'en vingt-quatre heures le mal était guéri. Ce fait doit avoir été consigné dans la Gazette des Hôpitaux d'alors, et, depuis, j'ai employé très-fréquemment et presque toujours avec avantage, dans les maladies de l'œil, l'occlusion des paupières.

On a dit que cette méthode avait été d'abord pratiquée

<sup>45.</sup> Cas principaux dans lesquels l'occlusion des panpières est utile : plaies de la conjonctive, corps étrangers; plaies de la cornée; opération de la cataracte; inflammation de l'iris et des parties profondes de l'œil.

76 PLAIE DE LA CORNÉE; OCCLUSION DES PAUPIÈRES cn Angleterre. Il y a peu de temps, j'ai revendiqué, devant l'Académie, la priorité de cette médication, et je crois que cette priorité ne peut plus m'être contestée. Voici les principaux cas dans lesquels j'ai eu recours au traitement par l'occlusion des paupières.

10 Dans des plaies superficielles de la conjonctive oculaire et même de la cornée.

Un maçon, qui travaillait à une maison où je faisais faire des réparations, reçut, en martelant, un éclat de pierre qui divisa superficiellement et le kérate (cornée transparente) et la partie voisine de la conjonctive; la petite blessure, ou, si l'on veut, l'éraillure, avait huit ou neuf millimètres d'étendue; la douleur, la photophobie, le larmoiement, étaient extrêmes. J'appliquai sur-lechamp les bandelettes ichtyocollées; l'occlusion fut trèsexacte et la guérison eut lieu d'une manière si rapide, que, le surlendemain, le blessé put reprendre ses travaux.

- 2º Dans les cas où de petits corps étrangers s'engagent entre l'œil et les paupières et lorsqu'on n'est pas parvenu à les enlever par les moyens ordinaires (page 66); lors de l'occlusion palpébrale, ces petits corps se fixent sur le point où ils se trouvent; ils ne se déplacent plus et dès lors, cessant de blesser l'œil, ils ne causent plus de douleur. Le lendemain, ils sont éliminés sans que l'on s'en aperçoive,
- 3º Dans la plaie de la cornée que nécessite l'opération de la cataracte par extraction, dans les piqures faites pour l'abaissement ou le broiement du cristallin,

OPRIBALMIES (OMMITES) OCCLUSION DES OREILLES 77 l'appareil occlusif avec les bandelettes agglutinatives est infiniment préférable aux tampons de charpie ou de ceton, et aux bandeaux dont on couvre l'æil des opérés.

4° Dans un très-grand nombre de cas d'ophthalmies légères, surtout alors que la cornée s'altère et qu'il y a photophobie, les bandelettes noires recouvrant l'œil et prévenant l'action de la lumière, etc., ont, sous ce rapport, une très-grande utilité.

so Il en a été ainsi dans des inflammations de l'iris ou irisites, et j'ai été assez heureux, dans un grand nombre de cas, pour avoir vu une affection aussi sérieuse que celle-là, et qui résiste parfois si obstinément aux applications de sangsues, aux vésicatoires, aux onctions mercurielles, etc., etc., se dissiper complétement sous la simple influence de l'occlusion des paupières. J'avais naguère sous les yeux le jeune enfant d'un de mes anciens élèves et amis, M. le docteur Paréja, de Xérès, qui vient d'être débarrassé de cette façon, et en trois jours, d'une irisite fort grave.

Nous verrons bientôt que ce ne sont pas là les seules maladies des yeux qui se trouvent améliorées ou guéries par l'emploi de l'appareil occlusif des paupières.

 Migraine ophthalmique (névropallie prosasique de l'iris). — Demicercle oscillant et lumineux.

Il est une affection de l'appareil de la vision, et trèsprobablement de l'iris, qui constitue l'espèce de migraine la plus fréquente; je veux parler d'une névropathie ou névropallie (vibration morbide du ners), ayant l'œil pour siège, et dans laquelle la personne qui en est atteinte voit, au début, une espèce de tacke dans l'espace; cette tache est bientôt entourée d'un demi-cercle phosphorescent en zigzag, dont la teinte est bleuâtre ou de coloration irisée, et qui, assez analogue à la lumière électrique, pâlit à mesure que ce demi-cercle qu'elle forme devient plus large. D'abord celui-ci n'a guère qu'un très-petit diamètre, 'et alors son éclat est plus vif, puis il s'élargit sensiblement, et après un quart d'heure ou une demi-heure, il disparaît complétement. Alors la vue reprend toute la netteté qu'elle avait perdue. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette image que l'on voit tout aussi bien dans les ténèbres qu'au grand jour, c'est qu'elle suit les mouvements du globe de l'œil. Cette même image se borne, dans les cas légers, à des lueurs scintillantes. Ce sont des oscillations, des vibrations continuelles, qui ont lieu et qui persistent depuis le début jusqu'au plus fort de ce trouble de la vision. Deux ou trois minutes après que le cercle lumineux a disparu, se prononce, dans le globe de l'œil malade, à l'angle interne de l'orbite et sur le point qui correspond à la branche frontale du pentanèvre (nerf de la cinquième paire), une douleur interne, des élancements semblables à la souffrance que produiraient des coupsde marteau et se manifestant à des intervalles rapprochés avec une grande intensité. Quelques instants après, le malade éprouve des nausées souvent portées jusqu'aux vomissements, et des douleurs de tête, des éructations, des accidents variés du côté de l'estomac, accidents qui se succèdent ainsi pendant vingt-quatre ou trente-six heures et se dissipent fréquemment alors que survient un sommeil profond et pégible.

Pendant toute la durée de ces phénomènes, il n'y a pes de fièvre.

On a donné parfois à telle ou telle maladie le nom de celui qui, le premier, l'a décrite; ainsi en a-t-il été pour le mal de *Pott*, de *Bright*, etc.

Grammaticalement, n'en déplaise à un ancien professeur de rhéthorique, cette appellation (maladie de X...) semblerait faire croire que ces auteurs avaien été atteints eux-mêmes des symptômes qu'ils avaient décrits.

Malheureusement, je suis assez victime de l'affection dont il vient d'être parlé, et que j'ai le premier signale pour qu'on pût la désigner par mon nom, si n'était qu'il est absurde de se servir du nom d'un homme pour désigner des lésions qui ne doivent être rappelées à l'esprit que par des termes en rapport avec les causes, le siège et la nature du mal.

# 87. Aliments excitants guérissant au début la migraine ophtalmique,

Cette maladie, cette migraine ophthalmique dont l'étude sur moi-même m'a été d'une si grande utilité pour l'appréciation de la cause organique des névroses et peut-être de l'action névrique (1), cette affection, qui

<sup>(1)</sup> C'est cette étude qui m'a conduit non-seulement à rapporter à des ceciliations dans les nerfs ou névropallies (à l'état normal, névro-pallisme) la plupart des affections dites névroses, telles que le tintouin-

résiste à l'action des narcotiques, et que la belladone elle-même calme fort rarement, est brusquement arrètée dans sa marche par la médication la plus simple et, en quelque sorte, la plus vulgaire possible. Il s'agit de prendre, dès le début du mal, aussitôt que les premiers troubles de la vision surviennent, et dès que l'on aperçoit une sorte de brouillard ou le plus petit arc lumineux et oscillant, une demi-verrée de vin vieux de Bordeaux ou autre, et un aliment très-lèger, tel qu'un biscuit. Sous l'influence de ce moyen purement hygiénique et qui substitue le travail de la huiitième paire de nerss et du grand sympathique nécessaire pour la digestion, à l'action pathologique de l'œil et de la cinquième paire; il sussit, dis-je, de ce moyen pour faire que les accidents s'arrêtent à l'œil (ou plutôt aux nerss irisiens), ne les passent pas, et pour que la torture ordinaire de la migraine ophthalmique (irisalgie ou mieux encore névropallie prosasique de l'iris) ne se déclare pas.

#### 48. Moyens hygièniques prévenant cette même migraine.

Mais l'étude attentive des circonstances dans lesquelles survient la migraine ommique ou ophthalmique, m'a conduit à avoir recours à une précaution hygiénique aussi efficace pour prévenir l'invasion du mal qu'elle est facile à suivre. J'ai remarqué que ce

les crampes, les auras: hysterica et epileptica, l'hystèrie et l'épilepsie elles-mèmes, l'angine dé poitrine, le tétanos, la rage, les accès fébriles et plusieurs variôtés de l'aliénation mentale, mais encore à prévenir ou à guérir plusieurs de ces affections, Traité de médecine pratique, du professeur Piorry, nes 11543, 11630, etc.

symptôme se déclare principalement chez les gens qui tramillent des yeux dans les deux heures qui suivent l'ingestion des àliments dans l'estomac, ou qui éprouvent, lors de la vacuité de cet organe, la sensation dite besoin. Ce travail consiste, le plus souvent, soit dans une lecture plus ou moins pénible; soit dans une occupation quelconque qui cause de la fatigue dans l'appareil optique; soit encore dans l'éblouissement par une lumière vice agissant brusquement. J'ai constaté, par de trèsnombreux faits, qu'il suffisait de ne pas s'exposer à l'action de ces circonstances, pour éviter d'être atteint du mat dont il est ici question.

C'est évidemment à ces précautions purement hygiéniques, et à ces moyens d'arrêter le mal dans sa marche progressive, que je dois d'avoir, sur moi-même, prévenu et arrêté des accidents qui, plus tard, se renouvelant d'une manière journalière, auraient pu à la fin devenir inquiétants. J'ai pu, dès lors, me livrer à l'étude et à des lectures qui, sans leur emploi, me seraient devenues impossibles. Du reste, j'ai été assez heureux pour réussir de la même façon dans des cas analogues, sur un grand nombre de littérateurs, de savants et de médecins.

 Héméralopie ou vision n'ayant lieu qu'au grand jour; utilité de l'occiusion des paupières pour placer l'œil dans l'obscurité,

Le remêde principal à opposer à l'héméralopie, c'està-dire à une diminution marquée de la vue lors de l'obscurité, tandis qu'au grand jour la vision est parfaite,

#### HYPNOTISME

est de condamner pendant longtemps les yeux à la privation de la lumière. Les médicaments échouent complétement dans de tels cas. L'occlusion des paupières, au moyen des bandelettes agglutinatives, pourrait peutêtre avoir ici une grande utilité.

50. Vue de corps brillants ou de mouvements monotones. Hypnotisme.

L'action prolongée d'un corps brillant ou de mouvements monotones que l'œil fixe, détermine parfois sur des individus névropathiques, des phénomènes bizarres auxquels on a donné le nom d'hypnotisme. C'est une sorte d'état cérébral dans lequel se déclare un assoupissement spécial accompagné d'insensibilité aux agents physiques, et d'une action intellectuelle éveillée par des sensations acoustiques qui persistent.

Dans ma première enfance médicale, à vingt-un ans, alors que, très-jeune docteur, j'eus l'occasion de voir, à Poitiers, une somniloque magnétique, j'expliquai l'état dans lequel se trouvait cette femme par les circonstances dont je viens de parler. (Voir le journal du département de la Vienne de cette époque.) Bien longtemps après, j'ai constaté que la migraine dont il vient d'être parlé prend naissance dans l'appareil nerveux de la vision. Plus tard, je vis qu'il en était ainsi pour un très-grand nombre de cas d'épilepsie.

M. le docteur Démartis, de Bordeaux, se rappelant les leçons que je sis, il y a bien des années, à l'hôpital de la *Pitié*, réclama pour moi la priorité de la connaissance et de l'étude de l'hypnotisme. Ilm'est arrivé si rarement qu'on ait voulu me rapporter la première découverte de certains faits, plus ou moins importants, décrits par moi le premier, que j'ai été très-sensible à ce bon souvenir. Quoi qu'il en soit, nous allons bientôt voir toute l'utilité que l'on peut tirer enpathologie et en thérapeutique de l'influence qu'exerce 'appareil de la vision sur les affections cérébrales.

# 51. Épilepsie (névropallie ommo-encéphalique).

Sous le nom d'épilepsie, de mal caduc, de haut mal, etc., on a désigné un assemblage de phénomènes multiples, qui, le plus souvent, commencent par des accidents nerveux, ayant pour siéges diverses parties du corps, telles que les yeux, l'estomac, les ovaires, les membranes, la peau, etc. (4). Confondant les phénomènes nerveux, dits aura, soit avec les symptômes optiques consécutifs, soit avec les accidents cérébraux ultérieurs, soit avec les convulsions qui les suivent, ou encore avec les troubles intellectuels ou physiques qu ont lieu plus tard, on a fait de tout cela une seule ma-

(1) Un accès épileptique complet se compose, d'après la plupart des anteurs: 1° D'un aura (éblouissement, fourmillement, etc.); 2° d'un cri neciontaire; 3° d'une chute survenue brusquement; 4° de la perte de comaissance; 5° d'un assoupissement profond; 6° de la morsure de la langue due à des convusions des muscles masticateurs; 7° de mouvements accadés et involontaires des membres; 8° souvent d'une respiration lente, profonde, qui paraît se suspendre pendant quelques instants; 2° du retour gradué de la connaissance; 10° d'un état de nomodence et parfois de connaissance incomplète; 11° enfin, dans beaucoup de cas, de délire avec ou sans flèvre, semblable à celui de l'ivresse.

#### ÉPILEPSIE

ladie (1), à laquelle on a donné les noms divers dont il vient d'être parlé. Je me donnerai garde d'entrer dans les considérations de haute pathologie où ce sujet si grave pourrait m'entrainer; mais ce qu'il importe de savoir, c'est que les faits les plus nombreux et les plus positifs semblent démontrer jusqu'à l'évidence que l'aura epileptica et ses suites consistent dans une oscillation, une vibration analogue à celle des nerfs irisiens dans la migraine ommique (page 77), et qui, ayant lieu dans les extrémités périphériques, ou dans la continuité des nerss, se propageant vers l'œil, ou plutôt vers le nerf optique, s'étend à des parties profondes du cerveau et causent alors : la perte de connaissance, les convulsions, le sommeil pathologique et le délire qui le suit; bien entendu qu'en même temps a lieu une congestion cérébrale qui peut avoir plus ou moins de durée. Les attaques, se renouvelant à des époques plus ou moins rapprochées, constituent, pour les pathologistes, la maladie dite épilepsie; et, par une singulière façon de considérer les faits, de simples auras sans phenomènes consecutifs, une perte momentanée de connaissance, etc., sont encore considérés comme des affections épileptiques.

#### 52. Moyens simples de traitement dans l'epilepsie.

Quoi qu'il en soit, on ne peut guère arrêter dans sa marche un accès de ce genre, alors qu'il a dépassé la

<sup>(1)</sup> Traité de Médecine pratique, de M. le professeur Piorry 20: 12,168 et suivants).

période d'éblouissement; presque toutes les tentatives qui ont été faites dans cette intention ont échoné; mais, en tenant compte des causes qui provoquent le retour des attaques, on peut encore espérer prévenir celles-ci.

Les plus graves de ces attaques sont celles dont les surat commencent par des symptômes en rapport avec la vue (éblouissements, regard fixe, etc.), et l'on remarque que, dans de tels cas, très-souvent le travail soutenu et laborieux de l'œil, l'excitation de la sensibilité optique par une lumière vive, provoquent l'invasion de l'accès. Tenant compte de ce fait, j'ai prévenu quelquesois le retour du mal en faisant porter aux malades des lunettes qui rendaient la vision plus facile, et en évitant l'action d'une lumière éclatante. L'un de ces malades, ainsi guéri, avait éprouvé la première attaque de son mal au siége d'Anvers; au moment où il avait été ébloui par le seu d'une mine qui venait d'éclater.

Dans d'autres observations, et notamment chez un fermier du marquis de C..., il est arrivé que le mal survenait à une heure fixe de la nuit; j'ai fait réveiller le malade une demi-heure avant l'époque de l'accès, et j'ai fait administrer tous les quatre ou cinq jours, et d'un seul coup, un gramme de quinine dissous dans l'alcool étendu. Les attaques, qui avaient lieu plusieurs fois en vingt-quatre heures n'ont pas reparu. Ma pratique, souvent suivie de succès, est, dans de tels cas, de chercher à troubler l'oscillation nerveuse initiale ou l'aura à son début, surtout au moment où il est probable

# 36 ÉPILEPSIE; CAS DE GUÉRISON

qu'elle va se déclarer (page 47). Le moyen intérieur que, dans cette intention, j'emploie le plus souvent est une potion ainsi composée :

Deux grammes de quinine, une proportion suffisante d'alcool pour bien dissoudre la quinine et assez d'eau pour étendre la dissolution sans précipiter la première, et, enfin, 5 grammes de teinture de cannelle. On fait prendre une cuillerée à bouche de cette potion aussitôt que l'aura initial survient.

Dans un cas récemment observé dans ma clinique et sur un malade atteint d'affection de la rate, d'accès fébrile, d'angine de poitrine et consécutivement de troubles de la vue et d'attaques d'épilepsie, l'extrait alcoolique de berberis, à la dose de deux cuillerées, a produit les plus heureux résultats. La rate reprit très-promptement, à la suite de l'emploi de ce médicament, ses dimensions normales. Les accès de sièvre et d'angine de poitrine, ainsi que les attaques d'épilepsie, qui, d'abord, avaient lieu un grand nombre de sois dans yingt-quatre heures, s'éloignèrent de quarante-huit heures, puis de plusieurs jours, et sinirent par ne plus se reproduire pendant la dernière quinzaine du séjour du malade à l'hôpital.

Ailleurs il a suffi de comprimer fortement par une ligature ou autrement, un nerf par lequel se propageait vers la tête et l'œil le frémissement oscillatoire de l'aura. pour brusquement arrêter une attaque qui aurait été inévitable sans cette précaution.

12. Strabisme ou action de loucher; moyen sumples d'y remédier. Occlusion de l'esti sain par des bandelettes.

Lorsque l'axe de chaque œil n'est pas dirigé dans le même sens et ne se porte pas vers le même objet, il en résulte le strabisme, infirmité ou au moins difformité très-désagréable à voir, et qui rend la vision moins certaine et moins fixe. Le stéréoscopisme conduit même à faire supposer que les personnes qui louchent ne doivent pas, aussi bien que d'autres, apprécier les distances et juger de la perspective. Quoi qu'il en soit, on a essayé beaucoup de moyens pour ramener l'œil ou les yeux déviés à leur direction naturelle. On sait que Buffon faisait porter une lunette noire dont chaque lentille était percée d'un trou central. Il voulait forcer ainsi les yeux à se porter vers les mêmes points de l'espace. Roux, qui louchait extrêmement, comprit très-bien la cause de son infirmité. Il vit qu'en général c'était parce que l'un des yeux voyait moins bien que l'autre, parce qu'il était faible, qu'involontairement et à son însu le malade détournait cet œil de l'axe naturel de la vision et de la direction de l'autre œil. Il imagina de faire voiler l'œil fort et de faire travailler le faible à l'effet d'augmenter son action et de rendre ce dernier plus fort, et cela en même temps que le repos diminualt l'énergie du premier. Il espérait, en procédant ainsi, équilibrer la force des deux yeux, et, par suite, les ramener tous les deux à la même direction. Les appareils qu'il fit placer sur l'œil fort pour le voiler étaient trèsembarrassants et réussissaient fort peu, ce qui fit oublier, en très-grande partie du moins, la méthode de Roux. Le fait est qu'après l'avoir utilisée sur lui-même, il se proclamait guéri et qu'il était seul de son avis.

Ce fut beaucoup plus tard que l'on pensa à pratiquer la section du muscle qui entraînait l'œil faible dans une direction dissérente de celle de l'œil fort. On coupait le muscle droit interne si l'œil était porté en dedans, le droit externe, s'il était dirigé en dehors, etc., et par un abus de mots singuliers, on appelle ténotomie (section d'un tendon) et non pas myotomisme (méthode de diviser un muscle) une opération dans laquelle on coupait non pas un tendon, mais bien un muscle.

J'ai réfléchi depuis sur l'explication de Roux et sur sa méthode, et depuis que les bandelettes agglutinatives m'ont permis de rendre facile et sans inconvénients l'occlusion des paupières, je l'ai utilisée pour la curation du strabisme. Ainsi que Roux, je fais fermer l'œil fort; mais c'est au moyen de mon appareil que le rapprochement des paupières est obtenu. L'œil faible est forcé d'agir et de se porter directement sur les objets et bientôt (c'est-à-dire après sept ou huit jours) il revient à sa direction naturelle.

# 54. Action volontaire pour ramener l'œil dévié à sa rectitude et dans l'axe de la vision.

Il est vrai qu'à ce procédé si simple j'ajoute un exercice des yeux qui n'est pas moins utile. Les bandelettes agglutinatives qui fixent les paupières sont enlevées trois ou quatre sois par jour, et alors, pendant un quart d'heure ou plus, la personne atteinte de strabisme tient près du nex un corps allongé, tel que le doigt ou un crayon. Tout aussitôt qu'elle cherche à le fixe, il arrive, tant que l'action de loucher outsinne, que le corps dont il s'agit purait double. Je prescris alors de saire tous les essorts possibles pour n'en vuir qu'un seul, et lorsque ces essorts out été continués pendant un certain temps, je parviens à obtenir ce résultat. Quand je suis assez heureux pour qu'il en mit ainsi, les deux yeux peuvent se porter sur le même objet, et par conséquent le strabisme a disparu.

Dans quatre cas, et dans beaucoup d'autres depuis, j'ai complétement réussi par ce procédé à guérir le strabisme, et ce sont les seuls dans lesquels je les ai employés. L'un d'eux a été publié dans la Gazette des Hôpitaux (3 juillet 1860), par M. Adolphe Ramond. mon secrétaire particulier, et voici l'observation dont il s'agit:

Mile T..., àgée de onze ans, d'une constitution plutôt saible que sorte, et n'ayant éprouvé aucune assection cérébrale, était atteinte depuis sa première ensance d'un strabisme en dedans de l'œil gauche et tellement prononcé que, lorsqu'elle fixait un objet, la cornée se portait tout à sait vers le front et vers la racine du nez. Elle voyait cependant des deux yeux; car, si l'on sermait l'œil droit, elle distinguait nettement soit les corps, soit les couleurs, soit les distances; seulement, l'œil gauche était très saible et la vue

#### CAS DE GUÉRISON DU STRABISME

moins parfaite de ce côté que de l'autre. L'expression générale du facies était tout à fait désagréable; plus la jeune malade regardait fixement et plus la difformité était marquée.

Les parents vinrent me consulter à l'effet de savoir s'il convenait de pratiquer l'opération du strabisme, c'est-à-dire la section sous-conjonctivale du muscle droit interne de l'œil gauche. Avant de conseiller cette opération, je pensai qu'il convenait d'essayer une médication plus douce, et j'étudiai organiquement et physiologiquement comment le strabisme se manifestait. Je demandai à l'enfant si un doigt que je plaçais à vingt centimètres des yeux et vis-à-vis la ligne médiane lui paraissait simple ou double, et l'enfant répondit qu'elle en voyait deux. Je m'assurai que jusqu'à une distance assez grande il en était ainsi. Quand la jeune fille voulait regarder le doigt et lorsqu'elle cherchait à le voir simple, la prunelle de l'œil gauche venait tout d'abord se placer en dedans sous la paupière.

Il était donc évident que c'était pour mieux fixer les objets, pour mieux voir une seule image qu'instinctivement l'enfant portait l'œil gauche en dedans de l'axe de la vision.

Réfiéchissant à ce qui se passe dans l'action de regarder au stéréoscope, je me rappelai que, voyant d'abord deux objets avec les deux yeux, on finissait, en continuant à fixer, à n'en voir plus qu'un seul; qu'il fallait bien, dans ce cas, que, par l'habitude et la volonté, on ramenat ces organes à une direction conve-

table pour bien voir. Il me sembla que dans le strabisme on pourrait obtenir un résultat analogue.

Dans cette idée, je plaçai l'indicateur de la main droite à 20 centimètres du nez de l'enfant, qui déclara voir deux doigts; puis j'engageai cette jeune fille, fort intelligente d'ailleurs, à regarder de telle sorte qu'elle n'en vit qu'un seul (1). Elle y parvint et, chose remarquable, l'œil gauche revint tout d'abord à sa direction naturelle; cette pratique fut réitérée avec le même succès, et une dame, fort intelligente aussi, se chargea de tous les détails de ce traitement, qui fut exclusivement employé.

L'œil fort (l'œil droit), ainsi que l'avait conseillé Roux, fut tenu fermé, mais non pas avec l'appareil très-incommode proposé par le chirurgien de l'Hôtel-Dieu; je me servis de celui que j'ai proposé (page 75) et employé dans un très-grand nombre de cas avec tant de succès : j'abaissai la paupière supérieure sur l'inférieure avec trois bandelettes de taffetas ichthyocollé, et dans le jour on ôta ces bandelettes toutes les fois que l'on voulut exercer l'œil à fixer les objets, l'œil faible (l'œil gauche) fut ainsi forcé de fonctiouner, et se fortifia.

Longtemps après le commencement de cette curation, les deux yeux se dirigeaient si bien dans le même axe qu'il était impossible de s'apercevoir que l'enfant

<sup>(</sup>f) Si l'on vent que la guérison soit radicale, il faut continuer pendant plusieurs semaines l'occlusion des paupières et l'exercice nécesaire pour la vision d'un seul objet.

#### 92 CAS DE GUÉRISON DU STRABISME

louchait; elle est devenue capable de se livrer à des études qu'auparavant elle ne pouvait pas faire.

Le second a trait à la jeune fille d'un horloger de la rue Joubert. Cette enfant était atteinte d'un strabisme convergent de l'œil droit si marqué que l'on ne voyait, entre les paupières, que le blanc de cet œil (1).

Le troisième fait se rapporte à une jeune personne de province qui louchait excessivement; le quatrième enfin a eu pour sujet un jeune docteur de mes élèves qui avait appartenu à la marine impériale et chez lequel, en très-peu de jours, le strabisme se dissipa presque complétement. Depuis, j'ai perdu de vue ce jeune homme, qui devait continuer ce traitement et me revoir dans le cas où la guérison ne serait pas complète.

J'aurais à mentionner quelques autres moyens de remédier aux ommopathies; mais ils seraient trop compliqués pour rentrer dans le cadre de ce livre, et je me hâte de parler de la curation, par des moyens simples, de certaines affections des organes de l'audition.

<sup>(4)</sup> Je viens de revoir cette jeune fille que j'avais soignée amsi il y a deux ans; sa guérison du strabisme est complète.

#### CHAPITRE III

# MOYENS SIMPLES A EMPLOYER CONTRE LES MALADIES DE L'OREILLE

 Maladies de l'oreille; otopathies ou oties. Maladies du pavillon de l'oreille.

La plupart des affections dont le pavillon ou conque de l'oreille peut être atteint, ne sont autres que des dermopathies semblables à celles dont il a été précédemment parlé. Cependant les annotations suivantes ne sont peut-être pas sans utilité.

# 56. Otite; érysipèle de l'oreille externe.

Quand un érysipèle (dermite périasique) s'étend à l'oreille externe, celle-ci devient excessivement dou-loureuse, et le moindre contact des draps ou des surfaces sur lesquelles le corps du malade repose donne lieu à des souffrances extrêmement vives. Pour remédier à ce mal, il convient d'abord de le traiter, comme s'il s'agissait des autres points de la peau, par des applications d'axonge solide ou mieux de diachylum ly-

copodé. Il faut limiter ce même mal, éviter son extension en entourant l'oreille externe soit d'un cercle de vésicatoire temporaire disposé en bandelettes, soit d'une légère cautérisation circulaire avec l'azotate d'argent. Cette précaution est surtout indispensable quand la dermite, ayant commencé par le pavillon, par le lobule ou par la conque, a été la suite d'une petite ulcération recouverte de croûtes (voyez pages 13, etc.) et n'a pas encore envahi la peau du cou ou crane. On voit des dermites périasiques semblables partir du pourtour du trou du lobule auquel sont suspendus des bijoux plus ou moins lourds et qu'il faut tout d'abord enlever lorsqu'ils donnent lieu aux dermelcosies (ulcérations de la peau) dont il vient d'être parlé.

Pour prévenir les douleurs produites par le contact du pavillon de l'oreille ensiammé, je fais entourer celuici par une couche très-épaisse d'ouate, de manière à laisser ce même pavillon au centre d'une cavité où rien ne le touche et à ce que les corps extérieurs ne puissent exercer de pression que sur le coton et sur les parties situées au-dessous de ce même coton.

# 57. Ulcérations, eczéma (elcosi-dermites, udosadénites) de l'oreille. Petits moyens utiles dans de tel cas.

Il est urgent de guérir le plus promptement possible les ulcérations de l'oreille externe, et, pour y parvenir, it faut les cautériser avec l'azotate d'argent. On doit surtout agir ainsi pour les enfants et pour les individus dont l'organisme est peu actif (hyporganisme). Sur ces personnes, en effet, de tels accidents donnent très-souvent lieu à l'engorgement des ganglions lymphatiques du cou, dû à la pénétration dans les vais-seaux afférents de ceux-ci, du pus déposé à la surface des ulcérations; quant aux rougeurs superficielles avec exhalation de liquides séreux (eczéma, udosadénites en inflammation des glandules de la sueur) qui se déciarent si fréquemment entre le pavillon auriculaire et le tégument du crâne, un des meilleurs moyens de les prévenir est le lavage avec l'cau tiède, et l'une des précautions les plus indispensables pour les guérir est de tenir le pavillon auriculaire écarté du crâne de façon à ce que l'air se renouvelle entre ces parties, qui sont très-disposées à rester en contact l'une avec l'autre.

Les applications de poudre de lycopode ont aussi une extrême utilité dans ces cas, auxquels on ne remédie souvent qu'avec beaucoup de difficulté.

# S. Corps étrangers solides, liquides ou animés introduits dans le conduit auditif externe.

Lorsqu'un liquide ou un petit corps étranger pesant (un grain de plomb, par exemple) pénètre dans le conduit auditif externe, on parvient parfois à le faire sortir en faisant reposer la tête du malade sur le côté où l'accident est arrivé. Si des animaux s'y étaient introduits, tels, par exemple, qu'une mouche ou que l'insecte dit très à tort perce-oreille (forficule), on l'asphyxierait promptement en plaçant l'ouverture du



96 corps ÉTRANGERS DANS LE CONDUIT AUDITIF conduit auditif en haut et en le remplissant avec de l'huile.

Si j'avais connu ce moyen si simple en Espagne, j'aurais à coup sûr remédié tout d'abord à un accident terrible arrivé à de malheureux variolés au-dessous des paupières et dans les conduits auditifs desquels des larves de la mouche carniaire (musca vomitoria) avaient été déposés; au lieu de cela, le malheureux chirurgien-major, dant j'étais le sous-aide, et qui aurait dû extraire cos bideux animaux, ne trouva rien de mieux à prescrire que de me faire pratiquer des injections, dans les parties qui contenaient ces vers, avec de l'infusion de rhubarbe qui, certes, laissa vivre tranquilles ces détestables parasites.

#### 50. Cérumen causant la dureté de l'oufe. - Son extraction.

Très-souvent j'ai été consulté comme tant d'autres par des gens plus ou moins avancés en âge et qui se plaignaient d'entendre moins distinctement qu'auparavant, soit de l'une, soit des deux oreilles. Parsois même cette diminution de l'ouïe était portée jusqu'à une surdité presque complète. L'examen des conduits auditiss externes révéla bientôt la cause de ce triste accident : c'était tout simplement une couche épaisse de cette substance grasse et amère que sécrètent les glandules de la conque auriculaire et qui a reçu le nom de cèrumen, qui remplissait le conduit et empéchait ainsi les vibrations sonores de se communiquer au tympan et

aux parties profondes de l'oreille. Il m'a été facile, comme on l'a prescrit dans des cas de ce genre qui ont fait beaucoup d'honneur à certains spécialistes, d'enlever avec une curette le corps obstruant et de rendre sur-le-champ aux malades la finesse de l'ouie.

#### 00. Poils développés à l'orifice de la conque.

Il en est de l'orifice de la conque comme de celui des narines, il faut se donner garde de couper trop près les poils qui s'y développent quelquesois; ces poils sont destinés à protéger le conduit de l'oreille contre l'introduction des corps étrangers, et ils tamisent aussi l'air qui pénètre dans ce canal. J'ai vu un malade qui suriculaire externe le lendemain du jour où il avait sait couper très-près les productions pileuses dont il s'agit.

#### 64. Écoulement d'oreilles.

Il est d'une indispensable nécessité de faire nettoyer plusieurs fois par jour le conduit auditif alors qu'il s'en écoule un liquide puriforme ou purulent avec de l'eau tiède que l'on injectera jusqu'à ce que cette eau sorte pure et sans odeur. Qu'il y ait ou non un abcès en avant ou autour de la conque, que la membrane du conduit soit seule malade ou qu'il y ait ou non perforation et même destruction de la membrane du tympan, qu'il existe une carie des os ou qu'il n'en soit pas

### 98 MALADIES DES OREILLES (OTOPATHIES)

ainsi, les injections aqueuses tièdes et abondantes, mais faites avec douceur et prudence, sont d'une immense utilité; réitérées vingt fois par jour, elles m'ont permis de guérir promptement chez le fils d'un de nos plus habiles artistes photographes (M. Pierre Petit) un écoulement purulent de l'oreille, que l'on aurait pu rapporter à la carie des os du rocher et qui existait depuis plusieurs mois.

Procedé pour faire respirer l'oreille moyenne. — Cette oreille moyenne est comparable à une cellule pulmonaire et la trompe d'Eustache (calpynge), à une bronche.

Dire que l'oreille moyenne est une cellule respiratoire élargie, ainsi qu'il en est pour les cavités nasales
qui ont reçu le nom de sinus, paraîtra fort extraordinaire à ceux qui n'ont pas de connaissances étendues
en histoire naturelle, et surtout aux personnes qui n'ont
pas de notions sur les ingénieuses idées de M. de
Blainville. Il en est cependant ainsi, et l'on peut penser, sans crainte d'être accusé de porter trop loin les
analogies, que le conduit auditif interne (trompe d'Eustache ou salpynge) est une véritable bronche qui se
dilate et qui communique l'air aux cellules de l'apophyse mastoïde. Quoi qu'il en soit de ce rapprochement, il est certain que l'on peut faire pénétrer l'air
extérieur dans la trompe et dans la caisse par le procédé suivant:

On fait pratiquer une forte inspiration, en même temps que la bouche reste close et que l'on ferme les

urines avec les doigts; dans ces circonstances, on fait exécuter, brusquement et par secousses, un fort mouvement d'expiration; tout aussitôt, quand la trompe ou salvage est libre, on entend un petit bruit sec dans les oreilles et l'on y éprouve une légère sensation de tension qui correspond au fond du conduit auditif externe. Ces sensations sont dues à la membrane du tympan, qui ressemble parfaitement, pour la disposition et pour les usages, à la peau qui recouvre la caisse d'un tambour. Ce fait, très-généralement connu, est fort utile pour savoir si la trompe est libre, si l'air pénètre dans la caisse et si la membrane est persorée; dans ce dernier cas, en effet, par le mouvement d'expiration dont il vient d'être parlé, cet air s'échappe avec un bruit caractéristique à travers l'ouverture de h membrane tympanique. J'ai en outre constaté les phénomènes suivants:

Lorsque l'on a pratiqué avec énergie, le nez et la bouche étant fermés, un mouvement d'expiration forte; lors, encore, que l'on a senti la tension de la membrane tympanique, s'il arrive que l'on continue à tenir oblitérées les ouvertures nasale et buccale du conduit aérien, et si l'on fait dilater fortement la poitrine comme pour inspirer, on détermine une sorte de succion de l'air contenu dans l'oreille moyenne. Or, si l'on renouvelle plusieurs fois de suite les manœuvres précédentes, on parvient si positivement à faire pénétrer l'air dans les diverses parties de l'oreille, et cet air en sort si manifestement, que, dans bien des cas, et surtout dans

ceux où les cellules mastoïdiennes contiennent et des gaz et des liquides, on entend très-distinctement, à l'aide du stéthoscope appliqué sur l'apophyse mastoïde, des bruits en rapport avec l'abord de l'air dans les petites cavités qu'elle contient.

J'ai tiré un très-grand parti de ces faits, soit au point de vue de la diagnose, soit sous le rapport du traitement, et c'est de ce qui touche à ce dernier que je veux seulement ici parler.

#### Cas de surdité et guérison subite par la respiration auriculaire artificielle.

En 1848 (1), un employé de l'hôpital de la Pitié était, depuis quelques jours, devenu complétement sourd. Je cherchai à faire pénétrer l'air dans le tympan au moyen d'une expiration forte pratiquée alors que les narines et la bouche étaient fermées. Le seul résultat que j'obtins de cette pratique fut de savoir que ce même air n'arrivait pas à la caisse, puisque le malade n'entendait ni ne sentait pas la tension de la membrane du tambour. Alors, faisant encore fermer la bouche et le nez, je fis pratiquer une très-forte inspiration, et tout à coup le malade entendit un petit bruit qui lui donna la sensation d'un obstacle surmonté. L'ouïe se rétablit immédiatement. (N° 11,494 de mon Traité de médecine pratique.)

<sup>(4)</sup> C'est alors que, pour la première fois, je songeai à faire aspirer l'air contenu dans l'oreille moyenne.

Plusieurs fois, depuis cette époque, j'ai employé ce même procédé dans des cas de surdité plus ou moins complète, et sans avoir eu de succes aussi remarquable que dans le fait précédent, les résultats ont été le plus souvent satisfaisants.

 Abels dans les cellules mastoldiennes reconnu quinze jours avant son ouverure; guérison. — Auscultation de la respiration auriculaire.

Chez un jeune fondeur en caractères de la rue Bauteseuille, 12, ce même procédé me sit reconnaître et annoncer un abcès dans les cellules mastoïdiennes; l'apophyse de ce nom était très-douloureuse et recouverte d'une peau enslammée; j'y entendis, lors de l'inspiration et de l'expiration auriculaires, des râles trèsforts; le plessimétrisme trouvait sur cette apophyse malade beaucoup moins de dureté que du côté opposé. Le mal sit des progrès; j'ouvris avec un trois-quarts les cellules mastoïdiennes; le pus sut évacué; de l'iodure de potassium et du phosphate de chaux surent donnés à l'intérieur, de la teinture d'iode au tiers sut injectée, et en moins d'un mois le malade sut radicalement guéri.

#### 65. Faiblesse de l'oule. Utilité de la respiration auriculaire.

Renouveler l'air contenu dans la caisse du tambour est une chose utile dans un assez grand nombre de cas où l'ouïe est moins délicate qu'à l'ordinaire. Soit, en effet, qu'une légère rhinite (rhume de cerveau), propagée au pharynx, ait occasionné dans le salpynge

une inflammation de peu d'importance, mais suivie de l'épaississement de la membrane muqueuse ou de la formation de quelques mucosités qui gênent le passage de l'air; soit que toute autre cause empêche les gaz contenus dans la caisse du tympan d'entrer et de sortir facilement, il est certain que, dans bien des cas, on améliore la sensation acoustique en ayant recours à la respiration auriculaire pratiquée de la façon dont il vient d'être parlé.

Quand l'ouïe est dure, quand des douleurs continues plus ou moins vives existent dans l'oreille, quand le malade se plaint d'entendre des bruits oscillants et vibrants (tintouin), la plupart des praticiens ne voient rien de mieux à faire que de pratiquer des injections dans le conduit auditif avec l'opium, la belladone, le datura, etc.; ou, encore, que d'appliquer sur la peau voisine du pavillon un vésicatoire temporaire ou à demeure. Si ces moyens échouent, ils recommandent l'action des courants électriques.

Ce n'est pas d'une manière banale, et en quelque sorte au hasard, que ces divers moyens doivent être prescrits. Certes, les otalgies, les oscillations nerveuses de l'oreille (névrotopallies), en un mot les maladies de l'oreille interne, sont excessivement difficiles à reconnaître et surtout à guérir, et personne, que je sache, ne s'entend mieux à le faire que mon ancien élève et ami M. le docteur Blanchet, médecin et chirurgien de l'hôpital des Sourds-Muets.

Ce qu'il faut saire, c'est déterminer, autant que

possible, la cause anatomique des accidents dont il s'agit, et de rechercher:

- 1º Si une rhinite ou une pharyngite ne cause pas ou n'entretient pas le mal;
- 2º S'il n'existe pas quelque abcès profond autour de la conque ou du conduit auditif externe;
- 3. Si une dent cariée n'est pas le point de départ du mal;
- , 4º Si quelque inflammation suivie de suppuration ne se déclare pas dans le cràne près de l'oreille;
- 5. Enfin, si quelque autre cause physique du même genre n'existe pas vers le rameau de la cinquième paire de nerss situé au devant du conduit auditis externe. Mais ce sont là de ces choses de haute pratique qui ne rentrent pas dans le cadre de ce travail, et j'en parle ici seulement pour que les malades et les praticiens sachent bien que les douleurs dans la région de l'oreille, douleurs d'apparence névralgique, méritent touiours une extrême attention. Elles peuvent, en effet, être suivies, au moment où l'on y pense le moins, d'accidents mortels du côté du cerveau, dus à des caries et à des abcès que l'on n'avait pu reconnaître. Certes, il existe des maladies des nerfs (du reste non moins organiques que les autres); mais tel médecin qui ne voit partout qu'affections nerveuses, et qui parle sans cesse de névralgies, sans chercher à remonter à leurs causes, fait preuve d'impéritie, se compromet lui-même, et, qui pis est, compromet la vie du malade et sa conscience.

#### OTOPATHIES; ANNOTATIONS

## 66. Annotations thérapeutiques utiles dans diverses affections de l'oreille externe.

Faisons seulement de dernières remarques relatives à des moyens bien simples, mais propres à soulager certaines douleurs d'oreille ou otalgies, et diverses affections dites otites et tintouin.

- 1º On soulage fréquemment les malades atteints de ces affections en les faisant coucher et reposer la tête sur le côté opposé à l'oreille douloureuse; par cette position, en effet, et d'après les lois de la pesanteur, on rend la congestion auriculaire moins forte.
- 2º En maintenant le malade dans cette même position, il suffit de verser dans le conduit auditif externe de l'eau de guimauve tiède et de l'huile d'amandes douces bien fraiche, pour que ces substances aqueuses ou onctueuses soulagent infiniment le patient. — La conque et le conduit forment alors une sorte de godet dans lequel ces mêmes substances séjournent facilement.
- 3º La compression au cou de l'artère carotide du côte correspondant à la douleur ou aux bruits, soit de pulsation, soit de sousse, entendus dans l'oreille, a parfois diminué et même sait momentanément cesser les symptômes dont il s'agit.

#### CHAPITRE V

MOYENS SIMPLES OU HYGIÉNIQUES

APPLICABLES AUX AFFECTIONS DU CONDUIT DE L'AIR

(ORGANES RESPIRATOIRES, ANGIAIRE).

#### 67. Maladies du conduit de 'air (angiairopathies ou angiairies).

Lensemble des organes de la respiration, l'appareil respiratoire de Bichat, appareil auquel j'ai donné le nom d'angiaire (ce qui signifie conduit de l'air), se compose des organes suivants : 4º le nez et les fosses nasales; 2º le larynx, la trachée artère et les bronches; 3º les poumons; 4º les membranes qui entourent ces derniers, c'est-à-dire les plèvres ou pleures (d'après le nomenclateur-anatomiste Chaussier); 5º les parois osseuses, musculaires et nerveuses de la poitrine.

#### 68. Maladie du nez et des fosses nasales (rhinopathies ou rhinies).

L'importance de l'orifice supérieur des voies de l'air ou angiaire est extrême, et les lésions dont il est souvent le siège ont une influence très-facheuse sur le larynx, a trachée et les poumons.

#### 60. Ulcération des narines.

Les excoriations, les ulcérations de l'ouverture des narines, celles surtout qui existent dans le petit enfoncement situé derrière la pointe du nez (1), souvent se recouvrent d'une couche qui empêche l'évacuation du pus qu'elles forment; celui-ci s'altère, et de la resultent des causes organiques très-puissantes : d'éré sypèle, d'engorgement des 'ganglions lymphatiques sous-maxillaires et de diverses affections de la peau.

Déjà j'ai parlé de faits du même genre pour diverses affections de la face; mais la très-grande utilité attachée à leur étude fait que je reviens à dessein sur e sujet. Des lotions, des bains locaux du nez avec l'ea tiède, une propreté exquise, des onctions trèssouvent réitérées avec l'huile d'amandes douces, imprégnant une boulette de coton (que l'on peut même laisser dans la petite cavité située derrière la pointe du nez), suffisent, le plus souvent, pour guérir les ulcérations dont il s'agit et pour prévenir leurs conséquences dangereuses. Si tous ces moyens échouent, les attouchements avec l'azotate d'argent réussissent ici d'une manière presque constante. Trop souvent les rhinelcosies (ulcérations du nez), les ostéorhinies (maladies des os du nez) résistent aux moyens précédents; alors le médecin doit diriger ses investigations dans le sens

100

<sup>(4)</sup> Lorsque le beut du nez présente très-fréquemment une rougeur vivo et inflammatoire, presque toujours cet accident est dû à une ulcération de la mombrane muqueuse située au-dessous du point enllamme.



#### MALADUES DU NEE (REINIES)

107

d'une cause syphiosique, et dans le doute il se conduira comme si une telle cause existait.

 Crottes des narines dans diverses affections et surtout dans la fièvre dite typhotide et dans la variole.

Jamais il ne faut arracher les croîtes qui entourent l'orifice du nez, et cela, soit que du pus les forme (pyolithes), soit qu'elles se trouvent constituées par des micosités ou du sang desséché (blennolithes, hémolithes). On ne doit les enlever qu'après les avoir ramolies soit avec de l'eau tiède.

Cest principalement lorsqu'à la suite de la petite vérole, les narines sont obstruées par des pyolithes épaisties qui, formant une sorte de bouchon, empêchent ainsi l'air de pénétrer dans le tube aérien, qu'il est urgent de lébarrasser le malade de ces dangereuses concrétions. Il est fort difficile d'y parvenir; mais avec de la persévérance, en employant pendant plusieurs heures de suite les lotions aqueuses, les bains locaux du nez et les onctions huileuses, on finit par enlever ces croûtes et par rétablir le passage de l'air.

Il en est ainsi pour les enduits noirs et épais qui, dans les fièvres dites typhoïdes, viennent à se former à l'oucerture du nez, et qui ont non-seulement l'inconvénient de boucher les narines, mais encore celui de répandre dans l'air et de faire respirer par le malade des émanations putrides, et cela, dans des affections où la septicité joue un rôle extrêmement dangereux.

 Poils dans les narmes. — Danger de les arracher, de les couper, etc.

Jamais on ne doit arracher les poils qui se développent dans les narines et qui ont pour effet de tamiser l'air qui y pénètre et d'empêcher son contact direct, alors' qu'il est froid et humide, avec la membrane interne du nez. Lorsque ces poils sont coupés ras, il en résulte que, lors de l'application des parois nasales l'une contre l'autre, il survient de la douleur, et, qui pis est, une inflammation qui s'étend de bas en haut dans les cavités du nez et parfois plus loin. Le meilleur parti à prendre est de couper ces poils; mais seulement de niveau avec le rebord des narines, ce qui, en général, n'est pas suivi de rhinite ou rhume de cerveau.

Cette rhinite est souvent déterminée par des circonstances plus légères encore. Il suffit, pour la causer, de laisser pénétrer un peu d'eau froide dans les cavités nasales, soit en se baignant, soit en se nettoyant la figure, ou, encore, en se faisant la barbe.

Rhinite (rhume de cerveau), onctions huileuses, dans les narines.
 Oblitération momentanée de celles-ci.

Un moyen de prévenir le rhume du nez et d'en arrêter la marche extensive annoncée par des picotements, de l'éternûment, de la difficulté à respirer par les narines, est d'introduire le petit doigt, trempé dans de l'huile d'olive ou d'amandes douces, le plus haut possible dans les cavités nasales (1). Ce n'est pas une seule fois que cette onction doit être pratiquée; mais il faut la réitérer à huit ou dix reprises par jour, et chaque fois que l'on a recours à ce petit moyen, il en résulte un soulagement marqué qui, en continuant la même pratique, est, en général, suivi d'une guérison complète.

Il n'est pas très-facile de comprendre comment il se sait que des causes de lésions, aussi légères que l'évulsion des poils, que l'eau froide introduite dans les narines, que le contact de l'air humide, etc., causes qui n'agissent qu'à l'entrée des narines, déterminent bientôt l'inflammation très-profonde de la membrane nasale, et que des onctions huileuses, faites sur les mêmes points, arrêtent promptement l'extension de ce mal. Le fait n'en est pas moins certain et peut, en désinitive, s'expliquer par les communications membraneuses, vasculaires et nerveuses qui ont eu lieu entre les téguments et les bulbes des poils des narines et les parties reculées des fosses nasales et des sinus. Bien plus, c'est que la rhinite est très-souvent suivie de l'inflammation du larynx, des bronches et de leurs ramifications, et que c'est par des communications semblables que cette propagation thérapeutique s'explique. Quoi qu'il en soit de cette même explication, il est certain qu'en prévenant l'extension de la rhinite par des onctions

<sup>4)</sup> Une bonne précaution hygiénique et qui suffit pour prévenir l'intasion de la rhinite, est d'avoir recours à cette médication, tout aussitét que la barbe vient d'être faite.

#### 440 UTILITÉ DE MAINTENIR LES NARINES BÉANTES

huileuses pratiquées fréquemment et profondément dans les narines, on prévient aussi le développement ultérieur de laryngites et de bronchites si souvent suivies elles-mêmes de pneumophymie (phthisie pulmonaire); tant il est vrai que les plus petites circonstances ent fréquemment, en pathogénie et en thérapeutique, une influence sérieuse.

Une précaution très-utile, dans le traitement de la rhinite existant d'un seul côté, est d'oblitèrer avec de la ouate enduite de graisse la narine malade, et d'éviter ainsi le passage de l'air sur la partie enflammée. Si le mal existe des deux côtés, on peut aussi boucher alternativement les cavités malades.

78. Nécessité de maintenir chez les fébricitants et chez les petits en- fants les narines ouvertes. — Large canule en caoutchouc introduite dans ces ouvertures.

Il est un grand nombre de fébricitants qui, ayant les narines rétrécies ou obstruées par des mucesités, ne respirent que par la houche; alors surtout se forment des enduits blanchatres, jaunâtres ou même noirâtres et fétides, soit sur la langue et les dents, soit sur le palais et les lèvres. Bientôt il sera parlé de ces enduits, mais ce n'est encore là que le plus petit inconvénient attaché à l'obstruction des narines.

La peine à respirer, qui résulte de leur défaut d'ouverture, détermine des troubles dans l'oxygénation du sang (oxémisme), qui donnent naissance à des phénomènes facheux. Chez les enfants à la mamelle, une



triuni de marches des sectors de sector d

le ne sais pourquei, dans arus ins ens précédenment cilés : croûtes dans le mez écomme en ar vui dans a viriole), épaississement inflammataire de la manuteme nasale, etc., on a introduit pas dans les deux emices supérieurs du conduit aérien. ou même dans i un d'eux teulement, en tube de gomme électique qui parmette au gaz atmosphérique une entrée facile.

Ah! certes, ce n'est pes sans un aux inte que chez la plupart des mammifères es chez les sommes plongeurs, l'orifice du conduit aemen est men essemnucliement béant; c'est que l'air est le granduit airment de l'organisme. Aussi n'est-ce que enen en aux maux qui restent longtemps sous l'esa ses plusques, pur exemple), que les narinessont des manues qui ses ferment et empéchent, de cette façon, ce in qualité d'y pouventre.

L'étroitesse des narines, par cesa même qu'elle gene la respiration, exerce à coup sur une influence farmeune sur la marche de certaines affections, soiles que : a pneumonémie, la pneumonite, les cardinations et même toutes les maladies qui ont pour symptôme sa dispute.

M. A. Ramond a même remarque qu'un tres-grand nombre de pneumo-phymiques (phthisiques) on: ées narines très-étroites et que leur nez est tres-amines. A semblerait, d'après ce fait, qu'une te le disposition companique serait une prédisposition aux maladies caseniques de poitrine.

### 112 HÉMORRHAGIES DU NEZ; PESANTEUR

74. Influence de la pesanteur sur la respiration par le nez. — Moyens simples d'arrêter les hémorrhagies nasales. — Grandes inspirations : position, etc.

M. Isidore Bourdon a remarqué que, dans le sommeil, la membrane nasale se congestionne si bien du côté sur lequel le corps est couché, qu'elle s'y tuméfie assez pour que l'air ne puisse plus passer par la narine correspondante. Si l'on se place, ensuite, en sens inverse, c'est la fosse nasale opposée à celle d'abord oblitérée qui, à son tour, est fermée, tandis que l'autre redevient spacieuse.

On peut, chez certains malades, et dans quelques cas de rhinite, tirer parti de ce fait.

Mais c'est surtout dans l'écoulement sanguin par les fosses nasales (épistaxis, rhinorhémie) que, tenant compte de la forme et de l'organisation de celles-ci, il est utile de tirer parti des lois de la pesanteur. Tout en avouant que, chez les individus qui ont beaucoup de sang et qui sont menacés de congestion cérébrale et de maladies inflammatoires, on ne doit pas arrêter l'hémorrhagie, on peut affirmer sans crainte qu'il faut se donner garde de s'en rapporter aux efforts de la nature, en laissant couler avec excès le liquide sans lequel on ne peut vivre.

Que de fois n'a-t-on pas vu la mort par anémie être la suite d'une consiance excessive inspirée par un vitalisme exagéré, qui avait conduit le médecin à abandonner à eux-mêmes des écoulements sanguins!

Naguère encore, un malade entra dans mon service;

ce pauvre homme, d'ailleurs très-robuste, avait été atteint pendant un jour d'une rhinorhémie très-abondante. On eut recours au tamponnement des narines et des ouvertures postérieures des fosses nasales, mais on ne réussit pas à faire cesser l'écoulement. Le lendemain. le sang s'échappait encore avec abondance, et une anémie mortelle était à craindre. Alors, appliquant à la membrane du nez (suite de la membrane laryngopneumonique) les idées qui m'avaient conduit à favoriser, dans les congestions et les hémorrhagies pulmonaires, l'acte respirateur (hyperpnéisme), je sis pratiquer coup sur coup au patient de très-profonds soupirs. et j'eus le bonheur de voir en une minute l'écoulement si bien arrêté qu'il ne reparut pas, et qu'en peu de jours le malade répara l'énorme perte de sang qu'il avait faite.

Depuis cette époque, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'employer ce moyen et avec le même succès. Bientôt, à l'occasion des affections du larynx, des bronches et des poumons, je reviendrai sur cet important sujet.

Il est encore d'autres procédés très-simples pour arrêter l'écoulement du sang par les fosses nasales et par les narines.

Le premier est de faire tenir élevée la tête du malade en même temps qu'il est assis et que les bras et les jambes, serrés au-dessus des coudes et au-dessous des genoux par des ligatures, sont tenus, sans point d'appui et durant quelques minutes plongés dans l'eau

#### RHINORHÉMIES; HYPERPNÉISME

415

chaude. Nous verrons plus tard que ce moyen est utile dans d'autres affections congestives ou hémorrhagiques.

On a cité des faits dans lesquels l'élévation profongée des bras au-dessus de la tête a brusquement remédié à une rhinorhémie. Ce fait paraît invraisemblable; je ne nie pas sa réalité, mais je ne l'ai pas observé.

Ce que je sais mieux, c'est qu'avent d'avoir recours au tamponnément nasal pratiqué au moyen de deux moreeaux de ouate de coton ou de charpie fixés, l'un à l'orifica antérieur, l'autre à l'ouverture postérieure des fosses nasales, au moyen d'un tien introduit dans le nez à l'aide d'une sonde (1), on deit essayer de faire coaguler le sang dans la cavité du nez qui lui donne issue (2). Il suffit pour cela de boucher exactement la narine et de faire longtemps pencher la tête de telle façon que cette ouverture soit placée plus bas que tous les autres points des fosses nasales. Aussitôt que le caillot est formé, le sang cesse de couler; mais pour que ce moyen réussisse, il faut que son emploi soit longtemps continué (3).

Il est indispensable encore d'attendre le plus possible

<sup>(4)</sup> Ce moyen exige de la dextérité et de l'habitude.

<sup>(2)</sup> Presque toujours l'hémorrhagie du nez n'a lieu que d'un seul côté.

<sup>(3)</sup> On ne doit pas oublier, en effet, que le sang suinte souvent d'une partie très-reculée des fosses nasales, et que l'afflux hémorrhagique cesse seulement alors que les cavités dont il s'agit sont remplies par des caillets.

après la disparition de l'écoulement sanguin avant de permettre su malade de se moucher et de permettre à 'air de passer à travers la fosse passele, siège de l'hé morrhagie; autrement les caillots oblitérants se détu chent et il y a récidive.

La compression de l'artère carotide au cou peut aussi avoir dans la rainorhémie la plus grande utilité. D'autres petits moyens connus du public, tels que les aspersions d'eau froide sur la face, le froid sur la peau du corps, etc., peuvent aussi n'être pas toujours sans avaniage.

## 73. Oblitération momentanée d'une narine dans la rbinite, que d'exhar laisons d'odeurs fétides par le nez.

Si le maintien de l'ouverture des narines est, dans plusieurs affections, bien souvent nécessaire, il est bon de se rappeler que, dans quelques autres cas, il est utile d'oblitérer momentanément l'une d'elles; il en est ainsi pour le côté malade, alors qu'existe une rhinite intense; c'est encore ce qui serait indiqué lorsqu'une odeur infecte, et surtout exhalée par des escarrhes gangréneuses, viendrait soumettre le malade ou les assistants à des exhalaisons dangereuses et insupportables. Il est même bon de savoir que le goût de beaucoup de mets et d'un grand nombre de boissons ne se fait pas sentir alors que les narines sont fermées. Il en est ainsi, par exemple, de l'arôme des vins, de l'odeur de moisi et de divers médicaments, ce qu'en pratique il est bon de ne pas oublier.

### 116 FÉTIDITÉ DE L'AIR EXPIRÉ (OZÈNE)

L'odeur insecte émanée des sosses nasales atteintes d'ulcérations prosondes (rhinelcosies) et le pus accumulé dans les caries ayant pour siège les os des sosses nasales est un désespoir pour ceux qui sont atteints de cette horrible instrmité et une cause de dégoût pour les assistants.

Les odeurs que l'on fait respirer au malade dans l'intention de remédier à la fétidité de l'haleine, ne servent à rien; tout au plus, on peut injecter de l'eau tiède dans le nez pour évacuer le pus et les liquides qui s'y trouvent. Dans aucun cas, on ne doit y porter de l'eau froide, car elle aurait, comme nous l'avons vu, l'inconvénient de donner lieu à la rhinite, qui souvent aggraverait le mal. Des onctions avec l'huile d'amandes douces, pratiquées très-profondément, sont encore ici très-utiles. On peut tenter, dans l'ozène, les inspirations de vapeurs de teinture d'iode échauffée dans un appareil convenable, et qui, employées conjointement avec un traitement mercuriel, m'ont merveilleusement réussi. Mais ce qui, dans un tel cas, est plus certain, et rend l'approche du malade moins insupportable aux assistants, c'est de faire boucher, momentanément, les narines avec du coton.

#### 76. Propagation au larynx de l'inflammation du nez.

Peut-être arrêterait-on l'extension d'une inflammation du nez vers le larynx en modifiant fortement, lors de la rhinite, la portion évasée du pharynx qui sert de conduit à la respiration, et cela au moyen d'un garga-



#### LARTNGOPATHIES

risme, dans lequel le sulfate de zinc entrerait pour un centième, et que l'on aurait le soin de ne pas faire staler. Pour réussir, il faudrait prolonger durant quelques minutes l'emploi de ce gargarisme et en faire usage plusieurs fois par jour.

77. Maladies du laryax, de la trachée et des leenches / laryagies, trachées, bronchies). Repos des organes respiratoires dans les affections aigués du tube aérieu ou angiaire.

L'un des moyens les plus puissants de soulager et même de guérir les affections aigues du larynx, de la trachée et des bronches est en même temps le plus simple. Il s'agit seulement, pour obtenir ces résultats, d'éviter que le mal soit entretenu par l'accomplissement des fonctions de ces organes; mais ici, il y a des remarques importantes à faire.

La cavité de l'arbre aérien doit nécessairement et continuellement livrer passage à l'air; sans cela la mort par le manque d'oxygénation du sang est promptement inévitable. On ne peut donc empêcher un malade qui souffre des voies aériennes de respirer à chaque instant; mais on doit au moins chercher à modérer cette respiration et à la ralentir autant que possible, en recommandant au patient de garder le repos et d'éviter de se livrer à des exercices violents.

Il ne faudrait pas, cependant, porter trop loin l'application de ce précepte; car souvent les respirations suspirieuses pratiquées de temps en temps et coup sur coup améliorent sensiblement l'état du tube aerien; mais il en est plutôt ainsi dans les affections d' 118 APHONIE; DANGER DE PARLER A VOIX BASSE niers rameaux bronchiques que lors des souffrances de la trachée et des bronches.

Enrouement; danger de parler continuellement à voix basse,
 Cas remarquables de guérison.

Quant aux fonctions du larynx relatives à la voix et à la parole, le silence absolu présente souvent de l'utilité, mais ce qui n'en a pas, c'est de ne parler qu'à voix basse.

En esset, on conseillerait à tort à une personne atteinte d'enrouement dû à une laryngite médiocrement aiguë, et surtout chronique, d'éviter de sormer des sons vocaux par le larynx.

Pour la production de la voix basse, il faut un grand effort dans lequel les muscles du larynx agissent presque autant que pour le langage pleinement articulé; celui-ci fatigue fort peu, alors que les poumons remplis d'air font vibrer le tuyau vocal. Il arrive ici ce qui a lieu pour le soufflet de l'orgue, qui donne d'autant plus facilement des sons, qu'il est plus rempli de gaz atmosphérique.

De cette considération résultent des documents utiles pour comprendre l'importance de procédés bien simples, qui suffisent, cependant, soit pour rendre la voix à des gens qui croient l'avoir perdue, soit pour améliorer de beaucoup le chant des personnes qui se livrent à cet agréable exercice.— Les faits suivants vont fournir les preuves de ce qui vient d'être dit.

Un riche négociant de Rouen vint, il y a déjà quel-

Depuis six mais il était dans est état. Ferancissi le player les voies aériennes. les ponnones ent. je n'y pes nica constator d'antermal. L'appris que se malaille trait été atteint au définit des sociéleus. Cure inventetrachéite aigné, et qu'un lui sum rommunité sonc raison alors, de me pous pourler; mois lursque le mai devina chronique, notre homme avait mutanté a ne s'exposure qu'à voix très-basse, de surte qu'étant desarramé de l'affection du laryux, il était resté spinme per habitude, le lui conseillai alors de faire une remiration sussirieuse, de dilater ses promons par de l'air, de retenir celui-ei et de s'efforcer tout à comp d'émotire, à trèshaute voix, une phrase courte, telle one celle-ci : Le toudrais pour tout ou monde être purri. Atrès quelque hésitation, il fit ce que je lui recommandais, et quelle lut sa surprise et sa joie, quand il profera, de manière à nous étourdir tous les deux, les paroles que je viens de dire.

Depuis ce temps, il s'exprima comme si jamais il n'avait été aphone, et repartit le lendemain pour Resea. Le tout au monde, qu'il disait devoir donner, se rédnisit à la plus petite pièce d'or alors en usage.

Dans quatre autres faits, presque aussi accentais

120 EXPIRATIONS FORCÉES DANS L'ENROURMENT que le précédent, j'ai obtenu, à la suite du même traitement, des résultats analogues, et bien souvent, dans des enrouements, dans des affaiblissements chroniques de la voix (hypophonie), j'ai amélioré singulièrement le mal par le même procédé.

79. Utilité des inspirations lentes et profondes, suivies d'expectorations brusques pour expulser les mucosités du larynx, qui ont reçu des chanteurs le nom de chat.

Mais c'est surtout pour le chant que des moyens du même genre que les précédents sont extrémement utiles; le sirop d'érysimum, quelques autres préparations, composées en grande partie de sucre et de gomme avec addition d'un peu d'opium, de belladone, etc., constituent la médication employée par bien des gens pour\_enlever, comme on dit vulgairement, le chat qui, tout à coup, fait perdre la voix.

Or, ce chat n'est autre chose que quelques mucosités épaisses qui viennent se placer dans les organes producteurs des sons et probablement vers les cordes vocales; ces mucosités, difficiles à se détacher, empêchent les vibrations sonores de se former.

Dans une des représentations d'Herculanum à laquelle j'assistais, il arriva que le ténor éprouva tout à coup l'accident dont je viens de parler, et plusieurs fois de suite ce malheur se renouvela. Très-impressionnable, M. R... se laissa entraîner par le désespoir; il jeta même à ses pieds la couronne qu'il portait, et s'enfuit éperdu dans la coulisse. J'avais lu récemment mon

voix Chantée; Hyperpréssue, amélioration 121 mémoire à l'Académie des sciences, sur les respirations accélérées et expultrices, et je vis tout d'abord la cause de cette perte de la voix qui pouvait, à un si haut degré, nuire à un grand artiste. Je me fis conduire sur la scène, et je trouvai dans les coulisses M. R... assis et désolé. Il ne me fut pas difficile de lui persuader de faire lentement de très-profondes inspirations, suivies d'expirations très-brusques, et dirigées vers le larynx, de telle sorte que l'air expulsé par ce mouvement entrainat avec lui les mucosités qui génaient l'action des cordes vocales.

L'acteur n'avait pas eu trois fois recours à cette pratique, qu'il évacua les liquides visqueux qui oblitéraient en partie la cavité du larynx où la voix se produit. M. R... continua à remplir son rôle. Sans doute il n'a que très-médiocrement compris l'importance du service très-désintéressé que je lui avais rendu, car je n'ai pas eu même l'honneur de recevoir une carte de visite de lui.

Il est vrai qu'auprès de M. R... se trouvait un médecin dont les manières et l'expression de physionomie me portent à croire qu'il n'avait pas été très-bienveillant à l'endroit des conseils que j'avais donnés et qui avaient été si utiles à l'éminent artiste.

Dans plusieurs autres cas, j'ai réussi à faire di

<sup>80.</sup> Amélioration de la voix et du chant produite par les grandes inspirations suivies de la concentration d'un grand volume d'air dans la poitrine.

#### 122 AMÉLIORATION DE LA VOIX CHANTÉE

raitre, par le même procédé, un enrouement survenu subitement, et bientôt nous verrons que dans les affections des voies de l'air plus profondes, les expirations brusques et expectorantes ont une extrême utilité.

La voix parlée ou chantée est infiniment améliorée et rendue beaucoup plus forte, plus sonore et plus étendue par le procédé suivant, que j'emploie lorsque je veux donner à ma voix, soit une grande énergie, soit un timbre meilleur, ou que je cherche à produire des sons plus graves et plus aigus, plus pleins et moins rauques, que dans le chant qui m'est naturel. Je fais une inspiration très-profonde et très-complète, et je retiens pendant un certain temps l'air contenu dans la poitrine ainsi distendue; c'est alors que je m'efforce de produire un grand volume de voix parlée ou chantée. De cette façon, je parviens à dépasser de beaucoup le registre de ma voix. Plusieurs artistes, notamment M. Roudil, baryton de premier ordre, en suivant cette méthode, a donné encore plus de force et d'étendue à son chant. Le tort de beaucoup de gens est de vider trop complétement d'air la poitrine alors qu'ils parlent, et de se fatiguer beaucoup en le faisant; la timidité qui ôte tout à coup la voix à certaines personnes ne paraît pas agir autrement qu'en empêchant de respirer suffisamment pour donner les proportions d'air nécessaires à la formation des sons.

80 bis. Modification avantageuse dans le timbre de la voix produite par l'élévation du voile du palais alors que l'on chante.

J'ai fait, il y a peu de temps, et non sans quelque sur-

prise, une remarque dont certains artistes peuvent tirer parti; c'est que, si l'on élève fortement pendant que l'on chante le voile du palais, ce qui augmente l'amplitude du tuyau vocal, les sons produits deviennent plus pleins, plus purs, et la voix acquiert une fermeté qu'elle n'avait pas auparavant. Ce dernier avantage est dù à la contraction que l'on fait alors exécuter aux muscles du voile du palais.

88 ter. Moyen très-simple de vider le sisus maxillaire des liquides qu'il contient.

Un fait remarquable assez rarement observé, m'a prouvé que l'on peut vider le sinus maxillaire des liquides qui y sont accumulés. On fait fermer les narin, s par la pression des doigts, et la bouche par la contraction des muscles orbiculaires des lèvres; puis on recommande au malade de pratiquer une ou plusieurs inspirations énergiques. En même temps, le patient est couché sur le côté du corps opposé à celui où le mal a son siège. La raison de cette précaution est, que dans une telle attitude. l'ouverture nasale du sinus affecté est située à la partie déclive et que le liquide contenu dans la cavité malade s'écoule facilement. Chez un jeune homme dont le côté droit de la face était très-tuméfié et très-douloureux, je percutai l'espace qui correspondait au sinus maxillaire, et j'y trouvai un son et un tact hydriques très-prononcés dus à la présence d'un liquide. J'eus recours au procédé qui précède, et tout d'abord l'expiration qui en résulta fut suivie d'un écouler

abondant de pus par la fosse nasale correspondante et du retour de l'élasticité et de la sonorité dans le sinus maxillaire droit.

Moyen de retenir la respiration pendant un temps assez long.

Il est un moyen très-facile de retenir longtemps la respiration et que personne à ma connaissance n'a recommandé. Il consiste à faire une inspiration profonde et très-étendue, à retarder l'expiration le plus longtemps possible, puis lorsque le besoin s'en fait fortement sentir, de faire successivement de très-petites expirations qui font lentement sortir l'air contenu dans la poitrine. Il paraît que le passage de l'air qui a lieu alors sur la membrane broncho-pulmonaire suffit pour entretenir, lors de sa sortie, l'oxigénation du sang, car on n'est pas ensuite dans la nécessité de respirer avec force. Les nageurs, les plongeurs pourront tirer quelque parti de ce fait.

8. Utilité d'une voilette pour prévenir les rhumes et les maladies aigués du poumon.

En général, et malgré l'opinion contraire généralement admise, ce n'est pas le refroidissement de la peau de la poitrine, de la tête ou des pieds qui est la cause ordinaire des rhumes de cerveau (rhinite), du larynx (laryngite), de la trachée et des bronches (trachéo-bronchite); mais, ainsi qu'il en arrive pour le coryza, c'est bien plutôt l'air froid et humide agissant sur la membranc muqueuse laryngo-bronchique qui produit les accidents dont il s'agit; en effet, on applique tous les jours de la glace sur les diverses parties du corps des malades, sans qu'ils s'enrhument, et il suffit, au contraire, de sortir par une température basse et pluvieuse pour que les voies de l'air souffrent et que la toux survienne. Aussi ne peut-on assez recommander aux personnes qui sont sujettes aux rhumes et aux affections des voies aériennes d'éviter de respirer l'air froid et humide, surtout lorsqu'un moment auparavant elles étaient dans un lieu échauffé. Une bonne précaution est de placer, dans de tels cas, un mouchoir devant la bouche, ou mieux encore une voilette de gaze ou de tulle, qui produit ici l'office que la lampe de Davy remplit pour les mineurs. C'est surtout pour les jeunes filles qui sortent du bal qu'il est utile d'en agir ainsi.

22 bis. Utilité de retenir sa respiration quand on est exposé à l'action d'un air insalubre.

Ainsi que le fait remarquer un chirurgien des plus distingués et l'un des observateurs les plus érudits, M. le docteur Broca (1), il est une précaution utile à prendre alors que l'on se trouve dans un lieu circonscrit où l'air est échauffé à tel point qu'il devienne nuisible pour l'angiaire (voies aériennes), elle consiste à suspendre la respiration jusqu'à ce que l'on soit sorti de ce même lieu. Cette annotation est tout aussi utile alors que, dans une condition semblable, on est exposé à

<sup>(1)</sup> Courrier Médical, 26 août 1866.

# 126 DANGER DU DÉFAUT D'EXPECTORATION

l'action d'un air très-refroidi ou contaminé par des substances délétères.

## 82. Évacuation des liquides et de l'écume contenus dans le tube aérien.

Presque toujours la cause matérielle de la mort, si longtemps objet de doutes et de discussions pour les médecins, est l'obstruction des cavités que l'air doit traverser, par des liquides qui s'y accumulent et forment souvent une écume qui pénètre au loin et jusque dans les vésicules pulmonaires. L'étude des accidents mortels dont il s'agit a été l'une de celles auxquelles je me suis davantage livré (1). Elle a été pour beaucoup, ainsi que mes recherches sur les pertes de sang, dans les idées qui m'ont conduit à rejeter l'admission de l'unité morbide, ou maladie unitaire, et à porter une immense attention aux états organopathiques existants chez l'homme malade. Il sussit en esset que dans une maladie, n'importe laquelle, un peu de liquide ou d'écume soit déposé dans les divisions bronchiques pour que, tout d'abord, surviennent des phénomènes plus ou moins graves en rapport avec le défaut d'oxydation du sang, tels que l'accélération du pouls, l'altération des traits, l'état fébrile, etc. Aussitôt que ces accidents surviennent, l'aspect primitif de la maladie change, et il

<sup>(1)</sup> Thèse latine pour l'agrégation (1826): Sur les signes de la mort par submersion. — Mémoires: Sur l'insuffiction pulmonaire, sur l'asphyxie par l'écume bronchique. — Traité de médecine pratique, n° 5930 et suivants.

n'y a plus de comparaison à établir entre ce qui avait lieu précédemment et ce qui se passe actuellement.

On conçoit dès lors combien il est important d'avoir à sa disposition des moyens propres à évacuer les matières contenues dans les voies de l'air.

#### 83. Moyen très-simples de faire expectorer.

Les moyens chirurgicaux consistent ici dans l'aspiration des liquides dont il s'agit, par des appareils pneumatiques. J'ai l'intention de m'occuper plus tard de cet important sujet.

Les médicaments principaux que, dans de pareils cas, les médecins administrent souvent avec succès, mais que le public ne doit jamais employer, parce qu'ils sont dangereux, sont : l'émétique (tartrate antimonié de potasse), l'ipécacuanha et quelques autres substances dont l'action expectorante est infiniment moins positive; mais il est ici certaines manœuvres inossensives et presque complétement hygiéniques, qui sont d'une utilité incontestable et véritablement de premier ordre. Ces moyens, les voici :

1ºLa toux (1) est un phénomène destiné, dans le plan

<sup>(</sup>i) La toux est une action physiologique éminemment utile. Sans elle les crachats ne seraient pas expectorés; des auteurs, de prétendus thérapeutistes cherchent chez tous les malades à faire cesser la toux, et out recours dans cette intention à des narcotiques; s'ils réussissaient à le faire, alors que les bronches et leurs diversions contiennent des llquides, ils tueraient les malheureux qui se conficraient à eux. Ce n'est que la toux seche ou quinteuse qu'il faut chercher à arrêter, et c'est toujours la cause organique qui provoque cette action que le vrai médecia doit combattre.

primitif de l'organisme, à expulser les crachats. Si elle est sèche, elle irrite les voies de l'air et manque son but. Dans ce cas, il faut la retenir autant que possible et s'y livrer seulement alors que l'on sont les crachats accumulés et prêts à être rejetés au dehors.

2º Lorsque les liquides sont contenus dans les bronches ou la trachée et en sortent avec dissiculté, une excellente précaution à prendre est de faire sléchir trèsfortement sur la poitrine la tête du malade et d'ajouter l'influence de la pesanteur à l'énergie de l'expiration pour saire expulser les crachats.

3° Un moyen plus puissant encore est celui dont il a été parlé à l'occasion des laryngies : il consiste à faire pénétrer très-doucement, très-lentement, une grande masse d'air dans les profondeurs du poumon, et, alors que cet organe est distendu, à conseiller de provoquer une expiration expultrice très-brusque et très-forte, propre à entraîner tout à coup au dehors les liquides qui obstruent le conduit de l'air (angiaire).

4º Tous les malades sont loin d'avoir assez d'énergie morale pour utiliser suffisamment leurs forces, à l'effet de donner à l'expiration l'impulsion nécessaire pour rejeter des crachats trachéaux ou laryngiens difficiles à expulser. On ne saurait s'imaginer l'importance pratique de cette réflexion. Souvent il m'est arrivé de forcer en quelque sorte certains malades à faire des efforts assez puissants pour rejeter hors du larynx des crachats volumineux qui oblitéraient presque les voics de l'air, et qui les mettaient dans la triste condition d'un noyé

sur le point de périr. Si ces crachats séjournaient quelques moments de plus dans le tube aérien, c'eût été la mort. Or, ce ne serait pas ici le cas d'être spectateur tranquille et impuissant des phénomènes naturels qui se succéderaient; ce ne serait pas alors que, froid observateur de l'évolution vitale et des efforts de ce que l'on a appelé la nature médicatrice (qui si souvent est antimédicatrice), il conviendrait de se croiser les bras; ce ne serait pas non plus alors qu'il conviendrait d'appliquer des vésicatoires ou le fer rouge pour ramener la vie prête à s'éteindre : ce qu'il faudrait faire : ce serait d'agir utilement avec la plus grande vigueur; ce serait de faire abaisser le plus possible la tête sur la poitrine, en raccourcissant ainsi le cou; ce serait de faire exécuter le mouvement d'expiration brusque et expultrice dont il a été parlé (page 128); ce serait de ne pas dissimuler au patient le danger de sa position et la nécessité de saire des efforts en quelque sorte surhumains pour faire pénétrer beaucoup d'air dans la poitrine et pour le rejeter avec violence; ce serait d'encourager le malade, de le prier, de lui ordonner avec fermeté de saire usage de toutes ses sorces, de substituer en quelque sorte la volonté du médecin à la sienne, pour provoquer l'expectoration, etc.

En procédant ainsi, j'ai eu l'extrême bonheur de conserver la vie à plusieurs personnes qui périssaient, et de prolonger pendant quelques heures ou quelques jours l'existence à d'autres malheureux agonisants.

## 180 CAS D'AGONIE PAR ASPHYXIE; GUÉRISON

84. Oservation remarquable de guérisons chez des agonisants, par l'expectoration provoquée.

· Une semme de cinquante ans était atteinte du catarrhe suffocant des auteurs, ou, pour mieux être compris, il était arrivé qu'à la suite d'un rhume qui durait depuis plusieurs semaines, un râle trachéal humide et extrêmement bruvant, se faisant entendre soit à distance, soit dans toute l'étendue de la poitrine, se manifestait depuis quelques heures. Malgré les vomitifs. aucune expectoration n'avait lieu. La face était livide. les yeux saillants, le pouls dur et vibrant, la mort imminente. Je fis placer l'agonisante sur le ventre, la tête penchée sur le bord du lit, et avec toute l'autorité dont je suis capable, je lui ordonnai de se livrer à des efforts extrêmes, d'abord pour inspirer, puis pour expectorer les crachats qui causaient l'asphyxie (hypoxémie, anoxémie). Il me sallut représenter à cette femme l'immense péril où elle était, le dus mettre en quelque sorte ma volonté à la place de la sienne pour obtenir l'esset que je désirais produire. Cet esset ne se fit pas attendre; des mucosités épaisses, jaunàtres, pyoides, entrainées par la pesanteur et par les efforts provoqués, furent, pendant près d'une minute, rejetées avec force et en abondance. Le rale cessa à l'instant même, les accidents d'hypoxémie (asphyxie) se dissipèrent, et, sous l'influence de quelques doses minimes de tartre stibié, la malade guérit en peu de jours.

Lors de l'épidémie de choléra de 1832, un ouvrier

qui travaillait à l'hospice de la Salpétrière fut transporté expirant à l'infirmerie où je faisais alors le service. Depuis peu de jours, il toussait et présentait tous les symptômes de l'asphyxie au plus haut degré. Un rale affreux sans expectoration avait lieu depuis le matin. Ce malheureux était livide; aucun corps étranger n'avait pénétré du dehors dans les voies de l'air; le plessimétrisme et l'auscultation ne faisaient constater aucune trace de pneumonite ou de pleurite. Tous les assistants croyaient qu'il s'agissait dans ce terrible cas d'une attaque de cholera. Je ne vis dans ce redoutable cortége de symptômes qui paraissaient devoir actuellement se terminer par la mort, qu'une oblitération presque complète du tube aérien par des crachats et une hypoxémie (1) consecutive (diminution dans l'oxygénation du sang); j'eus recours absolument au même moyen que dans le cas précédent. Par l'effort que je provoquai, le malade rendit un crachat énorme, jaunatre, opaque, visqueux et épais, qui remplit le fond d'un crachoir; bientôt quelques autres matières semblables furent évacuées de la même façon, et tous les symptômes si graves que ce brave homme éprouvait cessèrent sur-le-champ, de sorte que dès le lendemain il put reprendre ses travaux.

Parmi les faits analogues que jo pourrais citer, je me bornerai à parler d'un dernier cas que j'ai vu dans

<sup>(4)</sup> En vérité, je ne puis me décider à dire ici asplyxie (sans pouls), car ici le pouls soulevait le doigt appliqué sur l'artère avec une force extrême.

#### 132 HYPERPNÉISME DANS LES PNEUMONIES

la rue de la Pompe, à Passy, avec M. le docteur Boutin, mon ami, et un autre médecin. Il s'agissait d'un homme robuste pour lequel j'avais été appelé in extremis par l'un des banquiers espagnols les plus honorables de Paris. Le patient présentait les mêmes symptômes que les malades précédents. Nous étions tous convaincus qu'en quelques minutes il allait périr. Les mêmes moyens produisirent des effets tout aussi remarquables. Seulement, les crachats étaient tout à fait purulents, et comme il existait une pneumonite datant de plusieurs jours et que la source des crachats ne pouvait être tarie, la mort eut lieu, mais seulement alors que plusieurs heures s'étaient écoulées depuis notre consultation.

85. Très-grande utilité des respirations profondes et réitérées dans les congestions et les inflammations des poumons.

Lorsqu'il y a pen d'années, en 1859, je lus un mémoire à l'Académie des sciences, relatif à l'influence qu'exercent les respirations profondes et réitérées (1) sur les organes respiratoires et circulatoires, ainsi que sur le volume du foie, je n'avais pas encore constaté toute l'importance de cette manœuvre au point de vue

<sup>(1)</sup> Récemment, j'ai donné à la méthode dont il s'agit (et cela en me conformant aux règles de la nomenclature), le nom d'hyperpnéisme, ce qui signifie: action d'augmenter la respiration normale. Le terme hypopnéisme se rapporte à une diminution (normale aussi), de l'action respiratoire, et le mot pnéisme, à la respiration naturelle; en ajoutant à ces expressions la désinence ie, on rend l'idée d'un état morbide de ces mêmes actions respiratoires.

thérapeutique. Depuis lors, une multitude d'observations sont venues établir les faits suivants :

1º Lorsque le poumon est congestionné par du sang (pneumonémie), soit qu'il s'agisse des cas dans lesquels ce liquide s'accumule en arrière et en bas, lors du coucher sur le dos (pneumonémie hypostasique); soit qu'il distende les vaisseaux pulmonaires dans le premier degré d'une pneumonite franche (pneumonémite); soit encore qu'autour des bronches enflammées (bronchite) il rende les poumons plus rouges, plus compactes et moins aérés qu'à l'ordinaire (4), il suffit de faire pratiquer coup sur coup par le malade quinze à vingt soupirs très-étendus et très-profonds pour que, sur le lieu affecté, le son devienne moins mat; pour que l'élasticité que le doigt éprouve soit plus marquée, et pour que le bruit de la respiration devienne plus doux, plus étendu et plus pur. En même temps, le malade est soulagé et les symptômes du mal diminuent d'intensité. C'est qu'alors, évidemment, la congestion sanguine (hémie) a diminué et que la circulation dans le poumon a été singulièrement facilitée par les grands efforts respiratoires. Bien plus, l'étendue de l'espace où la matité et la faiblesse de respiration avaient lieu diminue tellement que, si l'on a trace avec un crayon la limitation exacte du lieu malade, on trouve, après les inspirations

<sup>(</sup>i) Phénomènes reconnaissables au plessimétrisme par une diminution marquée dans la sonorité et dans l'élasticité; à l'auscultation, par la faiblesse et un peu de rudesse du murmure respiratoire. (Voyez le traité de pléssimétrisme.)

dont il vient d'être parlé, que cette étendue devient moins grande d'un, de deux ou de trois centimètres.

2º Le même effet des inspirations profondes est obtenu, mais d'une manière moins manifeste, lorsque le poumon est non-seulement congestionné, mais encore lorsqu'il est devenu dur, comme il en arrive au second degré de la pneumonite (pneumonite sclérosique); mais, dans ce cas, l'organe pulmonaire ne reprend que bien plus tard une sonorité et une élasticité normales.

3º Ce qui est encore plus remarquable, c'est que, si l'on constate et si on limite par le plessimétrisme, au sommet des poumons, particulièrement en avant, sous les clavicules, une matité et une résistance au doigt qui percute, dues à la présence des tubercules ou phymies, et si, alors, on fait pratiquer coup sur coup plusieurs respirations suspirieuses, il arrive le plus souvent que l'étendue de la circonscription du mal est de beaucoup diminuée et qu'il en est ainsi de l'intensité de la matité et de la résistance au doigt. Ce n'est certainement pas le tubercule qui est ainsi modifié: qu'il soit miliaire, induré, ramolli, il ne change pas ainsi de consistance et d'aération; mais c'est qu'entre les productions phymiques il y a encore du tissu pulmonaire perméable et qui se dilate facilement par les inspirations profondes. Il faut même avouer que les cavernes (spéics) pulmonaires peuvent, par les grands mouvements respirateurs, se distendre, se remplir d'air, se vider des liquides qu'elles contiennent et donner lieu slors à plus de sonorité et d'élasticité qu'auparavant; mais ce qui prouve bien que les mouvements inspirateurs répétés agissent de la façon la plus utile sur la trame pulmonaire, c'est que, d'une part, la diminution de la matité et de la circonscription du mal persiste bien par delà le moment où l'hyperpnéisme (augmentation de la respiration) a eu lieu, et que le malade éprouve une amélioration de quelque durée dans les symptômes qu'il éprouve. Il y a lieu de penser que, dans le succès que l'on obtient de l'inspiration des vapeurs d'iode et de teinture d'iode, les grands mouvements respirateurs qu'elles exigent doivent être comptés pour quelque chose.

Etilité des respirations profondes et réitérées dans le traitement de la pneumophymie.

Jene saurais assez recommander dans le traitement de la pneumophymie les respirations profondes et réiterées. J'ai vu, en effet, beaucoup de phthisiques soulagés par l'emploi de ce moyen et un assez grand nombre d'entre eux ont guéri. Des gens qui présentaient au sommet des poumons, lorsqu'ils sont venus me consulter, une matité considérable et même des cavernes, n'offraient plus, à quelques semaines de là, aucun caractère plessimétrique ou stéthoscopique en rapport avec les lésions dont j'avais précédemment bien constaté l'existence, et leur état général coïncidait avec cette remarquable amélioration. On s'explique facilement ce mieux-être alors que l'on tient compte des documents suivants:

- 1° Le passage du sang dans les capillaires des parties engorgées qui entourent les tubercules ou qui les précèdent est extrêmement favorisé par les mouvements successifs d'inspiration et d'expiration très-profondes.
- 2° Si, comme je le fais pratiquer aux malades, on exécute dix fois de suite des soupirs très-étendus et si l'on réitère cette manœuvre cent fois par jour, il en résulte que mille fois on a fait passer dans les poumons une proportion considérable du sang, qui s'est oxygéné beaucoup plus qu'il ne l'aurait fait sans cela. En agissant ainsi, on modifie le sang comme il en arrive, lors de la respiration de l'oxygène que M. Dumarquay a proposée dans des intentions analogues aux miennes. Il arrive en effet; dans le cas d'hyperpnéisme, ce qui résulte de l'action d'un courant d'air rapide sur un corps en ignition qui le fait brûler presqu'aussi vite que s'il était plongé dans l'oxygène pur.
- 3° Ces considérations théoriques sont en rapport avec un fait pratique que voici: lors des premières inspirations que l'on fait exécuter par une personne atteinte d'engorgement pulmonaire, celles-ci éprouvent beaucoup de difficulté à porter loin une inspiration; mais à mesure qu'elles respirent d'avantage, cette difficulté cesseet l'hyperpnéisme s'exécute bientôt d'une manière plus étendue.
- 4º D'après ce qui a été dit précédemment, il ne faut pas s'effrayer, alors que la toux se déclare à la suite des respirations profondes; car elle survient alors parce que les liquides contenus dans l'angiaire se

déplacent et sont plus facilement expectorés. Cette expectoration est encore une fois un phénomène extrémement utile qui prévient, soit l'asphyxie complète ou incomplète, soit la pénétration dans le sang du pus, de la matière tuberculeuse, ramollie ou liquèfiée, des gaz fétides accumulés dans les aréoles pulmonaires. etc.

vomissemens d'aliments après des quintes de toux, lesquels sont pour beaucoup dans leur émaciation; ces mêmes quintes de toux provoquées par la présence des crachats dans les voies de l'air privent ces malheureux d'un sommeil réparateur. Or, j'ai réussi fréquemment à faire cesser les vomissemens dont il vient d'être parlé, et le défaut de sommeil, en provoquant par des respirations profondes et réitérées, l'expectoration des crachats contenus dans l'arbre aérien. Une fois que ces liquides sont rejetés, la toux cesse, les malades peuvent prendre de la nourriture sans vomir et obtenir aussi quelque repos.

On chercherait en vain par l'emploi des médicaments vénéneux à obtenir des résultats aussi avantageux que les précédents. La pratique de l'hygiène éclairée par les connaissances anatomiques et physiologiques est la base principale de la médecine qui soulage et guérit.

C'est surtout pour arrêter les hémorrhagies pulmonaires (pneumorhémies) que les inspirations suspi-

<sup>86.</sup> Extrême utilité des respirations profondes et réitérées dans les bémorrhagies des poumons (pneumorhémies). — Observation remar-Equable.

138

rieuses et réitérées sont d'une immense utilité. C'est sur un de mes élèves les plus dévoués que, la première fois, j'ai eu recours à ce puissant moyen.

M. Saraute, qui suivait depuis longtemps et avec le plus grand zèle ma visite et mes leçons, fut pris d'un énorme crachement d'un sang écumeux et rutilant. crachement qui se renouvelait à chaque instant par les efforts de cette toux alternativement sèche et humide qui a lieu lorsque le liquide sanguin prend sa source dans les poumons. On avait eu recours, sans aucun succès, à des sinapismes et à une soule d'autres moyens, et depuis bien des heures l'hémoptisie continuait, Le sang provenait certainement des poumons, car, en percutant on trouvait à droite et à gauche une matité résistante dans un espace de forme arrondie et qui, dans l'étendue de quatre centimètres à peu près, occupait la partie antérieure et moyenne de l'un des côtés de la poitrine: sur les mêmes points, la respiration ne s'entendait pas, et, en même temps, un râle affreux existait dans les grosses bronches. Les lèvres, la face, offraient une apparence pâle et en même temps livide : la peau était blême et le pouls paraissait vibrant ; mais il suffisait d'appuyer sur l'artère pour voir qu'il était très-faible.

Il en était ainsi du cœur, dont le volume était trèspetit; plusieurs cuvettes de sang avaient été rendues; la mort par hémorrhagie paraissait imminente.... Ce fut alors que je pensai aux respirations profondes et réitérées, et aux ligatures appliquées sur les quatre membres. Presque à l'instant, l'émoptysie s'arrêta complétement; les jours suivants, il n'y ent que des crachats d'un sang noir, dont l'excrétion fut provoquée par du tartre stibié et des respirations expultrices; la matité de la poitrine diminua hientôt d'étendue et de dureté, on constata autour de l'espace qu'elle occupait des rèles humides très-menus, et M. Saraute fut rendu à la santé. Cet élève studieux était encore inscrit l'année dernière au nombre des stagiaires attachés à mon service et sa santé est actuellement excellente (Août 1866).

Depuis l'époque où j'ai soigné M. Saraute, il y a trois ans, il m'est arrivé plus de trente fois, soit en ville, soit à l'hôpital, d'obtenir dans la pneumonémie des résultats du même génre.

Donner en détail les observations dont il s'agit, exposerait à des répétitions inutiles dont je crois devoir m'abstenir.

87. Respirations expultrices: dans l'apoplexie pulmonaire; dans les cas de erachats et les coagulations bronchiques qui accompagnent ou suivent la pneumonite; dans la phthisie pulmonaire (pneumophymie), et dans la gangrème des poumons.

A la suite des pneumonémies, le sang déposé dans les vésicules aériennes tend à s'y épaissir, à s'y accumuler, à y changer d'aspect et à devenir un corps étranger qui y stagne, noircit et passe par divers degrés de transformation à l'extrême limite desquels sont les tubercules (1).

<sup>(</sup>i) Thèse soutenue pour le professorat par M. Piorry: Sur la part qu'a l'inflammation dans la production des lésions organiques: Traité de médecine pratique, leçons cliniques, etc.

D'un autre côté, il arrive que, dans la pneumonie due à l'hémite ou plasthydrémie ) inflammation du sang, sang couenneux), il se forme dans les conduits de l'air des couches fibrineuses, des concrétions plastiques qui oblitèrent ces canaux et peuvent causer l'asphyxie (Gubler). Ailleurs et au dernier degré de la pneumonite, il se manifeste dans les poumons des abcès ou, au moins, des infiltrations purulentes, et si le pus n'est pas évacué, il se déclare une résorption pyouque (pyémie), suivie d'accidents mortels.

On voit encore, à la suite du ramollissement des tubercules, du pus s'accumuler dans les cavernes pulmonaires, et causer encore, soit cette même pyémie, soit l'anoxémie (asphyxie), etc., etc... Eh bien, dans tous ces cas d'affections pulmonaires, l'expectoration est d'une telle utilité que, si elle n'a pas lieu, la mort est inévitable.

Or, dans tous ces cas et dans quelques autres du même genre, les expirations expultrices dont j'ai précédemment parlé (page 128), sont d'une immense utilité, et remplacent avec avantage les vomitifs qui, dangereux alors que le tube digestif est malade, sont loin d'agir aussi directement qu'elles sur les voies de l'air.

N'oublions pas que, dans les cas où les crachats qu'il s'agit de rejeter au dehors se trouvent dans les parties profondes des poumons, les inspirations lentes et profondes qui précèdent les expirations expultrices doivent être portées aussi loin que possible.

87 bis. Moyen d'obtenir une augmentation de respiration dans un point limité des poumons.

Il est possible de faire respirer une partie des poumons plus qu'une autre; il suffit pour cela de faire coucher le malade sur le côté de la poitrine opposé à celui
que l'on veut faire dilater, de comprimer par les mains
d'un aide les régions du thorax, où l'on désire que l'expansion n'ait pas lieu, et de faire exécuter alors des
inspirations les plus fortes possible, lesquelles ne peuvent s'opérer que dans les parties où l'on juge utile
de faire pénétrer l'air; en agissant en sens inverse, on
peut aussi, ce qui parfois est utile, diminuer la respiration dans une certaine étendue des poumons.

Les manœuvres dont il vient d'être parlé ont donc de bien remarquables effets dans ma pratique; elles ont certainement prolongé les jours d'un grand nombre de pneumophymiques (phthisiques); elles ont vidé le sang contenu dans les cavités pulmonaires, où il avait été accumulé, etc.

 Observation remarquable de guérison d'une gangrène du poumon par les respirations expultrices.

Dans trois cas d'abcès du poumon, les expirations expultrices ont singulièrement contribué à faire évacuer le pus, et ces trois malades, dont les crachats de l'un contenaient des hydatides, sont radicalement guéris. Enfin, tout récemment, un jeune homme, M. Mallet (Ferdinand), àgé de trente-trois ans, atteint de gangrène du poumon (pneumo-nécrosie), affection recon-

naissable à la coloration brun-verdâtre des crachats, l'odeur spéciale et infecte qu'ils exhalaient, et que répandait l'air expiré, rejeta par les expirations expultrices, et aussi sous l'influence des vomitifs, une énorme proportion des crachats dont il vient d'être parlé; j'ai eu le bonheur de voir ce malade revenir complétement à la santé. Ce fait très-rare de guérison, dans un cas aussi évident de gangrène pulmonaire, est scientifiquement remarquable, attendu qu'il a été possible de déterminer de la manière la plus exacte, par la matité plessimétrique et par les ronchus larges de l'auscultation, le siége du mal, qui avait lieu en haut, en avant et à gauche, dans un espace circulaire de trois centimètres de diamètre; à mesure que les crachats étaient expectorés, les caractères physiques de la lésion diminuaient, et ils finirent, en quelques semaines, par disparaître complétement.

#### 89. Influence de la position du corps sur les affections du poumon.

Un moyen plus simple encore que les précédents, et qui est parfois d'une extrême utilité dans la curation des congestions, des inflammations et même des affections chroniques des poumons, est la position du corps que l'on fait prendre aux malades.

#### Congestion des poumons à la partie déclive (pneumonémie hypostasique).

S'il arrive, même en santé, que l'on soit resté toute une nuit couché sur le dos, le plessimétrisme permet de trouver le lendemain matin moins de son et moins d'élasticité en arrière et en bas que si la position du corps a été différente; en même temps, la respiration auscultée est, par en bas, moins développée qu'à l'ordinaire. Bi le patient a été placé dans une attitude autre que le coucher sur le dos, c'est toujours la partie alors la plus basse du poumon qui devient le siége de la congestion démontrée par les circonstances physiques précédentes.

Ces faits, que l'on peut reproduire à volonté et qui sont actuellement connus de tout médecin instruit, ont été étudiés par moi, il y a fort longtemps, avec le plus grand soin (1). Ils ont des applications des plus nombreuses, car ce qui a lieu ici en santé ne se manifeste pas moins en maladie, et l'un des moyens les plus utiles d'améliorer l'état d'un poumon congestionné ou enslammé est à coup sûr de faire habituellement placer le malade dans une position telle, que la partie affectée soit située plus haut que les autres régions de l'organe.

M. Influence de la marche ascendante à reculons, et repos alternant avec :a marche, alors que l'on pratique de temps en temps des respirations accélérées.

Un médecin allemand, dont le nom m'échappe, a proposé, pour diminuer la peine à respirer qui résulte de l'ascension d'un escalier, de s'y livrer à reculons.

<sup>(4)</sup> Mémoire relatif à l'influence exercée par la pesanteur sur le cours du sang; — procédé opératoire de la percussion médiate (1829 ou 1830). Traité de médecine pratique, t. III.

#### 144 MARCHE ASCENDANTE FACILITÉE

! Le meilleur moyen de faciliter la marche ascendante est de se reposer un grand nombre de fois en montant, et de se livrer en même temps à des respirations profondes et réitérées (hyperpnéisme).

Il serait, en effet, bien utile pour des gens trèsaffaiblis ou qui sont atteints de lésions du cœur ou des poumons (lésions si souvent accompagnées de difficulté à respirer), de trouver un moyen facile d'éviter la dyspnée; mais celui qu'a proposé le médecin dont il s'agit, détermine une telle fatigue des jambes et présente quelque chose de tellement insolite, que peu de personnes consentiront à s'en servir.

# 92. Élans imprimés au corps; grandes inspirations dans la marche ascendante.

Il est d'autres manœuvres auxquelles le bon sens conduit, et qui donnent parfois lieu à des résultats utiles.

La première est, lorsque les forces le permettent, de prendre un élan en gravissant rapidement un escalier, et de pratiquer au même moment une inspiration profonde. La main portée sur la rampe fait en même temps effort pour entraîner le corps en haut. De cette façon, on monte un certain nombre de marches sans accélérer la respiration, et l'on s'arrête un instant tout aussitôt que l'impulsion première est épuisée. La même manœuvre est ensuite renouvelée, et l'on continue ainsi, en prolongeant ou en abrégeant le temps du repos, suivant le besoin que l'on en a.

# TOUX SECHE; INSPIRATION DE VAPEUR D'EAU 145

Le point capital est ici, encore une fois, d'exécuter fréquemment des inspirations profondes. C'est en suivant cette méthode que je parviens à gravir un escalier sans fatigue et avec beaucoup de promptitude.

#### 33. Progression rapide obtenue en alternant la marche et la course.

En alternant aussi tous les vingt pas la marche accélérée et la course, en même temps que l'on pratique très-fréquemment des inspirations étendues, la progression peut avoir lieu très-vite, et cela sans qu'on en éprouve de souffrances. La connaissance de ce fait pourrait avoir de l'utilité dans les manœuvres d'une armée (1).

# M. Boissons aqueuses et inspirations de vapeur d'eau, lorsque la toux est sèche ou que les crachats sont très-épais.

L'usage de boissons aqueuses à doses réitérées et abondantes, et les inspirations de vapeur d'eau, ont une très-grande utilité alors que la toux est sèche ou que les crachats, séjournant dans les voies de l'air, y acquièrent une grande épaisseur (2). La qualité médicamenteuse de la boisson ou de la vapeur n'est pas ici ce que l'on doit surtout rechercher, mais c'est l'eau, c'est la vapeur elle-même, qui ont une influence marquée sur la liquidité des crachats.

<sup>(1)</sup> On augmente aussi beaucoup la rapidité de la marche, en premant un point d'appui sur les orteils, alors que l'on détache les pieds du sol en se servant de la pointe du pied comme d'un ressort qui porte le corps en avant.

<sup>(2)</sup> Très-ordinairement, chez les phthisiques, quand ces crachats épais surviennent, l'asphyzie et la mort sont imminentes.

# 146 SALIVE PÉNÉTRANT DANS LE LARYNX; TOUX

95 Abstinence des boissons quand les crachats sont très-liquides.

Par contre, quand les voies aériennes forment en abondance des mucosités très-liquides, l'abstinence des boissons, la respiration fréquente d'un air chaud et sec peuvent avoir les plus grands avantages. Il en est surtout ainsi alors que la température est froide et très-humide; dans de telles circonstances, donner des boissons abondantes à des malades atteints de rhumes dans lesquels sont formés beaucoup de crachats liquides, non-seulement n'est pas indiqué, mais encore est extrêmement dangereux.

On ne peut donc en rien approuver cette habitude du public qui, pour peu qu'un malade tousse, l'abreuve de boissons dites pectorales. Encore une fois, celles-ci ont de l'utilité quand la toux est sèche, et le contraire a lieu dans une circonstance opposée.

98 Ms. Utilité de savoir que la salive pénétrênt habituellement dans le conduit de l'air, est une cause de toux incessante très-propre à simuler des bronchites ou des maladies plus graves.

La proposition qui forme le titre de cet article n'a besoin que d'être énoncée pour que l'on en comprenne l'importance. Il est des gens dont la salive est trèsabondante ou qui, l'avalant avec difficulté, sont souvent atteints d'une toux qui loin d'être due, conme le croit le public, à la longueur de la luette, est produite par l'accident dont il vient d'être fait mention. Indiquer les HYDROPLEURIE; ABSTINENCE DES BOISSONS 147 moyens de remédier à celui-ci, me paraîtrait par trop banal et inutile.

98. Utilité extrême de l'abstinence des boissons dans les cas d'épanchements séteux dans les plèvres.

Parmi les moyens que l'on peut employer dans les cas non inflammatoires ou peu inflammatoires, lorsque de la sérosité est accumulée dans les membranes qui entourent les poumons ou le cœur (hydropleuries, hydropéricardies), il en est un que j'ai proposé, et qui, presque toujours, en peu de temps, a été suivi de la résorption d'une proportion notable des liquides épanchés; je veux parler de l'abstinence des boissons. Ce fait est démontré par le plessimétrisme, qui permet de mesurer exactement la hauteur à laquelle s'élève la sérosité.

Il est plus d'un médecin qui, avec une grande légèreté, pratique l'ouverture de la poitrine, pour donner issue à un épanchement, et qui, avant d'avoir recours à cette thoracotomie, devrait savoir que, dans dix-neuf cas sur vingt, la privation des boissons, combinée avec l'usage des purgatifs actifs, des vésicatoires hydrorrhéiques (qui font couler de la sérosité) et des sudorifiques véritables (1), réussissent très-promptement à faire résorber l'épanchement séreux. J'ai vu bien des gens, atteints d'hydropleurie et d'hydropéricardie (accumulation de sérosité dans les plèvres ou dans le péri-

<sup>(4)</sup> Étuve shehe, frictions avec la fianelle, lit échauffé, etc., et non pas infusion de bourrache, de sureau, etc.

#### 148 DOULEURS THORACIQUES, POINT DE COTÉ

carde), et, grâce à ce traitement, je ne me suis presque jamais trouvé dans la nécessité d'avoir recours à la thoracotomie. Certes, celle-ci est indiquée quand du pus ou des liquides altérés sont accumulés dans les membranes d'enveloppe du poumon ou du cœur; mais la difficulté, ici comme ailleurs, est de reconnaître la nature du mal, c'est-à-dire la présence des matières purulentes ou septiques. Si l'on est sûr qu'en effet ces membranes en contiennent, il faut ponctionner la poitrine; mais, si l'on a des raisons de douter qu'il en soit ainsi, on doit, avant d'opérer, s'assurer que les moyens dont il vient d'être parlé ne réussissent pas (4).

#### 97. Douleurs de la poitrine dites rhumatismales.

Quelques-unes de ces douleurs se dissipent par des moyens d'une grande simplicité, et beaucoup d'entre elles résistent aux médications réputées les plus actives.

D'abord, la plupart des souffrances dans les parois de la poitrine, souffrances que l'on rapporte, sans raison, au *rhumatisme* (2), ne sont autre chose que les résultats de l'une des deux lésions suivantes:

1° Des tiraillements ou des déchirures des fibres musculaires qui sont placées entre les côtes; ces acci-

<sup>(1)</sup> Voyez dans mon traité de plessimétrisme, le mémoire que j'ai lu à l'Académie sur la thoracotomie.

<sup>(2)</sup> Si vous demandez à ceux qui parlent si facilement de rhumatismes, ce qu'ils entendent par là, vous verres bientôt qu'ils ne se comprennent pas eux-mêmes.

dents surviennent brusquement à l'occasion des quintes de toux, d'efforts, de mouvements mal dirigés, ou d'attitudes mauvaises, telles que celles dans lesquelles la poitrine est fortement courbée en avant. Les principaux et presque les seuls moyens de remédier à ces états morbides sont d'abord le repos absolu et d'éviter, autant que possible, les mouvements, les attitudes, les efforts, la toux, etc., qui ont causé le mal et qui l'entretiennent; on peut joindre à cette médication de fortes frictions, pratiquées sur les points endoloris, avec la flanelle sèche ou imbibée soit d'eau de mélisse ou de Cologne, soit de quelque autre substance du même genre.

2º Des névralgies qui ont pour caractère de se manifester dans le trajet des nerfs intercostaux; difficiles à reconnaître, elles sont souvent les résultats d'une inflammation de la plèvre, et, plus fréquemment encore, de l'extension de névralgies qui ont lieu dans d'autres régions (de celles, par exemple, qui prennent leur point de départ dans les ovaires); mais, dans ces cas, le plus ordinairement, de petits moyens, tels que ceux qui font le sujet de ce travail (1), sont insuffisants.

Certes, dans les cas précédents, il faut se donner garde de se borner à un examen superficiel ou à des demi-connaissances pour déterminer la nature de la

<sup>(1)</sup> Voyez mon Traité de médecine pratique, article sur les névralgies; t. VIII.

### 450 DOULEURS DANS LES PAROIS DE LA POITRINE

douleur (4) et ne pas faire comme il est arrivé à un de mes proches parents, camarade d'enfance, lequel vint, de Poitiers, me consulter pour une douleur de poitrine dont il était atteint depuis dix ans. On n'avait même pas examiné la siège du mal; à peine eus-je mis à découvert la partie dont H. R..... se plaignait, que je vis un énorme et affreux cancer que l'on opéra, d'après mon conseil, ce qui n'empêcha pas mon malheureux cousin de succomber promptement.

(1) Voyez relativement à l'exploration de la poltrine le traité de plessimétrisme.

# CHAPITRE V

MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (ANGIÉMIES);
ALTÉRATIONS DU SANG (ANOMÉMIES);
MALADIES DU CŒUR, DES ARTÈRES, DES VEINES
ET DES VAISSEAUX CAPILLAIRES (HÉMIES),
CARDIOPATHIES, ARTÉRIES,
PHLÉBOPATHIES ET MICRANGIOPATHIES.

## 98. Altérations du sang (anomémies).

Les altérations que le sang peut éprouver sont nombreuses et variées. Malheureusement, les médicaments plus ou moins compliqués, et dont plusieurs ont été le résultat d'applications chimiques très-acceptables, réussissent beaucoup moins bien, dans de tels cas, que l'on serait tout d'abord disposé à le croire.

Je vais successivement passer en revue, dans l'ordre qui a été établi dans mon Traité de médecine pratique (tome III), les principales anomémies, et rechercher s'il n'est pas de moyens hygiéniques et d'une grande simplicité qui puissent remédier à plusieurs de ces nombreux troubles organiques.

### Augmentation dans les proportions du sang ou pléthore sanguine (panhypérémie.)

Dans un grand nombre de cas où l'augmentation du volume du cœur et du foie, l'amplitude des vaisseaux, la coloration des tissus, etc., (1) doivent faire admettre que les proportions du sang dépassent l'état normal, il n'est pas toujours besoin d'avoir recours à des saignées où à des médicaments propres à faire évacuer des liquides. Il suffit, si le cas n'est pas pressant et si rien ne fait craindre actuellement des congestions sanguines dans les organes importants à la vie:

- 4º De diminuer la proportion d'aliments et même d'en priver pendant quelque temps le malade;
- 2º De faire faire de l'exercice et de choisir comme nourriture des substances peu nutritives, telles que les herbages, les fruits, les viandes blanches, etc.;
  - 3º De faire prendre beaucoup d'exercice au malade;
  - 4º De saire en sorte qu'il reste peu au lit;
- 8º D'entretenir des selles assez abondantes par quelques purgatifs doux, tels que la rhubarbe en poudre, de petites doses de scammonée, etc.

Dans ces mêmes circonstances, il ne faut pas, pour romédier à la pléthore, pratiquer des saignées alors que l'on s'attend à des hémorrhagies normales (rhémismes), qui, conformément aux lois de l'organisme, doivent se manifester à des époques fixes. Cette propo-

<sup>(1)</sup> Yerre dans le traité de plessàndérisme, les procédés propres à ceautaire que faits.

sition est particulièrement applicable à la conduite que l'on doit tenir à l'approche de la période menstruelle.

Il faut encore se rappeler que, dans les cas de pléthore sanguine (panhypérémie), où survient une hémorrhagie spontanée et abondante, on ne doit pas chercher à arrêter trop tôt la perte de sang, car, portée à un certain degré, elle est souvent utile pour remédier aux accidents qu'éprouve le malade.

100. Défaut de sang (hypémie, anémie); excès de sérum dans le sang (hydrémie); défaut de coloration du sang en rapport avec la diminution des globules et du fer (hypochalybémie).

Ces états pathologiques, fâcheux et si fréquents, qui entrent, comme éléments morbides principaux, dans la maladie dite pâles couleurs, chlorose, chloranémie, etc., exigent, dans l'opinion de presque tous les médecins, l'emploi du fer administré de diverses façons et à des doses suffisantes (1) mais si l'on donnait exclusivement des préparations ferriques aux personnes qui sont atteintes des symptômes assignés à l'affection dont il s'agit, sans avoir recours en même temps à d'autres médications, j'affirme qu'aucune de ces personnes ne verrait sa santé s'améliorer.

Il en serait ainsi dans les états du sang du même genre que les précédents qui, se déclarant à la suite du ramollissement des tubercules, du cancer, etc., ont reçu le nom de cachexies; ce n'est pas encore le fer qui, donné seul, pourrait ici réussir.

<sup>(4)</sup> L'élixir au citro-lactate de fer du docteur Thernes est un médiement ferrugineux à la fois agréable et utile.

Un régime essentiellement réparateur, joint à l'action de la lumière et à un exercice modéré, est, dans de tels cas, le meilleur moyen de guérir les malades, ou de les faire vivre plus longtemps.

A plus forte raison en est-il ainsi dans l'hypémie proprement dite (diminution dans les proportions du sang); ce n'est point le quinquina, le quassia amara, les amers de toute sorte et les autres médicaments réputés toniques, ce n'est pas l'alcool ou le fer qui formeront des globules sanguins et qui répareront, de cette façon, les pertes que l'organisme a faites.

C'est avec une alimentation convenable, avec une nourriture choisie et proportionnée, sous le rapport de la qualité comme sous celui de la quantité, à l'état du malade, que l'on rendra ce que l'on est convenu d'appeler les forces,

Seulement, les agents médicamentaux peuvent être utiles en modifiant les organes de façon à activer et à améliorer les fonctions dont le but est l'hématose.

401. Diminution dans l'oxygénation du sang; asphyxie des auteurs; hypoxèmie de la nomenclature organo-pathologique; l'indication principale est ici de faire respirer spontanement on artificiellement.

Dire que le principal remède que l'on doit administrer à celui qui respire incomplètement ou qui ne respire pas l'oxygène de l'air, est de faire que le sang qui circule soit en contact avec ce même oxygène, paraît être, au premier abord, une chose si simple qu'elle pourrait passer pour une naïveté. Eh bien! cette donnée si vulgaire, cette vérité vraie, est loin d'avoir été généralement comprise; et, par exemple, consultez les instructions sur les soins à donner aux strangulés, aux noyés et asphyxiés par les gaz irrespirables ou toxiques, et vous verrez tout d'abord recommander les lavements avec le tabac, les vomitifs, les purgatifs, les frictions avec les liniments alcooliques, etc.; tandis que souvent on notera à peine les principaux moyens de curation, je veux dire:

- 1º Les grandes inspirations pratiquées coup sur coup et qui sont possibles si le malade conserve assez de force et de volonté pour les exécuter;
- 2º Dans les cas où l'asphyxié a perdu connaissance, l'insuffiation par le nez et la bouche, en même temps que l'on ferme le pharynx par la compression du larynx sur la colonne vertébrale (1).

Qu'il s'agisse d'un enfant nouveau-né qui ne respire pas, d'un malheureux qui vient d'être soumis à l'action funeste des gaz dégagés du charbon qui s'allume ou de la braise incandescente, qu'un homme soit soumis à l'influence d'un air privé d'oxygène ou altéré par des vapeurs délétères, etc., etc., le principal moyen, le seul moyen véritablement actif d'oxygéner le sang, est de faire pénétrer de l'air dans les cellules pulmonaires et de provoquer ensuite son expulsion.

462. Moyens de remplir l'indication qui procède.

Mais, pour que cet air entre et sorte ainsi, il faut

<sup>(4)</sup> Le but de cette manœuvre est d'empêcher le gaz insuffié de pénètrer dans le tube digestif.

faire cesser ou enlever autant que possible les causes matérielles qui, dans une foule de cas, empêchent le gaz atmosphérique de pénétrer dans les poumons:

- 1º Lorsqu'un homme s'est noyé par une seule immersion et que l'eau introduite dans les voies aériennes n'a pu devenir écumeuse, l'abaissement momentané de la tête pouvant faire écouler cette eau est alors d'une extrême utilité; il ne convient pas de prolonger cette position, dans la crainte de congestion cérébrale par déclivité (encéphalémie hypostasique) (1).
- 2º Quand de l'écume est accumulée dans les bronches, ainsi que cela arrive chez les submergés qui ont alternativement plongé et respiré de l'air, ou chez la plupart des agonisants qui meurent avec le râle (hypoxémie aphrosique ou par l'écume bronchique), l'aspiration de cette écume est d'une immense utilité (2).
- (4) Voyez ma thèse latine sur les signes de la mort par submersion (1826), et mon *Traité de médecine pratique*, dans lequel ces questions ont été expérimentalement traitées.
- (2) Voyez mon Mémoire sur l'asphyxie par l'écume bronchique dans le procédé opératoire de la percussion médiate.

Des élèves aussi dévoués que studieux, MM. Magnié, Besset, Delfaut Blumenthal et Maurice Raynaud, ont récemment, dans un cas d'angine couenneuse, noblement exposé leur vie en cherchant à aspirer directement par une canule introduite dans une plaie faite au larynx les liquides que contenaient les voies de l'air; c'est là un dévouement qui honore ces messieurs, genre de dévouement dont la plupart des médecins donnent des preuves si fréquentes. — M. Ballet a déjà voulu tenter à l'hôpital de la Pitié, chez un malade atteint de gangrène du poumon et qui périssait d'asphyxie, l'aspiration des détritus fétides qui obstruatent les bronches. Il voulait absolument porter sa bouche sur celle de ce malheureux dont la mort était d'ailleurs inévitable. Il fallut toute mon autorité de chef de service pour empêcher M. Ballet de commêttre cette imprudence généreuse qui ne pouvait sauver

L'extraction des corps étrangers introduits dans la trachée, l'évacuation de la membrane accidentelle dans le croup (laryngo-trachéite blen-plastique), sont, dans de tels cas, les principaux moyens de conserver la vie.

3º Quand les gaz, les liquides, la graisse, accumulés dans les intestins, le péritoine ou le tissu adipeux du ventre, empéchant le diaphragme de s'abaisser, diminuent, par suite, l'amplitude de la poitrine et causent l'hypoxémie, c'est à ces états morbides qu'il faut s'opposer alors que l'on veut soulager les malades, qui appellent asthme les effet de semblables causes (1). N'est-ce pas faire preuve d'une ignorance extrême des plus simples notions d'anatomie et de physiologie pathologique, que de prescrire, dans la difficulté de respirer que cause le refoulement des viscères, des narcotiques tels que l'opium, le datura stramonium, la belladone ou la digitale, alors qu'il convient surtout de

la vie du malade et qui aurait si fortement mis en péril celle de cet étève. Il y a d'ailleurs des moyens non dangereux pour le médecin d'exécuter l'aspiration dont il s'agit, et ils ont été indiqués dans le Traité de médecine pratique (articles : Asphyxie par l'écume bronchique, n° 6090; Croup, n° 6438). Ces moyens consistent dans l'introduction de la canule d'une seringue ou de tout autre corps de pompe dans l'une des narines, rendant que l'autre narine et la bouche seraient parfaitement fermées. Bien entendu qu'en même temps que cette aspiration serait pratiquée, on comprimerait le pharynx en appuyant le larynx dans la direction de la colonne vertébrale. Sans cette précaution, on pourrait aspirer non pas l'écume bronchique, mais les liquides qui se trouversient dans le tube digestif.

<sup>(1)</sup> Voyez mon Mémoire sur l'asphyxie par suite du resoulement des viscères, Traité de médecine pratique, t. III, n° 2974.

158 ASPHYXIE; TOXÉMIE PAR DES GAZ DÉLÉTÈRES

diminuer le volume du ventre? C'est ainsi, cependant, qu'agissent les hommes qui au lieu de chercher par la raison, les moyens de guérir, se dirigent par le hasard qu'ils saluent du nom d'empirisme!

4º Les épanchements dans les plèvres, qui ne permettent pas l'ampliation des poumons, exigent l'évacuation, soit par absorption, soit par une opération convenable, des liquides contenus dans ces membranes, etc., etc.

Certes, je n'entrerai pas ici dans les détails que comportent d'aussi graves sujets; mais je veux établir que le moyen le plus utile dans les aphyxies ou hypoxémies et en même temps le plus simple, est l'introduction volontaire ou forcée de l'air dans les poumons.

102. Cas remarquable d'asphyxie par les gas dégagés du charbon en ignition, guéris instantanément par les respirations profondes,

Il m'a suffi, dans le cas suivant et dans plusieurs autres du même genre, de faire largement respirer pour remédier presque instantanément aux accidents les plus graves, causés par la respiration de l'acide carbonique.

. Une femme, dans la force de l'âge et d'une bonne constitution, habitait, rue Neuve-des-Mathurins, no 1, une chambre fort petite, dans laquelle du charbon était depuis quelque temps allumé; elle tomba presque sans connaissance.

La figure était violacée; des vomissements avaient eu lieu; le pouls était irrégulier. Je sis transporter à l'instant cette malheureuse semme dans la cour de la maison; l'intelligence et la volonté étaient encore conservées, bien qu'à un faible degré.

Je parvins, par des instances réitérées, à lui faire faire coup sur coup plusieurs inspirations, qui, d'abord peu étendues, prirent ensuite bien plus d'énergie.

A la huitième ou dixième de ces inspirations, les mouvements respirateurs prirent beaucoup d'extension, et quelques soupirs très-profonds purent s'accomplir. Pendant qu'ils se succédaient, les accidents cessaient d'une façon si complète que, quelques minutes après, la coloration rosée était revenue à son état normal, et que la malade put continuer de vaquer à ses travaux habituels.

Lorsqu'un homme, jusqu'alors bien portant, éprouve tout à coup des vertiges, des étourdissements, de la difficulté à réunir ses idées, et bientôt après des nausées et des vomissements, n'allez pas croire tout d'abord qu'il s'agisse d'une véritable congestion cérébrale. Certes, il peut en être ainsi, et alors le cerveau souffre en effet, mais souvent ce sont les gaz qui s'élèvent du charbon qui s'allume (hydrogène, carbone, oxyde de carbone) ou en ignition (acide carbonique) qui, modifiant le sang et le nevrax, produisent cessymptômes (1). A deux reprises j'ai éprouvé de tels accidents, et j'ai

<sup>(</sup>i) Voyes ma thèse expérimentale sur la submersion et sur d'autres asphyxies, concours d'agrégation, 4836.

160 sang cournneux, hémite, fièvre inflammatoire bientôt reconnu qu'ils étaient dûs à la respiration des gaz que le carbone forme en brûlant. Le moyen par excellence à employer dans de tels cas est d'avoir recours à l'hyperpnéisme.

104. État du sang dit inflammatoire, sang couenneux, fièvre inflammatoire, hémite ou plasthydrémie de la nomenclature (1).

Oter du sang dans la sièvre inslammatoire ou hémite, est souvent saire une chose utile, mais non pas remédier à l'état organique qui consiste ici en ce qu'une certaine proportion de sibrine se trouve suspendue et non dissoute dans le sérum (2), ce qui la rend trouble et ce qui est cause que, par le repos, le sang laisse déposer, sur le caillot, une couche fibrineuse grisâtre à laquelle nos bons aïeux, par une comparaison burlesque, ont donné le nom de couenne. Ce qu'il saudrait pouvoir saire, dans de tels cas, ce serait de rendre la sibrine soluble; on a essayé de la soude, de la potasse, etc.;

(1) Traité de médecine pratique, nº 4044.

(2) Des anteurs graves ont pensé, et fait généralement admettre, que c'est par suite d'une augmentation dans les proportions de la fibrine contenue dans le sang qui se déclarent des phénomènes dits fibrres inflammatoires. C'est bien au contraire, ainsi que je l'ai prouvé dès 1834, parce que la fibrine n'est pas dissoute mais bien suspendue dans le sérum, qu'il en arrive ainsi. Tel homme d'ailleurs parfaitement sain vient-il à se refroidir brusquement, est presqu'aussitot pris d'un état fébrile très-aigu, son sang est tout d'abord couenneux et cela arrive bien avant que la fibrine en plus, ait eu le temps de se former entre l'action de la cause : refroidissement, et l'effet produit. D'ailleurs chez les chlorotiques qui n'ont pas de fibrre, le sérum est parfois en plus grande proportion que le cruor et il s'y trouve proportion-nellement plus de fibrine; mais si cot élément organique y est seulement suspendu, la couenne se forme, et il se déclare une fièvre dite inflammatoire.

j'ai moi-même tenté de faire respirer de l'ammoniaque, mais les recherches que j'ai faites sur ce sujet sont trop incomplètes pour en parler ici. Jusqu'à présent on ne voit de vraiment indiqué dans l'hémite que des moyens éminemment hygiéniques et d'une grande simplicité, tels que les boissons aqueuses à doses faibles à la fois, mais réitérées; je dis faibles, car j'ai constaté que, si l'on ajoute brusquement, à du sérum trouble séparé du caillot et devant déposer lentement de la couenne, une grande proportion d'eau, tout d'abord la fibrine se précipite en masse et une coagulation prompte a lieu; or, ce fait n'encourage guère à introduire promptement, dans les vaisseaux d'un individu atteint d'hémite ou plasthydrémie, une proportion considérable de boissons aqueuses. En portant, au contraire, peu à peu l'eau dans les voies circulatoires, il n'y a aucun risque à courir et l'on est très-utile aux malades. On peut dire des injections dans le fondement et des bains, une partie de ce qui vient d'être établi pour les boissons aqueuses.

Bien entendu que l'abstinence et le repos sont non moins indiqués, dans le cas d'hémite, que les moyens précédents.

Jusqu'à présent aucun moyen médicamenteux n'a réussi dans la curation de la fièvre inflammatoire.

105. Affections inflammatoires dans lesquelles l'état couenneux du sang entre comme élément principal ou comme coîncidence, et explique les phénomènes locaux qui ont eu lieu ultérieurement (rhumatisme articulaire aigu ou hémitoarthrite), pneumonie aigué (hémito-pneumonite), pleurésle aigué (hémito-pleurite), endocardite, péricardite (hémito-endorcardite, hémito-péricardite, etc.)

Dans des cas pareils, l'état couenneux du sang est, dans la théorie que j'ai proposée et admise (1), le point de départ de la plupart des altérations organiques qui surviennent et qui, diverses suivant le siége de la lésion et suivant les fonctions de l'organe affecté, ont ceci de commun, que la couenne ou plutôt la fibrine suspendue dans le sérum est l'agent des phénomènes qui surviennent; exemples: dans l'inflammation du cœur ou de sa membrane extérieure; dans celle des plèvres, des articulations, la fibrine se dépose, à la suite de l'hémite, sur les surfaces membraneuses; dans la pneumonite, elle passe difficilement à travers les vaisseaux pulmonaires et y forme des concrétions, etc.

Reaucoup de médecins peuvent très-bien ne pas adopter cette théorie et rapporter encore de tels phénomènes à la vitalité, à l'irritation, à l'inflammation, etc., mais tous les faits s'accordent avec les opinions que je défends, qui sont fécondes en applications thérapeutiques.

En effet, puisque l'état couenneux du sang joue un rôle si important dans les maladies inflammatoires, il

<sup>(1)</sup> Traité de médecine pratique, nos 4090 et suivants.

est évident que le traitement applicable à l'hémite doit ne différer de celui de la fièvre inflammatoire que sous le rapport de la structure et des fonctions des organes où les accidents concomitants ou consécutifs à celle-ci ont lieu. Conséquences logiques: l'introduction lente et successive d'une notable proportion d'eau dans les vaisseaux, soit par les boissons, soit par les vapeurs respirées, soit par les injections, etc., et de plus l'abstinence, le repos de la partie malade, moyens simples et hygiéniques par excellence, sont, en général, dans les maladies dont nous venons de parler (1), des médications de premier ordre et qui ne peuvent actuellement être remplacés par des médicaments, quels qu'ils soient.

406. Diminution de la fibrine contenue dans le sang; hypoplastémie, scorbut.

Bien que mes opinions nettement formulées (2) soient que l'état du sang désigné sous le nom absurde de scorbut, consiste dans une diminution de la fibrine du sang, et bien que, dans cette manière de voir, je ne m'explique en rien comment il se fait que les végétaux frais, les herbages, par exemple, remédient promptement à cette anomémie; j'admets, parce que l'expément

<sup>(4)</sup> Si l'on ne connaissait l'incroyable manie de parler de ce que l'on n'a même pas lu, manie qui trouble le cerveau de certaines gens, on ne comprendrait pas comment on a pu prétendre que l'auteur de la théorie précédente, datant de 1833, a été accusé de ne pas tenir compte des maladies générales et de ne s'occuper que des lésions locales. (Voyes le Traité de médecine pratique, tome I, n° 3903.)

<sup>(2)</sup> Traité de médecine pratique, tome III, nos 3911, 3912 et suiv.

#### 164 HYPOPLASTÉMIE; SANG DANS LE SCORBUT

rience l'a absolument démontré, que c'est dans l'usage de ces mêmes moyens que git le principal et presque l'unique remède de cet état pathologique. Les récits des grands navigateurs tels que Cook, Bougainville, Dumont-Durville, etc., l'expérience des médecins de la marine et de l'armée, la clinique journalière des hôpitaux et de la ville ne permettent pas de révoquer en doute cette grande donnée thérapeutique. Que de fois depuis trente ans n'ai-je pas remédié, dans mon service nosocomial où dans ma pratique, à des hémorrhagies par les gencives, par la bouche, par l'intestin, par les poumons, etc., à des taches de sang déposées sous la peau, etc., et cela au moyen des sucs d'herbes donnés à des doses assez fortes! Certes, le perchlorure de fer administré dans de tels cas n'est pas inutile; mais il réussit moins bien que ne le font 200 ou 300 grammes de sucs herbacés (sucs de cresson, de laitue, de chicorée, etc.) ingérés par jour. Les oranges, les citrons, les racines fraîches, etc., sont aussi très-avantageusement prescrits, alors que le malade peut les digérer. Toutes ces médications sont des moyens bien innocents, nullement dangereux, connus depuis longtemps, et qui ne peuvent être remplacés par des agents pharmaceutiques. Non-seulement ils réussissent dans les cas où l'état du sang dont il est ici question constitue l'affection principale, mais aussi dans les maladies où il se déclare comme coïncidence, comme complication ou comme symptôme consécutif. C'est ainsi que dans les fièvres graves, dans les anciennes splénopathies (mala-

SANG DANS LE CHOLÉRA; HYPOHYDRÉMIE dies de la rate, etc., etc.), j'ai pu, un grand nombre de sois, arrêter en quelques heures des hémorrhagies trèsabondantes et très-dangereuses par l'usage des sucs d'herbes et de végétaux frais. Ces hémorrhagies me

paraissaient être les résultats de l'état du sang qui. comme je viens de le dire, a été désigné, dans la nomenclature, par le terme hypoplastémie.

107. Diminution plus ou moins considérable du sérum du sang (hypchydrémie de la nomenclature (1) ). - Traitement du choléra.

Il est un état pathologique des plus graves, dont le sang est le siège, et que les terribles épidémies du choléra n'ont que trop appris à connaître, c'est cet état dans lequel la perte du sérum du sang est porté à ce point, que ce liquide organique, réduit à ses parties globuleuses et solides, n'est plus qu'une bouillie épaisse, brunâtre ou même noirâtre, dont la consistance poisseuse est telle qu'il peut à peine circuler et qu'il ne traverse les petits vaisseaux des poumons, des glandes, des membranes, des membres et de la peau qu'avec une extrême difficulté. Ce n'est pas seulement à la suite de l'action du poison cholérique (indoloïose ou poison de la peste de l'Inde) que l'on voit se manifester un tel état du sang; mais il existe encore (comme je l'ai vu à Corbeil avec mon honorable ami M. le docteur Lionet, dans trois cas malheureux), à la suite des selles aqueuses que cause l'empoisonnement par certaines espèces de champignons. On le retrouve encore dans la

<sup>(1)</sup> Traité de médecine pratique, no 3878 et 3894.

gastrentérite aiguë, dite choléra sporadique, et dans certains cas où l'émétique donne lieu à d'énormes évacuations liquides par l'estomac et par l'intestin. C'est précisément parce que le sang devient demi-solide et ne circule qu'avec une peine infinie que l'on voit survenir dans ces circonstances une faiblesse extrême des battements du cœur et du pouls, le refroidissement, l'arrêt des secrétions, et c'est aussi parce que les vaisseaux capillaires sont gorgés de sang épais et noir que les téguments de la face et des membres prennent cette coloration violacée et noirâtre que présentent les malheureux cholériques et les malades qui sont atteints d'une hypohydrémie due à toute autre cause.

Or, comme la chimie, la physique, l'expérimentation clinique, etc., n'ont en rien fait connaître en quoi consiste le poison cholérique (indoloïose), et comme on ne connaît pas davantage les agents neutralisants du principe vénéneux des champignons, etc., c'est exclusivement aux moyens d'arrêter le flux séreux qui a lieu par l'intestin, et, plus tard, c'est aux médications par lesquelles on pourrait espérer de rendre au sang le serum perdu, que l'on peut et, dans des cas pareils, que l'on doit avoir recours. Malheureusement, la thériaque, le punch, tous les médicaments dits astringents, etc., réussissent à peine, de sorte que les méthodes thérapeutiques sur lesquelles on peut compter davantage, sont les boissons abondantes, soit alcooliques, soit acidulées, prises à doses réitérées; car elles ont pour immense avantage de saire rejeter au dehors

#### TRAITEMENT DU CHOLÉRA GRAVE

les substances nuisibles que le tube digestif peut contenir, de pénétrer quelquesois dans le sang et de remplacer le sérum qui fait désaut. Pour remplir cette dernière indication, les boissons contenant de l'albumine, de l'œuf peuvent être utiles, et cela, qu'il y ait ou non des vomissements et des selles réitérées; ce sont surtout ces derniers moyens dont l'utilité est grande, tandis que la plupart des médicaments échouent. Les lavements aqueux, les bains de vapeur, les injections d'eau dans les veines, la compression de l'aorte abdominale pour ralentir la congestion stasique de l'intestin, peuvent aussi, dans des cas pareils, avoir quelque avantage.

406. Altération du sang due au mélange avec ce liquide de quelquesuns des éléments ou des liquides formés normalement dans l'organisme. — Etat du sang dans la goutte (oxurémie).

La plupart des médecins instruits, se fondant sur des notions chimiques et sur l'expérience clinique, pensent que la cause des accidents réunis sous le nom de goutte n'est autre que l'excès dans le sang de l'un des principes constituants de l'urine; je veux dire l'acide urique. C'est ce qui nous a conduits, mon ami M. le docteur Galtier-Boissière (1) et moi, à donner à l'état morbide du sang, dans cette série de phénomènes, le nom d'oxurémie (2).

<sup>(1)</sup> Voyez l'excellent livre de ce médecin sur la goutte.

<sup>(2)</sup> Ce qui signifie affection qui consiste dans un excès d'acide urique dans le sang.

Ce n'est pas que j'aie compris, sous cette dénomination, les innombrables états pathologiques et secondaires qui, pour les auteurs, constituent ce qu'ils appellent avec le public : la goutte; j'ai voulu seulement parler de l'affection dite générale, de l'altération du sang, qui est le point de départ des lésions que présentent, dans cette maladie, les jointures, les ligaments, les nerfs, les muscles et les autres organes.

On prétend, en général, qu'il est impossible de remédier à la goutte: c'est une grande erreur. Sans doute, on parvient à guérir bien difficilement soit les altérations profondes qui se manifestent, par le fait de l'oxurémie, dans les os, autour des jointures, et les déformations qui en sont les conséquences. C'est seulement par des moyens chirurgicaux, qu'après avoir calmé ou détruit la cause organique primitive, on peut en faire disparaître les résultats ou les pallier; mais, quant à l'oxurémie elle-même, il sussit de moyens on ne peut pas plus simples et qui sont, en quelque sorte, vulgaires pour la combattre utilement. Ces moyens sont les suivants:

- 4º La sobriété, ne prendre qu'en de faibles proportions des viandes très-animalisées, du vin généreux, et s'abstenir presque complétement de liqueurs alcoliques.
- 2º Faire entrer largement dans le régime des substances végétales.
- 3º Avoir abondamment recours à des boissons aqueuses prises par petites doses à la fois, mais très-

LAIT ALTÉRANT LE SANG, GALACTÉMIE 169

fréquemment réitérées, de façon qu'à la fin du jour on ait ingéré plusieurs litres.

4° Prendre souvent des bains tièdes prolongés et des injections aqueuses dans l'intestin.

5° Faire usage de bicarbonates alcalins, comme je le fais, en ayant recours à une potion ainsi composée et que j'administre dans plusieurs autres cas: bicarbonate de soude, 10 grammes; eau, 100 grammes; sirop de fleurs d'oranger, 50 grammes. Que l'on fasse choix de cette préparation ou des moyens proposés par M. Galtier-Boissière, les effets avantageux qu'ils produisent, alors que leur emploi est continu, ne tardent pas à se manifester. La dose de ces médicaments (qui doit être en général très-élevée) et le degré de sévérité du régime seront proportionnés à l'acidité de l'urine essayée par le papier de tourne-sol et à l'intensité des symptômes.

400. Accidents en rapport possible avec la présence du lait ou du moins de quelques-uns de ses matériaux dans le sang (galactémie ou galémie.)

Une opinion fortement enracinée dans le public, et que la plupart des médecins considèrent comme un ridicule préjugé, est que la pénétration ou la formation, la présence du lait ou au moins de ses matériaux constituants, dans le sang des femmes, lors de la lactation ou à sa suite, devient une source d'accidents aigus ou chroniques des plus graves. J'ai consacré l'article galémie du Traité de médecine pratique à la discussion de cette importante question (n° 4441).

# 470 LAIT ALTÉRANT LE SANG; GALACTÉMIE

Sans entrer dans les considérations pathologiques de premier ordre que ce sujet comporte, je me bornerai ici à faire remarquer que les moyens les plus simples sont aussi les seuls qui puissent être utilement employés, soit pour prévenir, soit pour remédier à la résorption du lait et à la galémie, si tant est, comme je le crois très-probable, que l'on doive admettre son existence.

Y a-t-il une drogue, un remède spécifique, qui pourraient être raisonnablement proposés pour détruire ce que l'on appellerait, dans un langage incorrect, diathèse ou cachexie laiteuse? Certes, ni le quinquina, ni les dépuratifs, ni les diurétiques, ni les alcalins, ni les acides, ne feront cesser la galémie et les accidents plus ou moins graves qu'on lui rapporte.

Pour des empiristes prévenus, l'infusion ou la décoction de canne serait peut-être encore un médicament spécifique; mais pour les cliniciens véritables, c'est-àdire pour les gens de bon sens et d'expérience, une drogue pareille mérite le même degré de confiance que le collier de liége que de bonnes gens placent autour du cou des chiennes qui ont mis bas, et cela dans l'intention de faire passer leur lait!

Pour prévenir les abcès du sein, dus à ce que le lait contenu dans les vaisseaux qui le charrient ne coule pas (poil des garde-malades, galactopyoïe de la nomenclature), il faut favoriser et même provoquer l'issue du lait : par la succion naturelle ou artificielle du mamelon; au besoin par des ventouses, par des pressions;

par des frictions sur les vaisseaux où ce même lait s'accumule.

Ces mêmes moyens sont non moins utiles pour faire que le lait ne soit pas résorbé et ne pénètre pas dans le sang; s'il y était véritablement parvenu, ce serait principalement par des boissons aqueuses administrées à doses réitérées, ce serait par quelques purgatifs propres à faire écouler surtout du sérum du sang (purgatifs hydrorrhéiques), que l'on pourrait remédier à l'état pathologique, dit galémie, et à ses conséquences organiques. Ces considérations sont entièrement applicables: à l'encéphalie des femmes en couche (méningite, manie puerpérale), aux accidents broncho-pulmonaires, aux arthrites, aux abcès qui se déclarent à la suite de la parturition, et à plusieurs autres états pathologiques qui ont lieu à la suite de la fièvre de lait (galémie à l'état aigu).

# 440. Bile dans le sang (jaunisse, ictère; cholémie de la nomenclature).

La théorie des maladies bilieuses, telle que l'avaient comprise Gallien, Stoll et leurs successeurs, dans l'état actuel de la science, n'est guère soutenable, et les opinions qui supposent que la bile occasionne un grand nombre de maladies aiguës ne sont point assez fondées sur l'observation et sur les faits expérimentaux pour supporter une discussion sérieuse.

Il est certain, par exemple, que, dans les cas où cette bile, ou au moins son principe colorant, existe évidem

## 172 EMPOISONNEMENT DU SANG; TOXÉMIES

ment en grande proportion dans le sang, il n'y a que très-rarement de la flèvre et de ces accidents auxquels on donne généralement le nom de bilieux. Cela est s vrai, que, dans la jaunisse, très-ordinairement les enduits de la langue sont blancs, tandis qu'ils sont jaunes, dit-on, dans les affections bilieuses (1); que le pouls, loin d'être fébrile, est ralenti, et qu'enfin les vomissements de matières vertes et amères n'ont pas lieu.

Nous ne nous occuperons point, pour le moment, des causes organiques de la jaunisse ou cholémie, nous y reviendrons à l'occasion de l'étude du foie et de la vésicule biliaire.

Disons cependant, ici, que les boissons à hautes doses et les purgatifs hydrorrhéiques (qui déterminent des évacuations aqueuses) sont les moyens qui conviennent surtout dans la jaunisse, c'est-à-dire dans les cas de bile ayant pénétré dans le sang. (Voyez l'article cholémie du Traité de médecine pratique, no 4420).

#### 111. Altérations du sang par les substances délétères (toxémies).

Une infinité d'agents portés dans la circulation, soit qu'ils se mélangent seulement avec le sang (comme il en arrive pour beaucoup de poisons, tels que les narcotiques, le principe actif des cantharides, etc.), soit

<sup>(1)</sup> M. le docteur Cros a prouvé que la coloration jaune des enduits de la langue était due, non fas à la présence de la bile, mais bien à une illusion d'optique.

173

## EMPOISONNEMENT DU SANG; TOXÉMIRS

qu'ils changent d'une manière évidente la composition moléculaire de ce même sang (comme on le voit pour l'oxyde de carbone, le gaz sulfhydrique, etc.) déterminent dans les organes, par la médiation du liquide nutritif, des troubles variés et souvent extrêmement graves.

Ces agents peuvent être divisés en plusieurs catégories: les uns prennent leur source dans les matériaux mêmes du corps de l'homme ou dans les productions qui s'y sont formées, tels sont : le pus altéré, la matière tuberculeuse ramollie, les principes solubles du cancer. les liquides et les gaz putrides développés dans les organes en communication avec l'air atmosphérique; d'autres proviennent des effluves marécageux (miasmes des marais, éliose de la nomenclature), de virus inconnus dans leur essence, et dont quelques-uns pourraient bien être des animalcules: agents producteurs de la variole ou variose, de la rougeole ou rubiose, de la scarlatine ou scarliose, de la morve ou hippiose; tels encore que les matières septiques ou septioses, les causes inconnues de la peste ou niloiose, de la sièvre jaune ou dysiloiose; tels enfin que tous les poisons spéciaux épidémiques dits infectieux ou contagieux.

D'autres encore sont constitués par des substances métalliques, par des agents chimiques très-nombreux, qui modifient le sang et l'organisation d'une foule de façons.

J'ai parlé en détail, dans le Traité de médecine pratique (nºº 4655, 4904 et suiv.), des divers états patholo-

## 174 TOXÉMIES, UTILITÉ DES BOISSONS AQUEUSES

giques auxquels donnent lieu la plupart de ces virus, de ces miasmes, de ces agents chimiques.

Je ne m'étendrai pas sur ces importants sujets dont l'histoire sort complétement du cadre de ce travail; je me hornerai seulement à établir quelques considérations générales, qui feront voir que, dans la plupart des cas précédents, les moyens les plus simples sont les plus indiqués, et constituent la thérapeutique la plus utile et la moins contestable.

\$12. Substances toxiques simplement mélangées avec le sang. — Utilité, dans de tels cas, de faire traverser ce liquide par beaucoup d'eau.

Les substances qui altèrent la constitution même du sang, et qui, pour la plupart, sont des éléments ou des composés chimiques, ne pourraient guère être détruites ou rendues inoffensives que par des corps plus ou moins neutralisants; malheureusement, il faudrait, pour que ceux-ci pussent être avantageusement employés, savoir au juste quel est l'agent vénéneux qui a modifié le sang, quelle est la lésion que cet agent a produite et surtout quelle peut être la substance chimique et non dangereuse qui serait apte à neutraliser le poison ingéré dans la circulation: de telles connaissances sont du domaine de la plus haute médecine et ne rentrent pas dans le cadre de ce travail.

Les substances toxiques qui sont seulement mélangées avec le sang, et qui viennent ensuite à agir sur les organes en y causant des lésions variables sous le

rapport de leur gravité, peuvent être facilement rejetées au dehors, alors que l'on augmente les proportions d'eau passant par l'appareil circulatoire; on obtient cette augmentatian par les boissons données à des doses plus ou moins grandes, par des injections aqueuses administrées dans le rectum, par des bains prolongés, par la respiration d'un air saturé d'humidité. Or, ces moyens sont d'une extrême utilité, d'un emploi très-facile, et leur simplicité extrême les met dans les mains de tout le monde; lors donc qu'il s'an gira d'accidents causés par les narcotiques, tels que l'opium, le datura, la belladone, la digitale, le hachish, etc., et lorqu'il surviendra dans le système nerveux des accidents formidables en rapport avec ces poisons, le premier soin, le moyen de premier ordre, sera de faire pénétrer en abondance par les voies qui viennent d'être enumerces des liquides aqueux qui entraînent, par les organes excréteurs, les substances toxiques mélangées avec le sang.

412. Altération du sang par les liquides formés dans les organes.

Indication du mème genre que la précédente.

Toutes les fois qu'un agent délétère prenant sa source dans le corps de l'homme, vient à altérer le sang, la première, la principale indication est de tarir cette même source; c'est ainsi que, dans le cas où du pus altéré provient d'un abcès, dans ceux où de la matière tuberculeuse ramollie existe dans une caverne, dans ceux encore où des matières septiques sont déposées ou

accumulées dans des cavités intestinales et sur des surfaces où des vaisseaux sont ouverts, le premier soin doit être de faire évacuer ces agents si graves d'altération du sang. Que de fois ne m'est-il pas arrivé, en provoquant la sortie du pus des abcès au moven d'injections, en déterminant l'expectoration des liquides accumulés dans les cavernes pulmonaires, en évacuant par les irrigations les scories contenues dans les gros intestins; ou encore en nettoyant les surfaces vasculaires recouvertes de matières putrides; ou même en momissant celles-ci, de remédier à la sièvre dite hectique, et aux accidents terribles en rapport avec les altérations du sang, résultant de la septicité (septiose)! Certes, il serait bien utile d'en agir ainsi relativement à la pénétration dans les vaisseaux de pus altéré, des matières tuberculeuses ou cancéreuses, du septiose, etc. Pour remédier à la présence dans le sang des substances précédentes, on ne connaît guère d'autres médications utiles que les boissons aqueuses ou légèrement alcooliques, à doses réitérées, que l'aération et gu'une alimentation convenable. Rien n'est mieux. sans doute, que d'essayer de remédier à la septicémie par des inspirations de chlore, d'iode, d'alcool, etc., mais, malheureusement, la plupart des tentatives que j'ai faites à cet égard on été sans résultat saillant.

Il faut exciser ou amputer, dès son apparition, toute tumeur cancéreuse, et même toutes celles dont les caractères encore douteux rendent probable l'existence d'une telle dégénérescence. S'il est possible d'éviter que la lésion terrible dont il s'agit se reproduise, c'est, à coup sûr, en détruisant tout d'abord le mal qui commence et qui, le plus souvent, semble être primitivement local.

448. Maladies dues à des altérations du sang (anomémies) : miasmatiques, de cause contagiouse ou virulente. Utilité, dans de tels cas, des moyens hygiéniques.

Quant aux moyens de rémédier à l'altération du sang qui résulte actuellement de l'introduction dans ce liquide de divers poisons miasmatiques ou virulents dans le corps de l'homme, il y a des distinctions à faire.

Les maladies contagieuses dites générales ne peuvent être comprises qu'en les rapportant à des altérations primitives du sang produites par quelque iose ou virus; telles sont la variole, la rougeole, la scarlatine, le typhus, la peste, la suette, la flèvre jaune, le cholèra, etc.

Or, ces maladies, considérées en elles-mêmes et en faisant abstraction des états pathologiques et locaux qu'elles déterminent, sont produites par des agents tellement inconnus dans leur nature intime, et l'on sait si peu quels sont les moyens de neutraliser ces derniers que, dans l'état actuel de la science, personne de sensé ne songe à employer un traitement spécifique contre de telles individualités morbides. On en peut dire autant de toutes ces affections épidémiques dont on fait tant de bruit, et sur lesquelles on ne cesse de discuter.

# 478 · TOXÉMIE PALUDÉENNE; ÉLIOSÉMIE

sans avancer le moins du monde la solution des graves questions qui s'y rapportent.

Que les amateurs du bon vieux temps portent aux nues le nom de Sydenham et de ses admirateurs; qu'on discute sur les maladies populaires qui ont régné à différentes époques; qu'on étourdisse les gens avec les mots épidémies, endémies, maladies générales contagieuses ou infectieuses, ou encore avec ces expressions: diathèse, cachexie, etc., etc., mises actuellement si fort à la mode par la fantaisie, il n'en est pas moins certain que, contre les agents producteurs des affections dont nous parlons, il n'y a que des moyens hygiéniques à employer, et qui peuvent ainsi se formuler: respiration d'un air pur, boissons abondantes, aqueuses. acides ou alcooliques suivant les cas; alimentation proportionnée à l'état de l'organisme, exercice ou repos en rapport avec l'ensemble des circonstances que l'on est convenu d'appeler les forces; température variant suivant les climats et les symptômes, et surtout propreté minutieuse, qui préserve les malades contre l'action des matières septiques.

# 115. Altération du sang par l'éliose (4) ou miasme des marais (éliosémie).

Il est un agent, un miasme qui, tout mécomu qu'il est dans son essence, semble au premier coup d'œil devoir être combattu avec avantage par un médica-

<sup>1)</sup> Éloc marais; et de ioc miasme.

ment spécial; c'est le miasme des marais, ou éliose, dont je veux parler, et contre lequel on possède, dit-on, des médicaments spécifiques qui font au moins cesser la flèvre et les névropathies intermittentes auxquelles il donne naissance.

Ces médicaments sont le quinquina et ses principes vraiment actifs (1).

Or, évidemment le miasme des marais agit tout d'adord sur le sang et l'on prétend qu'un état morbide général et spécial, dit cachexie paludéenne, est le résultat de l'action de cette toxèmie éliosique.

On posséderait donc ainsi un spécifique, un neutralisant direct, contre les missmes marécageux et leur action.

(1) C'est de la quinine et la cinchonine que je veux ici parler. Il faut désormais ajouter à ces substances le sel marin à hautes doses, proposé par M. Scelle Montdézert, mais qui a l'énorme inconvénient de produire des vomissements ou d'autres accidents gastriques. Il con vient surtout de mentionner ici l'extrait d'une plante qui a été soumise à l'Aca!émie impériale de médecine par M. Armand, extrait dont j'étudie avec le plus grand soin depuis sept ans les très-remarquables effets. Ce médicament, aussi bien que la quinine à hautes doses et solubilisée par l'acide sulfurique ou l'alcool, fait presque instantanément (en 30 secondes), après son ingestion dans l'estomac, diminuer de quelques centimètres la rate et prévient le retour de la sièvre produite par l'éliose ou miasme des marais. C'est sur plusieurs centaines d'observations recueillies à l'hôpital de la Charité, à l'Hôtel-Dieu ou dans ma pratique particulière, et sur moi-même, que je me suis assuré du fait. L'extrait quinoide a été analysé par l'honorable membre de l'Académie M. Boudet : son avantage extrême est de ne pas donner lieu aux accidents cérébraux, aux étourdissements, aux oscillations nerveuses (névropallies), que causent les préparations de quinine. De plus, il est un peu moins désagréable à prendre que ne l'est la quinine, et il coûte moins cher.

## 446. Idée de la pathogénie des flèvres intermittentes.

Les faits détruisent complétement cette manière de voir. J'ai surabondamment prouvé, par des milliers d'observations de toutes sortes, que c'est la rate malade qui provoque les accidents fébriles; que le sang, altéré d'abord par le miasme des marais (éliosémie), exerce une action sur cet organe, qui devient malade et le plus souvent se tuméfie; qu'alors ce dernier donne lieu à une névropathie ou névropallie (oscillation nerveuse) dite accès fébrile, laquelle se renouvelle d'une manière périodique. J'ai démontré par le plessimétrisme et par tous les moyens possibles d'exploration et d'observation:

1º Que la rate saine diminue par l'emploi de la quinine et de l'extrait alcoolique de berberis; 2º que cet organe malade est dans le même cas; 3º qu'il est modifié et augmenté de volume avant les accès fébriles et pendant leur durée; 4º que la flèvre persiste tant que la rate est malade; 5º que cette flèvre ne reparaît plus dès que l'organe splénique est réduit aux quatre centimètres de l'état normal (1).

D'un autre côté, M. le docteur Fleury a démesurément prouvé que la rate et la fièvre se guérissent par les douches froides dirigées sur le côté gauche, douches qui, certes, ne remédient pas aux miasmes des marais, mais à l'affection splénique.

<sup>(1)</sup> Voyez le traité de plessimétrisme (nº 1007, 1008 et suivants.)

La prétendue cachexie paludéenne (altération du sang par le miasme paludéen) tient si bien à la maladie de la rate, et si peu à l'éliose, qu'elle se déclare à la suite des splenopathies produites par des causes organiques, telles que les tubercules et les abcès; qu'elle consiste dans la décoloration des globules du sang (hémosplénémie; leucocythémie de M. Bennett) et qu'elle cesse d'avoir lieu lorsque l'on a guéri la lésion de la rate.

## 447. Cachexie paludéenne. Moyens curatifs.

On ne possède donc pas de moyens dirigés contre l'altération du sang produite par le miasme des marais, mais on connaît des spécifiques contre l'affection splénique.

En dehors des moyens précédents de remédier aux fièvres intermittentes, les médications à la fois les plus simples et les plus rationnelles sont : 4° de s'éloigner des pays marécageux et insalubres ; 2° de ne pas s'exposer le soir à l'action des vapeurs qui s'élèvent de la terre ; 3° de combattre les frissons par l'élévation de la température et les sueurs par une atmosphère tempérée et par des boissons aqueuses ; 4° de chercher à couper les accès par quelques amers, par des douches, etc.; 5° de remédier à l'altération du sang par l'usage de sucs d'herbes, du fer et par une alimentation réparatrice.

448. Syphiosémie (altération du sang par le virus syphilitique, syphiose).

Il est une autre toxémie contre laquelle on possès

## 482 SYPHIOSEMIE, SYPHILIS CONSTITUTIONNELLE

des médicaments d'une extrême utilité; je veux parler de celle qui se déclare à la suite des affections syphiosiques. - Ces médicaments sont le mercure, l'iode et quelques autres substances dont je n'ai pas ici à parler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les moyens hygié. niques les plus simples suffisent le plus souvent pour prévenir le mal ou pour en rendre au moins les accidents et les conséquences peu graves. Le premier de tous est une propreté minutieuse, et les faits nombreux qui sont à ma connaissance, des données physiologiques de premier ordre, des inductions analogiques tout aussi graves me conduisent à admettre que le lavage avec l'eau pure, pratiqué de la manière la plus scrupuleuse, soit sur la peau, soit dans le canal de l'urètre, immédiatement après l'action qui est parfcis suivie d'écoulements ou d'ulcérations locales, et de phénomènes dits généraux, suffit pour éviter toute contagion.

C'est surtout quand il y a quelques déchirures aux organes exposés à cette contagion que la précaution dont il s'agit est utile.

Pendant la durée des accidents locaux, primitifs ou secondaires, les lotions très-fréquentes sont tout à fait indispensables, et il faut éviter avec le plus grand soin l'action de toutes les circonstances qui peuvent blesser ou irriter les parties malades. — Quant à la syphiosémie, ou maladie constitutionnelle, les boissons aqueuses abondantes, les bains, un régime substantiel, mais non pas trop excitant, sont encore d'une immense

183

utilité, ce qui n'empéche pas cependant, d'avoir repours aux médicaments externes et internes dont l'expérience a aussi constaté l'efficacité.

Autrefois, les mercuriaux étaient employés avec témérité et jusqu'à ce que la salivation se prononçat; de nos jours, les préparations hydrargyriques sont données avec discernement et ne sont en rien dangereuses : deux ou trois centigrammes de proto-iodure de mercure, administrés matin et soir sous forme de pilules, et continués durant un mois ou deux, ne constituent pas une médication dangereuse et peuvent être donnés sans crainte, alors même que l'on est dans le doute sur le caractère syphiosique des accidents.

113. Réflexions et conclusions relatives au traitement des altérations du sang, des maladies dites générales, des flèvres, etc.

Que l'on cesse donc, d'après ce qui précède, de médire contre ceux qui veulent étudier avec un soin extrême les désordres matériels et locaux qui sont les résultats terribles de l'action primitive de poisons, de virus, de miasmes, d'ioses que l'on ne connaît pas et surtout contre lesquels on ne peut opposer que des moyens bien simples et dont l'emploi dirigé par le bon sens est à peu près le même pour chacun d'eux! Que l'on étudie avec persévérance et avec une véritable instruction les états pathologiques et les symptòmes qui, dans des cas pareils, se déclarent consécutivement à ceux-ci et l'on ne sera pas embarrassé dans le choix des médications à employer; si l'on est loin de les

guérir toujours, au moins peut-on en atténuer la gravité, en abréger la durée et prévenir les complications dont ils sont la source. Si vous ne pouvez combattre de prime abord ce que vous appelez sièvre typhoïde, au moins vous conserverez fréquemment la vie des malades qui en sont atteints, en couvrant les éruptions de la région sacrée d'une couche de diachylum et de poudre de lycopode qui préviennent la gangrène des ulcérations qui sont la suite de cette éruption; ainsi en est-il de beaucoup d'autres phénomènes graves qui surviennent pendant la durée et à la suite de sièvres graves et de tant d'autres maladies dites générales.

Il faut considerer comme de ridicules banalités les discours de ces prétendus savants qui, après avoir parlé ou discute pendant des heures sur les maladies générales, sur les fièvres, sur les epidémies, sur les maladies infectieuses, etc., n'ont rien à dire lorsqu'ils arrivent à parler du traitement, si ce n'est que proclamer leur ignorance absolue de ce qu'il convient de faire pour s'y opposer, et d'avouer que l'eau, l'air et le régime sont, dans tous ces cas, les seuls remèdes auxquels on peut consciencieusement avoir recours.

#### CHAPITRE VI

#### MOTERS SIMPLES ET UTILES DANS LES AFFECTIONS DES VAISSEAUX SANGUINS.

120. Influence de la pesanteur sur la circulation en général.

Bien que Bichat et d'autres auteurs aient considéré l'organisation comme étant en partie soustraite aux lois physiques ordinaires, et qu'ils aient pensé que la vie était continuellement en lutte avec les lois de la nature inerte, il n'en est pas moins certain que la pesanteur influe d'une manière très-puissante sur les actes organiques propres à la santé et à la maladie (1).

L'établirai seulement ici quelques applications hygiéniques et thérapeutiques en rapport avec ce grandfait.

421. Elévation momentanée des bras faisant apprécier la force rèelle du pouls, ainsi que la proportion du sang qui circule, et l'énergie des contractions du cœur.

Toutes les fois que se présentent les grandes questions que voici : le malade a-t-il peu ou beaucoup de sang en circulation? peut-il subir sans danger une perte plus ou moins grande de ce liquide? quel est chez lui le

<sup>(4)</sup> Voyez mon mémoire sur l'influence que la pesanteur exerce sur le cours du sang; le procédé opératoire de la percussion médiate.

## 486 ÉLÉVATION DES MEMBRES GEDÉMATEUX

degré d'énergie de l'action du cœur, etc.? il est une expérimentation physiologique bien simple et bien inossensive qui donne presque toujours la solution des problèmes dont il s'agit.

C'est d'abord de bien constater l'état du pouls à l'avant-bras tenu abaissé, de bien apprécier sa force, sa résistance, le degré de plénitude que présente l'artère radiale; puis d'élever fortement ce même membre audessus de la tête; alors, si les proportions du sang qui circule sont suffisantes, si le cœur bat avec énergie, le pouls variera peu ou ne variera pas. Tout au contraire, s'il y a peu de sang, si l'action cardiaque est faible, vous verrez bientôt, dans la nouvelle position que vous aurez fait prendre à l'avant-bras, que l'artère deviendra dépressible au moindre contact et qu'elle soulevera avec difficulté le doigt qui sera appliqué sur elle.

On conçoit combien est grande l'importance de cette étude, et qu'autant il serait dangereux, dans le premier cas, de tirer du sang ou de mettre un malade à la diète absolue, autant il serait en général peu indiqué d'agir de la même façon dans le second.

422. Utilité de l'élévation des membres alors qu'ils sont tuméfiés ou œdémateux (hydrethmie). Congestion des poumons.

Toutes les fois que le corps reste longtemps dans la même position, il arrive que les parties situées vers le point le plus déclive se tuméfient. Ce fait a lieu par suite de l'accumulation du sang dans les vaisseaux, et

c'il consécutivement à la lenteur de la circulation, à l'actumulation des liquides séreux : soit dans les vascularités lymphatiques; soit dans la trame entière des
organes; soit enfin dans le tissu conjonctif. De là vient
que, si les pieds et les mains sont tenus quelque temps
abaissés, on voit les parties grossir et devenir violettes,
et les veines se dilater. De là vient encore qu'à la longué,
chez les gens faibles, âgés, et surtout chez les malades
atteints de quelque lésion génant le retour du sang, il
se manifeste un cedème (hydrethmie) des membres
tenus plus ou moins abaissés.

En vertu des lois précédemment établies, s'il arrive que l'on tienne élevées les parties tuméfiées ou engorgées par suite de leur position déclive, les phénomènes dont il s'agit se dissipent promptement.

Les dames de la cour de Louis XV savaient parfaitement tirer parti de ces faits, car, pour rendre plus blanche la peau de leurs bras et de leurs mains, elles ne manquaient pas de les tenir un moment plus hautes que la tête.

Ce qui est vrai, à cet égard, des extrémités du corps, ne l'est pas moins du tronc et des organes profonds. Quand on se couche toute une nuit sur le dos, la peau du siége, des reins, du dos, est, le matin, plus rouge et plus chaude que la veille; aussi voit-on les éruptions cutanées, les dermites, résultats des altérations du sang et produites par les virus de la variole (variose), de la rougeole (rubiose), de la scarlatine (scarliose), etc., être souvent plus apparentes sur ces régions des

#### 188 INFLUENCE PATHOLOGIQUE DE LA PESANTEUR

téguments que sur la partie antérieure du corps.

J'ai souvent tiré un grand parti de ce fait pour reconnaître dès le début quelle était celle de ces affections dont le malade était atteint.

Ces phénomènes extérieurs ont également lieu pour les organes profonds : ainsi, les poumons, lors du coucher sur le dos, se congestionnent en arrière et en bas (1).

Ainsi, les hémorrhoïdes se prononcent à l'anus à cause de la déclivité et de quelques circonstances d'organisation dont plus tard il sera parlé; ainsi les hémorrhagies sont favorisées par la position inférieure des organes où elles se déclarent, etc. Or, toutes les affections précédentes sont améliorées, ou se dissipent, alors que les parties qui en sont le siège sont tenues plus élevées que les autres organes.

C'est ainsi que l'on dissipe le gonfiement cedémateux des pieds en maintenant ceux-ci élevés sur des coussins, et que l'on remédie aux congestions des poumons par en bas en évitant, que les malades restent continuellement couchés sur le dos.

423. Faits remarquables de guérison obtenus par la position élevée des parties dans les hémorrhagies ou rhémies.

C'est par les mêmes raisons (et ceci est d'une immense utilité à savoir et à en tenir compte pour l'application) que, dans toute hémorrhagie (rhémie), on doit

(1) Mémoire sur la pneumonie hypostasique dans la clinique médicale de la Pitié 1852. chercher à remédier à l'écoulement du sang, en tenant élemés la partie d'où le liquide s'échappe.

Voici quelques cas dans lesquels l'application de ce précepte a été, pour les malades, d'un bien grand secours.

- 1. Un homme était depuis longtemps atteint d'un ulcère de la jambe en rapport avec des varices. Une grosse veine se rompit, et il en résulta une hémorrhagie excessive. Des évanouissements survinrent; il y avait longtemps que par une foule de moyens on cherchait à arrêter cette rhémie, et l'on n'y parvenait pes. Or, il me suffit d'élever la jambe malade au-dessus du niveau de la tête et du tronc placé dans la position horizontale pour que, sur-le-champ, l'hémorrhagie s'arrêtât.
- 20 Maintes fois, des écoulements sanguins considérables, syant lieu par des morsures de sangsues appliquées sur les membres, cessèrent brusquement, alors que je fis maintenir ceux-ci à une hauteur suffisante.
- 3° Des crachements de sang provenant du pharynx, des sosses nasales, n'eurent plus lieu dès que le malade, qui était couché, sur placé sur son séant, en même temps que les membres supérieurs et insérieurs étaient tenus pendants sur le bord du lit.
- 4° Un homme, à la suite d'une blessure de la main, eut l'arcade palmaire profonde divisée par un instrument tranchant; une énorme rhèmie en fut le résultat. On avait eu recours sans succès à la compression et à

190 PESANTEUR; THÉRAPISME; FAITS REMARQUABLES

divers moyens. Je maintins la partie blessée au-dessus de la tête au moyen d'un bandage convenable; une ligature fut placée sur le poignet et servit à maintenir une petite pelote, qui comprimait légèrement l'artère radiale. L'hémorrhagie fut subitement dissipée et ultérieurement il ne survint aucun accident.

5º Je suis persuadé que, lorsqu'il s'agira de blessures des artères radiale, cubitale, brachiale (au niveau du coude), tibiale, péronière, pédieuse, etc., les mêmes moyens pourront avoir une très-grande utilité.

t 6° Chez les femmes en couche, il m'a souvent suffi d'élever très-haut le bassin au moyen de coussins, pour voir l'hémorrhagie se calmer.

7º Un malheureux venait d'être foulé aux pieds par un cheval dont le fer avait porté sur le ventre; une hémorrhagie interne effroyable eut lieu. On avait eu l'imprudence de maintenir le blessé dans une position assise; cet homme semblait avoir perdu tout son sang; on ne sentait plus et l'on n'entendait plus les battements du cœur; il paraissait mort; je fis placer le malade dans une position horizontale, en même temps que la tête était abaissée; il revint sur-le-champ à la vie et le pouls se releva; des assistants stupides voulurent absolument remettre le malheureux agonisant sur le siége où il était assis !.... La mort eut lieu sur-le-champ (1).

<sup>(1)</sup> Mémoire sur l'influence exercée par la pesanteur sur le cours du sang et sur la syncope et l'apoplexie. (Procédé opératoire de la percussion médiate.)

134. Influence de la position et de la pesanteur sur les inflammations : penarie, érysipèles. — Rhumatisme articulaire aigu, pneumonite, encéphalite, etc.

Ce qui est vrai des congestions, des hémorrhagies (rhémies), he l'est pas moins des inflammations. Solt qu'il s'agisse d'une attaque de goutte ou de cette affection dite inflammatoire qui précède, chez les vieillards, la gangrène sénile des orteils ou des pieds, etc., (p. 50 et 51); soit que l'on ait affaire à cette dangereuse éruption qui, dans les flèvres dites typhoïdes, se déclare à la région sacrée (p. 49), ou encore à ces inflammations du doigt et de la main appelées panaris, ou même à ces phlegmasies de la peau, désignées sous le nom d'érysipèle, une des premières et des plus utiles précautions à prendre, est de tenir élevées et de maintenir dans cette position les parties frappées d'inflammation.

Il en est encore ainsi des arthrites ou phlegmasies des jointures.

J'ai établi ce fait dix ou quinze ans avant Gerdy, qui n'a en rien parlé de mon mémoire sur l'influence de la pesanteur et de celui que j'ai publié sur le rhumatisme articulaire aigu (1).

Il est tout aussi important de tenir compte de l'influence de la pesanteur dans la curation des inflammations viscérales que dans le traitement des conges-

<sup>(4)</sup> C: dernier travail fut donné par moi à M.Trousseau pour lui être agréable, et parut dans le premier n° du journal qu'il publiait alors.

## 193 ANÉVRYSME DE L'AORTE; PESANTEUR

tions ou des phlegmasies des organes superficiellement placés; c'est ainsi que, dans la pneumonite, il est d'une extrême utilité de faire placer habituellement le malade de telle sorte que son corps repose sur le côté opposé à celui où la lésion a son siège, et que dans les congestions ou les inflammations cérébrales (encéphalites, méningites, etc.), la tête doit être tonue très-élevée, en même temps qu'elle est soutenue par des coussins.

425. Anévrysme de l'aorte (aortasie) comprimant la veine-cave supérieure, reconnu pendant la vie au moyen du dessin plessimétrique et de l'auscultation. Soulagement du malade par la position.

Dans un cas aussi rare que remarquable, il arriva qu'un anévrysme de l'aorte (aortasie) comprimait la veine-cave supérieure, alors que le malade était couché sur le dos; il en résultait une stase sanguine et un engorgement œdémateux de la tête et des membres supérieurs, ainsi qu'une grande difficulte à respirer. Ces états pathologiques et les circonstances dont ils étaient accompagnés furent reconnus pendant la vie, grâce au dessin plessimétrique des organes, à l'auscultation et à l'étude des phénomènes existants; J'améliorai sensiblement l'état du malade, et je calmai la dyspnée en faisant incliner le corps de telle façon que la tumeur cessat momentanément de peser sur la veine-cave. (Traité de médecine pratique).

426. Ligatures des membres, respirations profordes dans les congestions et les hémorrhagies. Cas remarquables.

L'application des ligatures fortement serrées sur les

CONGESTIONS; HÉMORRHAGIES; LIGATURES 193 membres tenus pendants, c'est-à-dire sans être posés sur le sol, surtout alors qu'elle est accompagnée de profondes inspirations, est un moyen qui, momentanément, est aussi et plus puissant que les saignées pour arrêter les congestions, les rhemies (hemorrhagies), et pour couper court à la marche d'une phlegmasie. Le 6 janvier 1842, au moment de la visite, une femme de vingtquatre ans fut prise d'une énorme pneumorhémie. Elle rendait à chaque instant une proportion de sang tellement considérable qu'en une minute ou deux une cuvette en était à moitié remplie. Un râle affreux se faisait entendre. On allait prescrire une potion ainsi composée: 1 gramme de perchlorure de fer pour 100 grammes d'eau édulcorée avec un sirop, quand j'annonçai aux élèves qu'à l'instant même l'hémorrhagie allait être arrêtée par des ligatures fortement serrées sur les quatre membres tenus pendants, en même temps que je faisais pratiquer à la malade, malgré l'expectoration très-abondante de sang qui avait lieu, des inspirations très-fortes. On eut immédiatement recours à ces movens; en moins d'une minute l'écoulement de sang fut arrêté, et une heure après, la pneumorhémie n'avait pas reparu. Bientôt après la malade sortit guérie. Ce succès ne doit pas surprendre ; car, d'une part : les ligatures produisant un arrêt de sang dans les membres et remplaçant pour le moment les saignées, elles ne privent pas ultérieurement le malade du liquide nourricier; et, de l'autre, les grandes inspirations, en développant les poumons, y rendent la circulation plus

## 494 SAIGNÉES; PRÉCAUTIONS A PRENDRE

facile et remédient ainsi aux stases qui pourraient entretenir la pneumorhémie.

Quand la circulation est gênée, lorsque le cœur, le foie, sont dilatés par le sang accumulé, soit dans les cavités cardiaques, soit dans les vaisseaux hépatiques, la limitation et le dessin plessimétriques des viscères ont démontré qu'il suffit, pour ramener les organes à l'état normal, pour les faire diminuer de 2, 3 centimètres et plus, de faire pratiquer coup sur coup des respirations suspirieuses et très-profondes. J'ai déjà cité plusieurs faits dans lesquels des hémorrhagies nasales ont été arrêtées par ces mêmes moyens, dont l'emploi dans les congestions cérébrales est non moins utile; or, toutes les fois que les accidents plus ou moins graves d'hyperrhémie viendront à se manifester sur un malade, il y aure un avantage d'autant plus grand à se servir des médications précédentes que les procédés dont il s'agit n'ont rien de dangereux. On fera donc exécuter coup sur coup des soupirs très-profonds, qui, savorisant la circulation pulmonaire, et par suite le cours du sang, remédieront ainsi aux congestions et aux hémorrhagies qui peuvent survenir.

427. Avant d'avoir recours aux évacuations sanguines, il faut constater quelles sont les proportions du sang existant dans les organes.

Règle générale en pratique: avant d'avoir recours à une saignée, non-seulement il faut constater par le dessin plessimétrique si les organes circulatoires, respirateurs et hépatiques sont volumineux par suite de la BAIGNÉES; PRÉCAUTIONS A PRENDRE

105

prisence d'une grande proportion de sang, mais on dout escir recours: 1° aux ligatures fortement serrées, et cela pour apprécier l'effet actuel d'une perte momentanée de sang (on peut, en effet, dans ce cas, remédier à la déperdition actuelle du liquide sanguin en desserant les ligatures); 2° aux respirations profondes et accélérées qui rendent parfois la saignée inutile; 2° aux grandes ventouses, si l'on a le temps de s'en procurer.

Le gros ventre gêne la respiration, par la compression que l'estomac distendu et un abdomen volumineux exercent sur le cœur et sur les poumons; de là, un trouble énorme de la circulation et de la respiration; les accidents les plus graves en sont parfois les conséquences. C'est par cette raison que l'on voit tant de jeunes femmes qui ont la funeste habitude de se serrer la taille avec des corsets, être prises de dissicultés de respirer, qui cessent brusquement alors que l'on délace le malencontrenx vêtement qui les blesse; c'est par des causes analogues que chez les gens à gros ventre la marche ascendante est un exercice étouffant, et que chez eux surviennent aussi ces suffocations que des médecins légers ou peu instruits baptisent du nom d'asthme, nom auquel ils ajoutent le sobriquet: nerveux. Cette dernière épithète appliquée au hasard rappelle ce vers de Th. Corneille:

Ne savez-vous que dire, on prend sa tabatière.

Eh bien, il en est ainsi des mots nerveux, vital; quand on ne sait que dire, on les prodigue, et l'on s'en 196 INFLUENCE THÉRAPIQUE DE LA PESANTEUR
sert d'autant plus que l'on est plus ignorant dans l'art
d'interroger les organes ou trop paresseux pour y avoir
recours !

428. Importance de tenir compte en thérapeutique de l'influence de la pesanteur.

Que les influences de la pesanteur et de la compression sur les angiopathies ou maladies des vaisseaux ne soient jamais oubliées, car c'est en tenant compte des grands faits qui sont en rapport avec elles, que les personnes les moins instruites en anatomie et en médecine peuvent quelquesois conserver la vie à des gens qui périraient s'ils n'étaient secourus.

Qu'un homme, en effet, vienne à s'ouvrir une artère du bras, de l'avant-bras ou de la main, que le sang s'échappe à flots et que la mort par hémorrhagie soit imminente, il suffit de savoir et de se rappeler que le sang, dans les vaisseaux artériels, coule du centre vers la circonférence, pour que le bon sens conduise à établir au-dessous du coude ou à la partie supérieure du bras (suivant la partie d'où le liquide s'écoule) un lien circulaire fortement serré, servant à maintenir et à comprimer, soit sur la partie interne du bras, soit en avant de l'avant-bras, une pelotte épaisse faite en linge, en coton, etc., pour que la perte de sang cesse d'avoir lieu. Cette compression réussira d'autant mieux que le membre blessé sera tenu plus élevé par rapport au cœur.



## BLESSURES D'ARTÈRES; COMPRESSION INSTANTANÉE 197

136 Ms. Compression immédiate de la blessure dans le cas où une artère est ouverte.

N'oubliez jamais, alors qu'une artère, même d'un très-grand volume, est ouverte, que l'on peut arrêter, au moins momentanément, l'hémorrhagie, et par conséquent sauver la vie du blessé, en comprimant avec le doigt la plaie qui donne issue au sang. Voici un exemple bien remarquable de ce fait: M. C..., à Mantes, était monté sur une échelle et écussonnait un arbre ; il tenait à la main un couteau à pointe très-déliée; il le plaça tout ouvert dans le gousset de son pantalon, l'échelle se brisa; l'homme tomba et, dans sa chute, la pointe de l'instrument pénétra à huit centimètres audessous du pli de l'aine et sur le trajet de l'artère crurale; à l'instant, un jet de sang rouge s'échappa avec violence; le blessé eut la présence d'esprit de porter à l'instant même le doigt sur la petite plaie; le sang s'arrêta si bien que pendant trois jours une petite ecchymose de peu d'étendue existait seule à l'entour du point où le mal existait. Alors se manifesta une tumeur avec battement et laquelle prit successivement un volume considérable et n'était autre qu'une traumaortasie compliquée d'une communication avec la veine crurale (anévrysme variqueux). Cette lésion me fournit l'occasion de constater pour la première fois que les caillots durs contenus dans les anévrysmes présentent de la sonorité; tandis que les caillots mous donnent lieu au son et au tact hydriques. Cette grave lésion guérit radicalement

## 198 CAS D'ANÉVRYSMÉ CRURAL; GUÉRISON

sous l'influence d'une compression méthodique pratiquée au moyen de l'appareil employé par M. Broca et confectionné par M. Charière. Mon honorable collègue, M. le professeur Dénonvillier a soigné, conjointement avec moi, le blessé qui fait le sujet de cette observation Traité de plessimétrisme).

428 ter. Utilité de la flexion forcée de l'articulation du coude, dans les hémorrhagies de l'avant-bras et de la main.

« Malgaigne a montré que la flexion forcée ou complète de l'avant-bras sur le bras, en amenant la flexion à angle très-aigu de l'artère humérale au niveau du pli du coude et sa compression entre les muscles antérieurs de l'avant-bras et du bras, serrés alors les uns contre les autres, interrompt le cours du sang dans cette artère et par conséquent dans celle de l'avant-bras et de la main. Il faut donc, en cas de plaies de ces régions, faire fléchir fortement l'avant-bras du malade et lui faire garder cette position jusqu'à ce qu'on ait pu appeler un médecin qui jugera s'il faut lier l'artère coupée ou faire garder la position fléchie jusqu'à ce que toute crainte d'hémorrhagie ait disparu. » (Communication de M. le D<sup>r</sup> Lefort).

128 quaier. Influence heureuse de la position des membres dans les hémorrhagies.

Dans un cas remarquable, j'ai vu une hémorrhagie énorme survenue à la suite de la blessure d'une varice, être solidement arrêtée alors que le membre où le mal existait et surtout la plaie, ont été élevés d'un grand nombre de centimètres au-dessus du tronc et de la tête, Dans un autre cas, l'arcade palmaire profonde, fut coupée en travers; une hémorrhagie très forte avait lieu par la petite blessure existent à la paume de la main; tout aussitôt que j'eus fait élever le point où le sang s'écoulait au-dessus de la tête, la perte de liquide s'arrêta; cette position fut continuée; je joignis à ce moyen la compression de la radiale au poignet et le blessé guérit promptement sans qu'il eût été nécessaire de lier l'artère.

429. Morts causées par des applications de sangsues; moyens d'arrêter le sang qui coule de leurs morsures.

Le public, toujours imprudent, et qui a parsois plus de confiance dans son ignorance que dans le savoir réel de médecins consciencieux, applique sans hésiter des sangsues sur des gens exténués, sur des femmes hypémiques, sur des enfants débiles; il s'inquiète peu des hémorrhagies dont les morsures que font ces annélides peuvent être suivies. Deux fois en ville, une fois à l'hôpital, i'ai vu plusieurs fois succomber, à la suite d'application de sangsues que les malades s'étaient faites ou fait faire, des gens qui, certainement, ne seraient point morts si cette imprudence n'avait pas été commise. Il ne faut jamais employer ce moyen actif, sans consulter un homme instruit et sans avoir auprès de soi ou du malade des personnes capables d'arrêter l'évacuation sanguine; mais si cette indispensable précaution n'avait pas été prise, si le sang coulait en abon-

## 200 VARICES; POSITION ÉLEVÉE DES MEMBRES

dance des morsures, il suffirait de comprimer l'orifice de la petite blessure faite par l'annélide, soit directement avec le doigt, comme il vient d'être dit à l'occasion des blessures d'artères (p. 197), soit avec un bandage compressif qui maintienne de l'amadou, de la charpie, ou tout autre corps analogue, pour mettre un terme à l'écoulement sanguin que le médecin appelé arrêtera tout d'abord en cautérisant la petite plaie avec l'azotate d'argent et même avec le ser rougé.

430. Influence heureuse de la position élevée des membres dans les varices et les hémorrhagies veineuses.

Quelques affections des veines sont encore soulagées ou guèries par des moyens d'une grande simplicité. D'abord, quand des dilatations de ces vaisseaux (varices ou phlébectasies) sont douloureuses, il suffit, le plus ordinairement, de faire placer le membre où ces lésions ont leur siège dans une position horizontale ou même élevée par rapport aux autres parties du corps (1).

Sous l'influence de cette attitude, les vaisseaux cessent bientôt d'être distendus, et les douleurs se calment. La position dont il s'agit est même l'un des principaux moyens de guérir les ulcérations causées par les varices. C'est elle qui fait encore momentanément cesser le gonflement œdémateux qui survient dans les mem-

<sup>(4)</sup> En agissant ainsi, l'on ne verra pas survenir ces hémorrhagies mortelles causées par des varices rompues, comme l'a va le docteur Simpson (Édimbourg, méd. journ. n° 37, Courrier médical, 1865).

bres inférieurs à la suite des stases veineuses, et quand un vieillard, ou un individu affaibli, vient à avoir les jambes ensiées, c'est cette même attitude qui, continuée pendant quelques heures, remédie au moins momentanément à cette ensure.

#### 431. Diachylum et poudre de lycopode dans les varices.

Récemment, j'ai appliqué aux varices les idées qui m'avaient guidé dans l'emploi du diachylum et de la poudre de lycopode sur diverses parties du tégument ensammé ou excorié; en esset, sur des jambes en quelque sorte couvertes de tumeurs dues à des dilatations de veines ou phlébectasies, j'ai sait appliquer une couche très-épaisse de cet emplàtre recouverte de la substance pulvérulente dont il s'agit; or, j'ai été assez heureux pour voir que, dans des cas légers et bien que les malades ne gardassent pas le repos, je pouvais ainsi, non pas guérir les varices, mais les rendre beaucoup plus supportables et prévenir ainsi les ulcérations. Lors même qu'il n'existe encore que de très-légères excoriations, ce procédé est d'une extrême utilité.

La compression avec un bandage roulé, avec un bas lacé ou avec le caoutchouc et des tissus variés, employée contre les varices, peutêtre encorerangée parmi ces moyens simples et utiles qui permettent aux gens atteints de varices de vaquer à leurs travaux et préviennent les accidents graves qui résultent de la

## 202 VARICOGÈLE; DIACHYLUM

dilatation des veines sous-tégumentaires des membres inférieurs.

C'est de la même façon qu'agissent les suspensoirs dans la phiébectasie du scrotum, dite varicocèle. Ces moyens, comme le diachylum, forment une sorte de tégument artificiel qui remédie à la laxité de la peau, laquelle est une des principales causes de la dilatation des veines.



#### CHAPITRE VII

MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. — LÉSIONS DES LÈVERS.

182. Boutons de fièvre, herpes labialis des auteurs.

L'éruption inflammatoire qui, si souvent se déclare sur le rebord des lèvres, soit spontanément, soit à la suite d'un accès de sièvre, poursuit presque toujours. quoi qu'on fasse, sa marche ordinaire. Commençant par une rougeur legère, avec tuméfaction peu prononcée et démangeaison voisine de la cuisson, elle donne bientôt lieu à des vésicules plates, composées de plusieurs loges et remplies d'une sérosité souvent trouble. Ces vésicules, parsois confluentes, sont entourées d'un nimbe rouge. Quelques heures plus tard, elles ont acquis leur plus grand développement. Les jours suivants, la sérosité, en se desséchant, forme des croûtes brunes qui deviennent noires, restent adhérentes pendant près d'une semaine et tombent, à la fin, en laissant audessous d'elles une cicatrice rouge très-désagréable à voir.

En touchant, dès l'instant de son apparition, cette éruption avec l'azotate d'argent, on en abrége i

## 204 BOUTONS FÉBRILES DES LÈVRES; TRAITEMENT

la durée; mais ce remède est peut-être pire que le mal; car, d'une part, les escarrhes qui se forment à la suite de cette cautérisation sont encore plus noires que les croûtes développées par la succession ordinaire des phénomènes maladifs, et, de l'autre, elles se détachent tout aussi tard.

Il est un moyen bien simp'e qui réussit presque toujours, et que j'ai employé un grand nombre de fois sur les autres et sur moi-même: il consiste à pratiquer, tout aussitôt que la démangeaison et la rougeur qui marquent le début de l'éruption dont il s'agit se déclarent et sur les points de la peau où le mal a son siège, des onctions et des frictions légères avec l'huile d'amandes douces ou même d'olive. Si l'on renouvelle une dizaine de fois dans le jour l'emploi de ce moyen, on est sûr d'arrêter dans sa marche l'éruption fébrile des lèvres.

Il m'est cependant arrivé une fois de n'avoir pas eu à me louer de cette médication. Comme à l'ordinaire, l'éruption s'est arrêtée à la suite des onctions huileuses; mais la lèvre est restée rouge, tuméfiée, et c'est seulement à la longue et après un grand nombre de desquamations successives que les accidents dont il s'agit se sont dissipés.

Bien des gens citeront ce fait à l'appui des théories relatives aux causes cachées des fièvres et au danger d'arrêter les éruptions de la peau consécutives à l'action d'agents morbides inconnus; mais il est facile de leur répondre que, cent sois au moins, j'ai arrêté par des



#### PRINCIPAL DE LA COMORISSURE DES'LÈVRES

labiclie, alors qu'une seule fois l'éruption a passé à l'état chrenique, et que, par conséquent, dans ce dernier cas, ce n'était par parce que le mal primitif avait été arrêté, mais bien parce qu'il y avait eu quelque circonstance coïncidente, qu'un second état pathologique avait succédé au premier; il faut aussi leur dire que la personne qui éprouva cet accident, prenait trèsfréquemment une potion très-active de bicarbonate de soude qui entretenait probablement la maladie des lèvres que l'on n'avait pas eu le soin de nettoyer après avoir fait usage du sel sodique.

#### 433. Fissures de la commissure des lèvres.

Les éraillements qui fréquemment surviennent aux points où la lèvre supérieure se réunit à l'inférieure so guérissent avec difficulté; car les mouvements si nombreux et si fréquents qu'exécute le pourtour de l'orifice de la bouche font que, loin de se cicatriser, la moindre blessure des commissures labiales tend à devenir plus profonde et à produire une fente dont la formo s'oppose à la guérison. Si l'on abandonne ce petit mal à lui-même, presque toujours il dure fort longtemps, et sa persistance, due aux conditions physiques dont il vient d'être parlé, est trop souvent rapportée à l'action de causes virulentes qui fréquemment n'existent pas. Le moyen qui réussit le mieux, dans ce cas, est de toucher plusieurs jours de suite la fissure dont il s'agit avec l'azotate d'argent, ce qui n'offre pas 4

ger: mais, ce qui en a encore moins, c'est de recouvrir le plus souvent possible le petite excoriation avec un corps gras et solide, tel que la graisse de veau épaisse et consistante. Pour que co petit moyen réussisse, il faut avoir le soin d'empêcher la formation de croûtes sur la fissure et de les enlever par des lotions avec l'eau tiède, alors qu'elles existent.

434. Ulcérations des lèvres et de la bouche, aphthes, etc.

Avant de rattacher à des affections syphilitiques les ulcérations dont la membrane des lèvres ou des autres parties de la bouche est le siège, il faut, par un examen extrêmement attentif, rechercher:

- 4º Si quelque dent anormalement dirigée ne déchire pas la partie où existe le mal;
- 2º Si, comme il est arrivé à l'un de mes malades, une incisive ou une canine surnuméraire ne pousse pas de façon à entretenir une ulcération linguale que l'on guérit promptement en pratiquant une évulsion dentaire alors indispensable;
- 3º Si quelque dent altérée par la carie ou divisée par un accident traumatique, formant une saillie piquante à la suite de l'usure, de l'arrachement et de la chute de sa voisine, ne vient pas habituellement blesser, lacérer, la membrane muqueuse et causer ainsi l'ulcération buccale.

Les exceriations douloureuses auxquelles en a donné le nom d'aphthes, et que tant de gens à idées préconques rapportent à une cause interne incomprise sont, presque toujours, dues à des circonstances du même genre. Or, des moyens très-simples réussissent ici parfattement: le premier est de toucher légèrement la petile excoriation dite aphthe avec le crayon d'azotate d'argent. La membrane mince et superficielle qui se forme alors par la coagulation de l'albumine sur la surface de la petite plaie, empêche le contact de l'excoriation avec les autres parties de la bouche et fait cesser promptement la douleur. Le malade en est quitte pour la très-faible souffrance que cause l'attouchement qui a lieu, et qu'il faut renouveler quand la membrane accidentelle produite vient à tomber.

Les autres moyens de détruire les causes matérielles du mal à employer dans de tels cas soit de faire limer les inégalités et les saillies qui résultent de l'usure, de la carie, des vices de conformation naturels ou accidentels des dents, ou, encore, d'avoir recours à l'aurification (1), ou à l'évulsion des dents altérées, ou de recouvrir celles-ci avec la gutta-percha, etc.

435. Ulcérations de la langue considérées comme cancéreuses.

Mais c'est principalement aux ulcères de la langue que les réflexions précédentes sont applicables: elles le sont même à des ulcères de cet organe réputés cancéreux; et, sans vouloir en rien imiter ce faiseur fameux qui persuadait à toute la haute société qu'il guérissait le cancer, le puis sans crainte affirmer que,

<sup>(4)</sup> M. Préterre, dentiste, boulevart des Italiens, n° 39 aurifie dents avec une grande perfection, et a fait d'utiles travaux en

### 208 ULCÉRATIONS DE LA LANGUE; TRAITEMENT

dans deux cas, j'ai vu des ulcérations du bord de la langue ayant tous les caractères du cancer épithélial être radicalement guéries et sans récidive sous l'influence des soins dont le fait suivant servira à faire connaître les détails et à faire apprécier l'importance:

Un concierge de la rue de la Paix, qui me fut recommandé par le prince P. N., était atteint depuis deux ans d'une ulcération au côté gauche de la langue, près de sa pointe. Cette lésion présentait plus de deux centimètres de longueur et près d'un centimètre de profondeur; le fond en était grisatre et offrait l'aspect d'une fissure terminée par une petite surface d'une teinte sale. Les bords en étaient extrêmement inégaux, soit au point de vue de leur élévation, soit par rapport aux découpures de leur circonférence. La dureté de ces bords, à plus d'un centimètre de la solution de continuité, était extrême, et la douleur vive, les élancements qui avaient lieu, surtout au moindre mouvement de la langue, faisaient que, la salive coulant à flots, le malade ne pouvait la retenir. L'ensemble des organes et des fonctions n'indiquait point l'existence de la carcinémie (diathèse ou cachexie cancéreuse).

Depuis dix-huit mois, ce brave homme, avec une confiance qu'il n'aurait peut-être pas eu dans les soins d'un médecin instruit, ne manquait pas, chaque jour, d'aller se faire panser par un individu auquel il donnait de minces honoraires qui, répétés, avaient définitivement formé une somme considérable; et cependant le mal



ULCÉRATIONS DE LA LANGUE; TRAITEMENT 209 augmentait de jour en jour comme étendue, comme gravité et comme douleur.

Aussitôt que je vis le malade, je reconnus la cause organique de l'ulcération cancroïde dont il était atteint. Des dents très-inégalement rangées, usées ou cariées, se terminant par des pointes aiguës, des débris de racine extrêmement piquants, étaient situés justement en face de l'ulcère.

Je fis limer toutes ces aspérités et arracher quelques dents; tous les jours ou tous les deux jours, on cautérisa fortement, avec le crayon d'azotate d'argent, le fond de la fissure et la face interne de ses bords; en même temps, bien qu'aucun accident secondaire ou tertiaire ne se manifestât, l'iodure de potassium à la dose d'un gramme, et le proto-iodure d'hydrargyre, dans les proportions de trois centigrammes, pris à d'autres heures dans la journée, furent administrés.

Tout d'abord la douleur fut calmée et l'ulcère prit un aspect moins mauvais; bientôt l'amélioration fut on ne peut plus remarquable, et, trois mois après, ce malade, qui fut présenté à plusieurs reprises à ma clinique. était radicalement guéri.

J'avais recueilli, il y a bien des années, sur un employé des écuries du roi, un fait moins grave que celuici et dans lequel existait seulement une induration de la langue. Les mêmes moyens furent suivis d'un résultat aussi heureux.

Plusieurs autres cas de ce genre, mais moins accentués que les précédents, se sont présentés dans ma 210 SÉCHERESSE ET ENDUITS DE LA LANGUE

pratique. Ce serait tomber dans d'inutiles répetitions que d'en tracer ici l'histoire.

436. Endaits des dents et des autres parties de la bouche. Etats pathologiques auxquels ils donnent lieu.

J'ai publié en 1837, dans le Procédé opératoire de la percussion, reproduit dans le Traité de diagnostic n° 1455, et dans le Traité de médecine pratique, un mémoire sur les enduits de la langue et des autres parties de la bouche, dans lequel j'ai démontre expérimentalement et cliniquement que c'est au desséchement de la salive qu'est due la formation des couches pultacées, variables par la teinte et par l'épaisseur, qui recouvrent si fréquemment, non-seulement la surface de la langue, mais encore le palais, les dents naturelles ou artificielles et les lèvres.

L'importance de ce fait est tellement grande qu'elle détruit presque complétement certaines théories relatives aux fièvres muqueuses, bilieuses et adynamiques, Ce n'est point ici le lieu de m'occuper de ces graves questions.

Je me bornerai à faire quelques annotations sur l'utilité de remédier aux états pathologiques que les enduits dont il s'agit peuvent causer.

436 bis. La sécheresse de la langue empêche de parler. On prend souvent cette difficulté de la parole pour un symptôme d'affection cérébrale. En humectant la langue, le médecin qui connaît un tel fait rend tout d'abord au malade la possibilité d'articuler les sons vocaux.

Lorsque, dans les fièvres graves, dans la pneumonie,

la pharyngite aiguë, il arrive que, la bouche étant béante, la langue se couvre ou non d'enduit, se dessèche par suite du passage continuel de l'air; alors les mouvements de cet organe sont rendus très-difficiles, et quand on interroge le malade, son hésitation est telle qu'on le croirait paralysé par suite d'une céphalopathie. Que de médecins trompés par ces apparences, ont dans ce cas, administré du musc, du camphre, de la belladone, pratiqué des saignées, appliqué des sangsues, des vésicatoires, ont prescrit des assusions froides sur la tête, tandis qu'il eût suffi, pour rendre la parole libre, de tenir la langue humectée. Bien des fois, à ma clinique, et au grand étonnement des élèves, un tel fait ne s'est-il pas renouvelé. Une éponge fine trempée dans l'eau froide et placée dans la bouche du malade, le nettoiement et les lotions fréquentes de la langue préviennent le retour du fâcheux symptôme dont il vient d'être parlé.

437. Enduits de la langue causant la perte d'appétit, le dégoût pour les

Toutes les fois que la langue est couverte d'enduits épais, qu'ils soient blancs, jaunes, verdâtres, bruns où noirâtres; qu'ils aient une odeur fétide, nauséabonde, putride, etc., ils altèrent ou ôtent le goût des aliments et, par suite, empêchent l'appétit de se développer. — Il arrive même qu'ils provoquent des vomissements.

Ces enduits se forment surtout sous l'influence de l'accélération ou des troubles de la respiration qui con-

duisent les malades à respirer par la bouche. Ce qui est vrai des enduits de la langue l'est aussi de ceux qui recouvrent le palais et son voile, les dents et la membrane buccale.

C'est donc une précaution de première nécessité que de nettoyer, le matin, sur les malades et même sur les gens bien portants, les diverses parties de la bouche.

Les moyens suivants suffisent pour obtenir ce résultat.

Une brosse à dent assez dure, imprégnée de suc de citron et de créme de tartre (tartrate acidule de potasse), enlève parfaitement les enduits de la langue et du palais, qu'il faut nettoyer aussi le plus exactement possible avec la poudre suivante: crême de tartre, huit parties; alun calciné, une partie; laque carminée, une partie; huile essentielle de menthe, une goutte; cette poudre réussit parfaitement à enlever le tartre des dents.

Le tartre dentaire est formé par les enduits de la bouche que la dessiccation a complétement indurés. Il a les plus grands inconvénients relativement à la conservation des dents. Les inégalités de ces sialithes (pierres, concrétions salivaires) forment des saillies anguleuses qui (de la même façon que les calculs urinaires blessent les reins, l'urètre et la vessie), dilacèrent les gencives, d'où résultent de la rougeur, de la douleur, la formation de pus, des périosties alvéolaires on dentaires qui sont trop souvent les causes de la carie et de la chute des dents.

C'est danc une précaution hygiénique de la plus grande utilité d'enlever chaque matin avec un instrument spécial ou avec un cure-dents, le tartre (sinitithe) qui se trouve déposé entre les dents et le rehard de la gencive.

## 🕰 Ologes de la houche. Morvoire balaine.

La mauvaise haleine peut dépendre :

- 4º D'ulcérations du nez ou de la carie de ses os, etc., Cabcès, de maladies des sinus, etc ;
- 2º D'affections variées du conduit sérien, de cavernes et de gangrènes pulmonaires.
- P Des enduits de la langue, de la bouche, ou enfin de la carie deutaire.

Nous n'avons ici à nous occuper que des vapeurs fétides dont la bouche est la source.

En enlevant les enduits, comme il vient d'être dit, et surtout en aurifiant et, au besoin, en faisant pratiquer l'extraction des dents cariées, on détruit complétement la cause la plus ordinaire de la fétidité de l'haleine, c'est-à-dire les états de la bouche qui y donnent lieu.

429. Inflammation des glandes salivaires, par suite de la lésion des orifices de leurs conduits excréteurs.

Les dents cariées et inégales, les enduits salivaires putrides ou desséchés déposés et indurés sur les dents et sur la surface interne des joues, causent parfois des ulcérations ou des inflammations dangereuses, situées dans la bouche et au niveau des orifices des conduits

#### 214 INFLAMMATIONS, ABCÈS DE LA PAROTIDE.

salivaires excréteurs des glandes (parotides maxillaires et sublinguales). Ces inflammations se propagent vers la profondeur des canaux salivaires, jusqu'aux acini eux-mêmes; les produits phlegmasiques exhalés de ces vaisseaux bouchent ceux-ci; la salive ne s'écoule plus en dehors, les acini se remplissent de liquide, la circulation s'y trouble, l'organe sécréteur se distend, le mal s'étend au tissu conjonctif périphérique des glandules; du pus se forme; il sort alors en très-petite proportion par les conduits excréteurs; la glande n'est plus bientôt qu'un vaste abcès; la pyémie par résorption se déclare, et très-souvent elle est suivie de la mort.

440. Observations remarquables à l'appui des propositions qui précèdent.

Une femme de mon service, salle Sainte-Anne (1864), était atteinte d'une parotidite considérable. Je fis remarquer aux élèves ce fait important, qu'une goutte de pus s'écoulait par l'orifice du conduit parotidien, et que des frictions pratiquées avec le doigt sur le trajet de ce canal, ainsi que des pressions exécutées sur la glande, en faisaient sortir davantage. Quelques jours après, un second cas de parotidite se présenta encore. Un élève externe du service, à la fois studieux et intelligent, M. Carbonel, se ressouvint du cas précédent et de la leçon que je venais de faire sur ce sujet; il examina l'orifice du conduit salivaire de Stenon. Cet orifice contenait du pus que je fis écouler en abondance par des pressions et des frictions; je cherchai, comme

je l'avais fait pour la première malade, à faire pénétrer un stylet mince et boutonné dans le canal salivaire, mais je ne pus mettre le temps nécessaire pour y parvenir. Je priai MM. Proust et Carbonel de réttérer ces tentatives, et ils firent pénétrer l'instrument dans le conduit. Cette opération ne réussit pas à arrêter le mal, et très-peu de pus s'écoula. La masse entière de la parotide, bientôt détruite, ne devint qu'un abcès multiloculaire. Une pyoîte secondaire eut lieu sous le muscle sterno-mastoïdien; la fièvre et la pyémie se manifestèrent, et malgré les plus grands soins, la malade succumba. Malheureusement, comme cela était arrivé pour la première, le corps de cette femme fut enlevé sans qu'une nécroscopie suffisante pût être faite.

#### 141. Remarques sur les observations précèdentes.

Ces deux faits ont été publiés dans la Gazette des hôpitaux (mars 1864). Il doivent être ajoutés à des observations semblables dont j'ai fait mention dans le Traité de médecine pratique. En rapprochant ces cas les uns des autres, en les éclairant par des considérations anatomiques, physiologiques et pratiques, sur les glandes en général, sur leurs fonctions, leurs maladies, etc., il devient évident que les parotidites sont trèssouvent, si ce n'est constamment, les résultats de l'obstruction par l'inflammation ou de la simple emphraxie de la partie de l'angiosiale (appareil salivaire), qui s'étend des acini jusqu'à l'orifice d'excrétion.

De la même façon qu'une glandule de la peau dont l'orifice est bouché se distend par la sérosité (kyste aqueux), par la graisse (tannes), etc., de la même manière encore que la phlegmasie de l'urêtre et des vésicules séminales est suivie de maladies aiguës du testicule, ou encore que la glande mammaire qui sécrète du lait et dont les conduits sont bouchés, se tuméfie et finit par s'abcéder au-dessus des vaisseaux oblitérés ; ou qu'une hépatémie, une hépatite, se déclarent à la suite de la rétention de la bile causée par une obstruction du canal cholédoque, la glande parotide, lorsque l'angiosiale n'étant plus libre s'enflamme et suppure, la salive s'accumule au-dessus de l'obstacle et distend les conduits d'excrétion; alors les acini qui ne cessent de sécréter le liquide, deviennent le siège d'une inflammation pyogénique (génératrice du pus), qui est suivie de la destruction de la glande, d'abcès et de pyémie.

142. Les parotidites ne sont pas des phénomènes critiques ou des effets de l'action médicatrice de la nature.

On a longtemps émis, et beaucoup de médecins l'admettent encore, que les parotidites ou, comme ils le disent, les parotides sont des accidents utiles, critiques et que la bienveillance nature fait pour le salut des malades. Étrange et funeste manière de voir, qui fait ranger au nombre des symptômes avantageux des lésions trop souvent suivies de la mort! Il faut absolument que les hommes de science abandonnent des théories aussi ridicules, et qu'ils pensent plutôt aux moyens de préve-

nir de tels maux et d'y remédier que de se complaire dans des systèmes pareils, dont le progrès a fait justice.

#### 443. Traitement préservatif et curatif de la parotidite.

Les principaux moyens préservatifs de traitement de la parotidite sont tellement simples et rationnels, qu'à peine est-il besoin de les indiquer; ils consistent à tenir chez les malades, les fébricitants, les gens atteints de pneumonie, de ceux surtout dont le sang couenneux pourrait déterminer des caillots de lymphe plastique dans l'angiosiale, etc:, à tenir, dis-je, la bouche dans un état de propreté extrême, à enlever à mesure qu'ils se forment, les enduits salivaires sur les dents, les lèvres, la langue, à éviter leur desséchement, à faire ' en sorte qu'ils ne se pourrissent pas; car ils pourraient alors donner à l'angiosialite ce caractère septique si grave qui est une cause puissante de l'extension de l'inflammation pyogénique ou érésypélateuse dans les parties où elle existe. Faire arracher les dents cariées et inégales qui, situées au niveau de l'orifice du conduit parotidien, pourraient le blesser, est encore une précaution de premier ordre et qu'il ne faut pas négliger sur les malades qui sont exposés aux parotidites. Nettoyer les orifices des conduits salivaires du pus qu'ils peuvent contenir; les sonder, s'il est possible de le faire; évacuer le pus par des pressions et des frictions; au. début, avoir recours à des applications locales de sang



## 218 PAROTIDITE; TRAITEMENT

sues et de cataplasmes; tels sont les principaux moyens à employer dans la curation des angiosialites qui viennent d'être mentionnées. Les médicaments, quels qu'ils soient, auraient ici bien peu d'utilité.

## CHAPITRE VIII

MOYENS SIMPLES ET HYGIÉNIQUES APPLICABLES AUX MALADIES DE L'ESTOMAC; GASTROPATHIES OU GASTRIES.

144. Généralités sur la gastrite, la gastralgie, la dyspepsie, etc.

Sous le nom de gastrite, Broussais comprenait la plupart des souffrances de l'estomac, qu'il considérait ainsi comme des inflammations. C'était la une grande erreur qui fit beaucoup de mal, mais qui reposait en partie sur ce fait positif, que dans un grand nombre de cas l'estomac est malade, ce qui ne veut pas dire qu'il soit enflammé. La science et le temps ont fait justice des idées exagérées que l'École du Val-de-Grâce se faisait de l'inflammation et de la gastrite: mais ils ont consacre cette grande et utile vérité, que les symptômes collectionnés sous le nom de maladies, sont les résultats de lésions et de troubles fonctionnels des organes.

Il a fallu bien des années pour que la croyance à la gastrite sût abandonnée par les médecins et par le public lui-même, qui avait largement adopté la théorie de Broussais. Actuellement encore, beaucoup de gens dont les digestions sont laborieuses ou qui souffrent de l'estate.

tomac, admettent et affirment avec opiniâtreté qu'ils sont atteints de gastrite.

Certes, dix-neuf fois sur vingt, les douleurs dont l'estomac est le siège sont très-loin d'être des inflammations; elles reconnaissent, en effet, des causes organiques très-variées dont chacune détermine des phénomènes divers et nécessite un traitement particulier.

Les médecins qui suivirent Broussais, tombèrent dans d'autres exagérations non moins déplorables que celles qu'ils reprochaient à ce grand homme. Oubliant que la douleur est, en effet, commune à des lésions très-diverses et qu'elle ne peut être heureusement et radicalement combattue que par des moyens dirigés contre ces mêmes lésions, ils considérèrent le symptôme douleur comme une maladie à laquelle ils assignèrent une nature nerveuse. La gastralgie remplaça la gastrite, et les narcotiques, les antispasmodiques, etc., employés dans des cas très-différents les uns des autres, ne réussirent pas mieux que ne l'avaient fait les sangsues, la diète, l'eau et les cataplasmes.

Plus récemment, voici que les souffrances de toutes sortes dont l'estomac peut être le siège, et dans lesquelles la digestion est laboricuse, ont été désignées sous le nom commun de dyspepsie, terme construit d'après les principes de la nomenclature organopathologique et qui signifie difficulté de la digestion. Or, il est une multitude d'affections dans lesquelles la digestion se fait laborieusement, lentement, avec douleur; et comme ces affections si variées réclament chacune un

traitement différent, il est impossible d'assigner un mode de curation spécial à la dyspepsie ou mauvaise digestion.

Il résulte, de ce qui précède, qu'il est indispensable, alors qu'il est question de prescrire ce qu'il convient de faire contre des douleurs d'estomac et des digestions difficiles dites dyspepsie, de déterminer les caractères principaux des diverses souffrances gastriques contre lesquelles tel ou tel traitement est indiqué.

### 445. Digestions difficiles dues à un mauvais régime.

Bien des gens souffrent de l'estomac parce qu'ils prennent trop d'aliments à la fois; et qu'ils distendent cet organe outre mesure. Dans un tel cas, le moyen principal à employer est de diminuer les proportions de nourriture prises à chaque repas.

## 446. Gastralgie, vomissements, suites d'une alimentation insuffisante.

Beaucoup de gens, et particulièrement les femmes, souffrent de l'estomac et ont des digestions difficiles parce qu'ils ne prennent pas chaque jour une proportion d'aliments suffisante. Très-généralement, des médecins même instruits ne tiennent pas assez compte de ce fait. Lors donc que l'on est atteint de gastralgie, ou de difficulté de digestion, et que l'on a contracté l'habitude de ne faire usage que d'une nourriture insuffisante ou de mauvaise qualité, il faut essayer de chan-

## 222 ALIMENTATION INSUFFISANTE; DYSPEPSIE

ger de régime, faire usage d'aliments réparateurs en proportion convenable, et dans les cas qui viennent d'être indiqués, la guérison suit de près cette modification dans la manière de vivre. J'ai vu un très-grand nombre de faits de ce genre, et actuellement j'ai sous les veux une dame qui vomissait tout ce qu'elle prenait et que j'ai ramenée à la santé, en la forçant en quelque sorte à manger. Remarquons à cette occasion que des vomissements surviennent parsois à la suite de l'ingestion première des aliments, et que ce n'est pas toujours là une raison suffisante pour que l'on renonce à l'alimentation. Très-fréquemment il arrive, dans des circontances semblables (et alors qu'il n'existe pas de lésions organiques), que, si l'on fait prendre des potages, des bouillons concentrés, ou même du pain immédiatement après le vomissement, ces substances sont conservées et se digèrent plus ou moins bien. Ailleurs, il y a des personnes qui vomissent les aliments liquides, tandis qu'ils conservent les solides, et d'autres rejettent tels mets et digèrent facilement tels autres; l'estomac semble quelquefois être capricieux et préférer, pendant un certain temps, la nourriture qu'il ne supportait pas les jours suivants. Ce sont là des choses qu'il faut savoir, dont il est très-utile de tenir compte en pratique. et qui doivent éloigner des opinions systématiques et des préceptes trop généralisés. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en maladie comme en santé, il faut des aliments pour vivre et que l'immense faute de soumettre longtemps les malades à une abstinence absolue

REPAS AVANT LA FIN DE LA DIGESTION; DYSPEPSIE 223
est, comme je l'ai prouvé en 1827, dans mon Mémoire sur
l'alimentation insuffisante et sur ses dangers, une pratique déplorable qui ferait périr le malade, alors que la
maladie primitive viendrait à l'épargner (1).

D'autres (et ceux-ci sont en très-grand nombre), seconformant plutôt aux usages et à leurs goûts qu'à l'hygiène et à la raison, n'attendent pas qu'une digestion soit finie avant d'en commencer une autre; le retour de l'appétit n'est pas pour eux l'indication de manger; mais c'est l'habitude et l'heure qui les engagent à prendre de nouveau des aliments Le remède à ceci est bien simple: c'est de ne se meutre a sable qu'alors que l'on a faim.

446 bis. Viandes crues, viandes crues hachèes, sang, leur mélange avec des végétaux les rendent supportables.

Depuis un temps immémorial on a cherché à nourrir les personnes affaiblies avec des viandes à moitié cuites, dites saignantes. Des médecins qui ont trouvé singulier que je prescrivisse comme aliment, de la substance nerveuse à des malades débilités, ou du phosphate de chaux à des gens dont les os ramollis contiennent moins de sels calcaires que dans l'état normal, non-seulement ont fait prendre aux individus dits cachectiques, de la viande crue, mais encore du sang liquide. Ils peuvent avoir agi ainsi avec quelque utilité

<sup>(4)</sup> Procédé opératoire de la percussion médiate, Traité de médecine pratique.

224 VIANDES HACHÉES, MÉLANGÉES AVEC DES VÉGÉTAUX

pour les malades. Or, il est un procédé très-utile, soit pour remédier à l'insupportable dégoût qu'inspire une telle nourriture, soit pour ajouter à celle-ci des végétaux, dont l'emploi réuni à celui des substances animales, présente un extrême avantage. Ce procédé consiste à faire hacher les viandes crues les plus succulentes et à les faire mélanger avec de l'oseille ou des épinards bouillis, ce qui en rend l'emploi beaucoup moins désagréable. Dans un assez grand nombre de cas et surtout chez les femmes névropathiques et hydrémiques, j'ai tiré parti de cette précaution, car sans elle on ne pouvait faire prendre à de telles personnes les viandes qui leur étaient utiles.

147. Absence des dents, causes de gastropathie. Nécessité de les faire remplacer.

Il est un grand nombre de personnes dont les dents détériorées ne permettent pas de triturer suffisamment les aliments dont elles font usage, et d'autres encore qui avalent sans se donner le temps de mâcher la nourriture.

On peut dire aux premtères: Faites-vous placer des dents artificielles parfaitement disposées, et telles que M. Préterre ou tout autre dentiste très-habile les dispose, et vous pourrez triturer davantage la nourriture dont, vous faites usage, ce qui fait que la digestion, s'accomplissant mieux dans la bouche; s'effectuera complètement dans l'estomac, et recommander aux secondes de se corriger de leur mauvaise habitude.

448. Boire peu pendant le repas favorise quelquefois la digestion.

Il résulte des faits constatés par Magendie, que l'action de l'estomac devient fort difficile, alors que pendant le repas on ingère une proportion considérable de boissons aqueuses. Ce grand physiologiste, qui n'a eu que le tort de ne pas appliquer à l'hygiène et à la thérapie les importantes recherches auxquelles il s'est livré, a remarqué que la plupart des animaux ne boivent jamais à l'époque où ils prennent de la nourriture. Eh bien! on voit aussi que l'homme qui prend pendant ses repas beaucoup de boissons aqueuses, perd l'appétit et digère fort mal; souvent, au contraire, les aliments secs ou presque secs se chymifient parfaitement et ne sont pas vomis, tandis que des bouillons ou toute autre substance liquide ne peuvent être supportés; de là le conseil, dans certains cas de dyspepsie, de se priver de boissons, et l'espoir d'obtenir les avantages que j'ai souvent tirés, dans de tels cas, d'une alimentation fournie par des substances solides ou demi-solides.

449. Vomissements provoqués par des boissons aqueuses abondantes, et par l'excitation du pharynx lors de l'extrême réplétion de l'estomac par les aliments, et lors encore de la présence dans ce viscère de substances vénéneuses.

Un homme, après avoir mangé copieusement, éprouve une gastralgie extrême : le plessimétrisme (4) prouve

<sup>(4)</sup> Traité de la percussion médiate, 4827. Traité de plessimétrisme. 4866.

que l'estomac contient une grande quantité de matières demi-solides ou liquides. Le premier moyen à employer pour obtenir du soulagement, ou même la disparition de la douleur, est de solliciter le vomissement en introduisant un doigt ou une plume dans le pharynx, et en secondant ce moyen si simple par l'administration à haute dose d'eau tiède ou d'un thé léger.

Ce remède, qui est entre les mains de tous, est applicable aux cas dans lesquels une substance vénéneuse, telle qu'un poison métallique (arsenic, oxyde de cuivre, etc.), ou vétégal (narcotiques de toutes sortes, champignon, alcool, opium, digitale, belladone, datura, etc.), est introduite dans l'estomac et y cause de la douleur: c'est même là, il faut bien se le rappeler, la médication principale dans tout empoisonnement produit par des substances délétères ingérées dans la partie supérieure du tube digestif. En esset il arriverait le plus souvent qu'avant qu'il eût été possible de se procurer les agents chimiques propres à annihiler l'action du poison, celui-ci ait produit d'irrémédiables lésions.

Le lait, l'huile, pris à hautes doses et de manière à faire vomir, peuvent remplacer l'eau; mais la chose principale, ici, est de laisser le doigt ou la plume long-temps introduits dans le pharynx, même pendant que l'on vomit; on force de cette façon l'estomac à se débarrasser de toutes les matières qu'il contient, et l'on doit ainsi continuer jusqu'à ce qu'après des vomissements répétés, le plessimétrisme apprenne que

dont il s'agit est vide ou ne contient

l'organe dont il s'agit est vide, ou ne contient que de l'air.

450. Présence des gaz ou de l'air dans l'estomac, cause de gastralgie (gazo et aéro-gastralgie).

Une variété de dyspepsie (digestion difficile) résulte fréquemment du dégagement et de la présence habituelle de beaucoup de gaz dans l'estomac. Il est souvent possible de remédier à cet accident lié à des circonstances légères ou graves de régime ou d'organisation, en combattant ces circonstances. L'accumulation de gaz dans l'estomac, facile à reconnaître par le plessimétrisme (1), cause la douleur par la distension qu'elle produit et par les mouvements des fibres musculaires gastriques; la contraction provoquée par cette accumulation est souvent sentie par la main portée sur l'épigastre. Les causes d'une telle lésion sont variées et leur connaîssance conduit à employer des moyens simples et utiles pour y porter remède.

Un officier de gendarmerie de Rambouillet avait habituellement l'estomac extrêmement distendu par des gaz qu'il avalait en abondance sans qu'il s'en aperçût. Il les rendait ensuite à chaque instant avec un bruit désagréable même à lui et insupportable aux assistants. Des hommes d'une haute capacité et d'une instruction réelle avaient appelé tympanite nerveuse cet

<sup>(1)</sup> Voyez le Traité de plessimétrisme, 4866.

#### DÉGLUTITION D'AIR; DYSPEPSIE

228

état pathologique. La percussion (1) et l'auscultation de l'œsophage en arrière me firent reconnaître la nature du mal, et il me sussit de faire comprimer le larynx sur le pharynx au moyen d'une pression exercée sur le cou pour rendre impossible la déglutition de l'air et pour guérir.

L'accident éprouvé par M. X... est plus fréquent qu'on ne le pense, fait qui conduit à dire que, lorsqu'il s'agit de souffrances gastriques, il faut que le malade fasse attention à ne pas avaler de l'air. Mais dans des cas bien plus nombreux, alors que l'on a constaté que l'estomac contient abondamment des gaz, on peut en favoriser l'evacuation: 1° en faisant placer le patient dans une position assise, la tête étant inclinée en avant; 2° en faisant pratiquer des frictions sur le creux de l'estomac, soit avec la main nue, soit avec des linges chauds, etc.

451. Gastralgie, dyspopsie, suite de la compression de l'estomac par les vêtements, les corsets, etc.; corset hygiénique.

Il est une sorte de gastralgie qui résulte de la compression de l'estomac par une ceinture ou par un corps quelconque. C'est particulièrement chez la femme que cet accident est fréquent; un corset trop serré et surtout un busc qui forment, au devant du viscère rempli d'aliments ou de gaz, une plaque inextensible, gênent

<sup>(4)</sup> C'est l'étude attentive de ce malade qui m'a conduit à faire l'application de l'auscultation du plessimétrisme aux maladies du conduit œsophagien.

compression de l'estomac; corsets; dyspersie 229 infiniment l'accomplissement du travail digestif et présente d'extrêmes inconvénients. Malheureusement, les conseils du médecin, dictés par l'expérience, la raison et les faits, sont ici d'un bien faible poids, lorsqu'ils ont à combattre le caprice et la mode.

Certes, dans des cas pareils, où les organes respiratoires ne souffrent pas moins que le tube digestif et alors que le diaphragme ne peut facilement s'abaisser, la plus simple prudence exige que l'on conseille de ne pas porter de corset, et surtout d'éviter l'usage d'un busc quel qu'il soit ; mais si cette déplorable habitude ne peut pas être surmontée, si un sentiment de coquetterie mal entendue ne fait pas justice de ce vêtement dangereux, il est possible d'en atténuer les inconvénients, en faisant porter un corset spécial que j'ai proposé, et dont le busc est tellement disposé qu'il est ouvert sur la ligne médiane au niveau de l'épigastre et qu'il forme une large ouverture où l'estomac vient se loger lors de sa dilatation, et où les viscères trouvent place, alors que le diaphragme s'abaisse. Avec ce corset, que j'appellerai hygiénique, la femme ne sera plus exposée à ces étouffements, à ces évanouissements qui surviennent fréquemment à la suite du repas ou de son séjour dans un lieu échauffé et où l'air est impur : elle ne sera plus dans la nécessité de faire desserrer les liens qui l'emmaillottent de telle façon que la syncope complète en est quelquefois le résultat.

152. Acides dans l'estomac (pyrosis, oxygastrie), causant la gastralgie, la dyspepsie, le ramollissement de cet organe; exaspérant le cancer gastrique, etc.

Dans un nombre très-considérable de cas, les douleurs gastriques et la dyspepsie qui s'y joint, sont dus aux acides que contient l'estomac. La vieille médecine désignait de tels états pathologiques sous les noms absurdes de fer chaud, de pyrosis, et l'on voulait exprimer par ces mots que les malades qui sont sujets à ces accidents éprouvent une sensation brûlante, soit à l'épigastre, soit au pharynx ou dans la bouche.

Il en arrive principalement ainsi alors qu'au moment de l'éructation, des liquides acides remontent de l'estomac vers l'ouverture supérieure du conduit alimentaire.

Dans l'état sain, ce même estomac contient toujours des acidités dont la sécrétion muqueuse, la salive acidifiée ou d'autres substances sécrétées sont les sources.

Chez certaines personnes, et cela très-communément, les liquides acides dont il s'agit exercent sur la membrane muqueuse et sur les aliments une influence très-fâcheuse; tout porte même à croire que le ramollissement que l'on voit, sur le cadavre, être séparé des portions saines par une ligne de niveau, est dû à cette même action. Une telle explication est de celles que l'on est conduit à admettre de prime abord (1). Et je

.4

<sup>(1)</sup> Traité de médecine pratique, nos 7263, 7654.

suis surpris qu'elle n'ait pas été mentionnée dans la plupart des livres classiques. Cela est d'autant plus fâcheux que le traitement simple, qui dans ces circonstances soulage ou même guérit, est la conséquence de cette manière de voir.

Il y a même tout lieu de penser que la formation abondante d'acides dans l'estomac réagit sur les aliments et fait chimiquement dégager à ceux-ci une proportion considérable de fluides élastiques dont la présence provoque les contractions des fibres musculaires gastriques et les douleurs dont il vient d'être parlé; j'ai, de plus, l'intime conviction que la présence dans l'estomac d'acidités en excès est une des circonstances principales qui augmentent la gravité des lésions propres aux cancers de cet organe. Il n'est même pas impossible que chez certains individus, d'ailleurs prédisposés, les acides gastriques n'en puissent devenir les causes déterminantes. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai vu sur un assez grand nombre de personnes, et notamment chez un de nos plus spirituels critiques dont la délicatesse est au niveau du talent, M. J..., se dissiper complétement et d'une manière assez prompte, les symptômes de l'ulcère stomacal et de la gastrocarcinie, alors qu'ils étaient portés à ce point qu'une émaciation extrême, que le vomissement de toutes les substances alimentaires et que des évacuations par le haut d'un sang très-noir étaient survenus ; or, je n'ai eu recours dans tous ces cas qu'à des moyens propres à rendre inoffensifs les acides que l'estomac contenait

232 ACIDES DANS L'ESTOMAC; GOUTTE
en abondance. Je ne puis trop insister sur ce fait qui
dans ma pratique a été d'une utilité extrême.

153. Influence des acides gastriques en excès sur l'état du sang dans la goutte (oxurémie).

De fortes raisons me conduisent encore à croire què les acides gastriques plus abondants et plus actifs qu'ils ne devraient l'être, sont pour quelque chose dans le développement de l'oxurémie, c'est-à-dire de l'état du sang qui donne lieu à la goutte.

On sait en effet que l'oxygastrie (pyrosis) est trèsfréquente chez les goutteux et détermine souvent les douleurs d'estomac dont ils sont atteints.

Souvent les personnes qui souffrent de cette oxygastrie sont nées de parents goutteux, et le remède qui réussit le mieux dans les cas de pyrosis est précisément celui qui compte le plus de succès alors qu'il s'agit de combattre la goutte.

154. Utilité du bicarbonate de soude administre à hautes doses dans les cas d'accidents gastriques.

C'est dans l'emploi des alcalins, tels que le bicarbonate de soude, la magnésie, le bitartrate de potasse et de soude (Galtier-Boissière) qu'on trouve les moyens neutralisants des acides contenus dans l'estomac. On doit surtout à l'illustre Darcet la connaissance de ce fait que l'on avait d'abord entrevu, mais qui n'avait pas été suffisamment constaté. De là l'usage de l'eau et des pastilles de Vichy qui, très-utiles contre l'oxyACIDES GASTRIQUES; BICARBONATE DE SOUDE; MAGNÉSIE 233 gastrie et contre la goutte, le sont bien peu dans les cas de maladies du foie, de la rate et des autres viscères; c'est une chose étrange, en effet, que cette mode ridicule d'envoyer à Vichy tous les malades qui souffrent de l'épigastre, et cela sans que l'on ait d'abord recherché et reconnu les lésions dont ils sont atteints.

Il n'est pas de semaines, en été, où je ne sois consulté par des gens qui se sont trouvés fort mal des eaux de Vichy, parce que leurs maladies n'étaient pas des oxygastries, mais bien des affections de tout autre nature.

455. Signes physiques d'auscultation et de plessimétrisme propres à faire constater la présence d'acides dans l'estomac et le dégagement d'acide carbonique qui s'opère à la suite de l'ingestion du bicarbonate de soude.

Le bicarbonate de soude, dit sel de Vichy (bien qu'à peu de frais la chimie en obtienne de parfaitement analogue et en abondance), le bicarbonate de soude, dis-je, réussit d'une manière tout à fait remarquable dans les cas d'oxygastrie primitive et secondaire. Son effet est instantané. Dans les cas précèdents, aussitôt qu'il est ingéré : si l'on porte l'oreille sur l'estomac du malade, on entend le bruit de crépitation, résultat du dégagement de l'acide carbonique, dégagement dû à la décomposition du sel de soude, à laquelle donnent lieu les acidités gastriques. Si l'on percute alors, le plessimetrisme fait bientôt entendre un son très-clair, et donne que doigt une sensation d'élasticité très-marquée.

#### 234 POTION AVEC LA BICARBONATE DE SOUDE

Un moment après, des gaz semblables à ceux qui s'échappent du vin de champagne sortent en abondance par l'œsophage, le pharynx et la bouche et tout d'abord le malade cesse d'éprouver de la douleur au creux de l'estomac. Pour obtenir un tel résultat, il faut que la dose du bicarbonate de soude soit très-forte, et il est souvent indispensable de la porter à cinq, six, huit ou dix grammes en une seule fois.

La potion suivante est celle dont depuis dix ans je me sers pour moi-même avec un succès constant; je dois à son administration la conservation de ma santé, de mon énergie et peut-être de ma vie :

Bicarbonate de soude	6 gram.
Eau de Seltz	30
Sirop de fleurs d'oranger	30
Ajoutez une goutte d'huile essentielle d'anis	

Faites dissoudre lentement et triturez le sel dans le sirop et ajoutez l'eau peu à peu.

66 gram.

On prendra cette potion en une seule fois, et cela, dès que les douleurs produites par l'oxygastrie commenceront à se faire sentir.

Si le mal revient dans le même jour, on réitérera l'usage de cette même potion dont l'emploi n'est en rien dangereux, et que l'on peut continuer indéfiniment tant que les douleurs reparaissent.

Cette méthode m'appartient en très-grande partie,

car l'eau de Vichy, souvent administrée, est tout à fait insuffisante, puisqu'il faut en prendre trois ou quatre verres pour obtenir les mêmes effets que ceux qui résultent de la potion précédente.

Il faudrait prendre d'un coup toute une boîte de pastilles de Vichy, si l'on voulait ingérer la dose de bicarbonate de soude indispensable pour faire disparaître les accidents (1).

156. Le bicarbonate de soude peut être donné sans danger.

En vérité, je ne comprends pas comment beaucoup de médecins redoutent l'usage habituel du bicarbonate de soude, car jamais je ne lui ai vu produire de phénomènes fâcheux, alors même que je l'ai donné dans des proportions considérables. Cette assertion, si généralement émise : que ce sel détermine la dissolution du sang, doit être rangée au nombre des hypothèses les plus dénuées de toute espèce de fondement.

J'en ai pris pendant quinze ans plus de 10 grammes par jour, ce qui fait plus de 54 kilogrammes, et je ne crois pas avoir le sang en dissolution.

 Prédisposition à la formation d'acides dans l'estomac ou oxygastrie. — Moyens d'y remédier.

Malheureusement, le bicarbonate de soude, qui remèdie instantanément à l'oxygastrie et à la gastralgie, laquelle en est la conséquence, ne guérit pas la disposition du malade à former des acides dans l'estomac,

<sup>(4)</sup> La magnésic à la même dose que le bicarbonate de soude peut le remplacer. Elle purge quand elle forme les sels avec les acides gastriques.

236 PRÉDISPOSITION AUX ACIDITÉS GASTRIQUES et ce n'est que par une hygiène bien entendue, par des aliments tirés du règne animal, par une grande sobriété et en évitant l'usage des farineux et quelque-

458. Douleurs nerveuses de l'estomac chez les femmes en général, et notamment chez les semmes enceintes.

fois des boissons alcooliques, que l'on peut espérer de

faire cesser cette prédisposition.

Rien n'est plus difficile, je ne dirai pas à guérir, mais à soulager ou à faire momentanément cesser, que les douleurs d'estomac dont les femmes névropathiques sont si souvent atteintes. Contre ce genre de souffrance, auquel j'ai donné le nom de névrogastralgie, on a employé toutes sortes de moyens qui pour la plupart échouent. Ces douleurs gastriques, ces dyspensies si rebelles, sont le plus souvent les résultats d'une irradiation nerveuse s'étendant vers l'estomac, et dont l'utérus et les ovaires sont les points de départ. A ces affections, il faut surtout rattacher les nausées, les vomissements éprouvés dans les premiers mois de la grossesse (embryutérisme). Cependant chez les femmes en général, et chez la femme enceinte en particulier, il ne se développe pas fréquemment quelques-unes des gastropathies dont il vient d'être parlé, telles que des oxygastries, des dyspepsies dues à la présence de matières ou de gaz abondamment contenus dans les intestins, etc.; ces aecidents n'exigent pas chez elles des moyens autres que ceux qui conviendraient chez tout autre individu; mais, dans les affections dites nerveuses de l'estomac qui sont propres à la femme, enceinte ou non, on est fort embarrassé pour diriger un traitement convenable. Perles d'éther, vins généreux par cuillerées, potions alcooliques légères administrées à petites doses au moment où surviennent les crampes d'estomac (crampes qui sont dues à la contraction des fibres musculaires de cet organe), vin et quinquina, amers de toute sorte, etc., etc., tout cela reussit parfois momentanément; mais ne guérit presque jamais. Pour arriver à cette guérison, il faut chercher à remédier à l'état de la matrice, des ovaires, etc., qui entretient le mal, ce que l'on ne peut faire, soit chez la femme enceinte, soit alors que l'évacuation périodique est sur le point d'avoir lieu.

Soulever l'utérus abaissé, par le bandage utéro-périnéal que j'ai proposé (1), et qui a été souvent utile à mes malades; chercher à faire cicatriser les ulcérations du col; combattre les causes morales qui réagissent sur les organes angioviques, et avoir égard à l'ensemble de l'organisme qui influe d'une manière si puissante sur la régularité des menstrues, etc., tels sont les principaux moyens qui, dirigés vers les parties qui sont les points de départ des névrogastralgies de la femme, réussissent le mieux alors qu'il s'agit de porter remède à ces souffrances si fréquentes et si pénibles.

<sup>(1)</sup> Traité de médecine pratique, nº 10012.

238

#### ENTÉRIES; TRAITEMENT

# 459. Moyens simples et hygiéniques applicables aux maladies des intestins.

Le plus grand nombre des douleurs passagères dont les intestins sont le siège, et qui souvent sont accompagnées ou suivies de borborygmes, sont les résultats de la présence dans le tube digestif de matières ou de gaz. Ces substances, s'accumulant et séjournant dans les organes digestifs, ou y progressant avec difficulté, provoquent des contractions musculaires du conduit alimentaire accompagnées de souffrances plus ou moins vives. Il est donc utile, dans de semblables cas, d'avoir recours à de douces pressions sur les points douloureux avec la main, ou à des frictions faites avec une flanelle échauffée et imbibée d'huiles d'amandes douces ou d'olives. Des cataplasmes, des bains tièdes contribuent aussi beaucoup à soulager ces souffrances momentanées; mais ce qui, dans de telles circonstances, est particulièrement indiqué, c'est d'évacuer par des purgatifs inoffensifs tels que le sinapis alba, la rhubarbe, la limonade magnésienne, etc., les matières ou les gaz contenus dans les intestins. Avant d'avoir recours à l'administration des évacuants, il est de règle pratique de s'assurer par le plessimetrisme de la présence, dans le tube digestif, des matières ou des · gaz, de leurs proportions, et de déterminer au juste quelle est la partie de l'intestin où ils se sont accumulés. C'est au médecin habitué à se servir de la médio-percussion, de reconnaître de telles circonstances organiques, dont l'appréciation exacte est en thérapeutique d'une si grande importance.

460. Utilité des purgatifs administrés par le rectum.

Si des matières liquides ou solides distendent le gros intestin, les lavements purgatifs sont d'une utilité extrême. Lorsque les coliques (entéralgie) sont légères, 'injection de l'eau tiède peut suffire.

161. Pressions sur les gros intestins pour faire progresser la matière.

Il est un petit moyen d'une extrême utilité pour faire progresser dans les gros intestins, et, par suite, pour faire évacuer les matières que ces organes contiennent; voici en quoi il consiste : alors que par le ples-simètrisme on a bien constaté que le côté droit du ventre donne une matité en rapport avec la présence de scories liquides ou demi-liquides, il faut se rappeler que les derniers intestins dessinent autour des autres une sorte de cercle qui les embrasse (1), et que le cours naturel des matières y a lieu d'abord à droite, de bas en haut; puis transversalement vers la gauche, audessus du nombril, et enfin tout à fait à gauche, de haut en bas. Ceci posé, on conçoit facilement qu'il est

<sup>(1)</sup> Dictionnaire des sciences médicales, article mésentère, par M. Pierry. Cet article contient une description du mésentère peu connue et utile en pratique,

#### 240 ENTÉRIES; PRESSIONS SUR LES GROS INTESTINS

utile de faire d'abord coucher le malade sur le côté gauche (à l'effet que la pesanteur entraîne les matières de ce côté), comme aussi d'exécuter des pressions et des frictions avec la flanelle imbibée d'huile dans la direction que suit la marche naturelle des scories, c'est-à-dire telle qu'elle vient d'être indiquée. Bientôt alors le plessimétrisme permet, dans de tels cas, de constater que la matité due à la présence des matières s'est déplacée et se prononce vers le côté gauche. Il suffit alors de faire prendre une injection abondante ou purgative dans l'anus pour que les fèces soient rejetées au dehors et pour que les coliques se dissipent complétement.

De tels moyens, quelque simples qu'ils soient, remédiant à la cause anatomique des coliques ou entéralgies, sont infiniment plus utiles et plus pratiques que les pilules, les potions opiacées et belladonées, administrées par les empiristes et par les amateurs de la polypharmacie.

# 462. Évacuation des gax intestinaux. — Position à faire prendre aux malades.

S'agit-il de faire évacuer les gaz contenus en abondance dans les gros intestins et les distendant (ce que l'on peut constater par l'extrême sonorité et la grande élasticité auxquelles, dans ces cas, le plessimétrisme donne lieu à droite et à gauche du bas-ventre), il faut tout d'abord noter que les fluides élastiques sont de beaucoup plus légers que les lìquides ou les solides, et qu'en conséquence ils doivent facilement se porter par ACCUMULATION DE MATIÈRES (SCORENTÉRASIE) 241 en haut dans les intestins, tandis que les matières plus pesantes se dirigent nécessairement par en bas.

Se fondant sur cette considération, en quelque sorte banale, mais dont il est si utile de tenir compte en pratique, il faudra faire placer le malade, dont les intestins seront distendus par beaucoup de gaz, dans une position telle, que, s'appuyant sur les coudes et sur les genoux, le ventre étant inférieurement placé, et ne reposant pas sur le lit, le rectum étant situé en haut, on puisse exécuter des frictions sur cette partie. En même temps, de profondes inspirations, dirigées vers le basventre et le siége, sont exécutées. Très-ordinairement il arrive alors que les fluides élastiques sont, quelques moments après, rendus par le rectum, et qu'un soulagement très-grand a lieu. On seconde cette action en introduisant des corps gras dans l'anus.

On ne saurait croire combien, même dans des maladies graves et aiguës de l'intestin, cette manœuvre présente d'avantages; elle réussit infiniment mieux dans la gazentérasie, ou tympanite (1) des auteurs, que ne le font la poudre de charbon, et bien d'autres moyens pharmaceutiques tout aussi insignifiants que cette substance, moyens que l'on donne d'habitude dans des cas pareils.

463. Accumulation de matières dans les intestins; moyens d'y remédier.

La présence et le séjour prolongé de matières ster-

(4) Mot absurde, qui, signifiant inflammation du tambour, ne devrait se rapporter qu'à la phlegmasie de l'oreille moyenne enflammée. corales liquides (hydro-scories) dans l'intestin, lors des maladies aiguës et même chroniques, est l'un des états pathologiques les plus graves qui puissent survenir; il en est surtout ainsi lorsqu'il y a quelque obstacle mécanique au cours des scories, comme cela a lieu dans les hernies étranglées et dans des rétrécissements, cancéreux ou non, vers la dernière partie de l'intestin.

Seul, le médecin instruit est capable de reconnaître les causes et la nature de tels états pathologiques et de juger des moyens très-actifs qu'il convient alors d'employer le plus tôt possible; mais, en général, ce sont les purgatifs doux et non dangereux, tels que la limonade magnésienne, l'eau de Sedlitz, la rhubarbe, etc., et, de plus, des frictions et des pressions vers l'ombilic qui, dans les cas d'accumulation de matières liquides dans les intestins grêles (1), réussissent le mieux. Quand, au contraire, les hydro-scories (fèces liquides) distendent les gros intestins, les injections anales avec les corps aqueux, onctueux, liuileux, plus ou moins purgatifs (2), et surtout les douches abondantes dans le rectum, sont d'une extrême utilité.

Decoction de graine de lin très-épissea.
Huile d'olive.
Cassonade brune.
430

330 gram.

<sup>(4)</sup> On reconnaît cette accumulation de scories par la matité existant au milieu du ventre, tandis qu'un son mat constaté vers les flancs et en bas correspond en général à la présence des matières dans les gros instestins.

<sup>(2)</sup> On obtient très-souvent les meilleurs résulta's du lavement que voici :

164. Moyens faciles de pratiquer des douches.

Sous le nom de douches, on désigne des injections dirigées, par un jet plus ou moins large et plus ou moins fort, vers une région extérieure, ou dans une partie profonde du corps. L'action qui en résulte est composée : 1º des effets du mouvement imprimé à l'eau; 2º de la température que celle-ci présente, et 3º pour les organes intérieurs, de l'évacuation qui en est le résultat. Un simple lavement est une douche du rectum, un moyen hydrothérapique dont on a beaucoup abusé; et depuis l'injection rectale par un clysopompe jusqu'au jet d'eau donné dans les établissements de bains, il y a tous les degrés possibles dans la largeur et dans la force du courant d'eau. Le mode d'exécuter ces injections ou ces douches est en général assez compliqué et souvent fort dispendieux. Les moyens suivants, à la fois simples et usuels, suffisent pour les pratiquer :

- 1º Pour les petites injections, une seringue, telle que l'employaient nos bons aïeux, un clysopompe, un irrigateur ordinaire, inventé par mon élève M. Eguisier.
- 2º Pour un jet plus volumineux, une seringue usitée en médecine vétérinaire, une pompe à jardin, un irrigateur dont le récipient peut contenir plusieurs litres.
- 3° Pour un jet très-gros, un vaste seau fixé au plafond et portant par en bas une ouverture à laquelle est fixé un conduit en caoutchouc dont le diamètre est proportionné à la largeur que l'on veut donner au courant.

#### 244 FIEVRES DITES TYPHOIDES; IRRIGATIONS INTESTINALES

Ce tuyau porte, vers sa terminaison, un robinet qui permettra de livrer passage au liquide ou d'en arrêter le cours. Quand on veut augmenter la force de cette espèce de douche, on élève le récipient à une plus grande hauteur. Quand le vase ou le corps de pompe, etc., qui contient l'eau de la douche a peu de capacité, on en est quitte pour le remplir plus souvent.

S'agit-il de douches très-fortes et longtemps continuées, on a recours à des appareils mécaniques que l'on trouve chez M. Charrière (1) et chez quelques autres fabricants. Des toiles cirées et vernies, de vastes plateaux en zinc, reçoivent le liquide et préservent l'appartement contre toute malpropreté.

#### 165. Accidents dits putrides survenant dans les périodes avancées des fièvres graves.

Dans ces dernières années, et notamment depuis deux ans, j'ai tiré le plus grand parti des douches ou irrigations dont il vient d'être parlé, alors que, dans les fièvres dites typhoïdes, des matières fécales liquides et des gaz putrides étaient, comme cela arrive presque toujours dans de tels cas, contenus dans le gros intestin.

Il ne me paraît pas possible de révoquer en doute que les premiers accidents des flèvres si singulièrement nommées typhoïdes, et que les symptômes qui les accompagnent soient dus à une alteration primitive du

<sup>(1)</sup> Rue de l'École-de Médecine, nº 4.



prèvnes dites typhoides; irrigations intestinales 245 sang produite par une cause putride ou septique à laquelle j'ai donné le nom très-significatif de septicémie (4).

Dans cet état du sang, c'est peut-être un miasme, un virus, un iose particulier, qui sont les points de départ: soit de l'état fébrile et des hémorrhagies nasales (rhinorhémies), soit des taches pétéchiales, de l'éruption, qui se déclarent vers le siége, etc., symptòmes qui font partie des premiers accidents observés dans les affections dont il s'agit. Plus tard, et lorsqu'à la suite de la maladie qui, consécutivement, se déclare dans l'intestin, survient la formation et le dépôt, dans cet organe, de liquides qui s'y altèrent et s'y pourrissent; une seconde altération du sang se manifeste; elle est due à l'absorption de ces matières putrides; cette résorption est la source d'un grand nombre de phénomènes du même genre et d'une extrême gravité.

Il n'est pas d'observateur qui puisse nier l'exactitude de cette proposition, et quand Forget, lui qui n'admettait pas la septicémie primitive, partageait la même opinion que moi sur la septicémie secondaire, il y a lieu de croire que tous les médecins seront de cet avis; or, c'est en me fondant sur cette idée, c'est par la conviction où je suis que les matières septiques contenues dans le gros intestin, y sont résorbées, pénètrent dans

<sup>(4)</sup> Traité des altérations du sang, 1834, article typhohémie; Traité de Médecine pratique, article septicémie, 1852; Mémoire sur les causes de la flèvre typhoide dans la clinique médicale de la Pitié, 1832; etc.

246 FIÈVRES DITES TYPHOIDES; IRRIGATIONS INTESTINALES les vaisseaux, y empoisonnent le sang et causent ainsi la persistance des phénomènes graves, que j'ai fait mettre en pratique la médication suivante.

466. Extrème utilité des irrigations des gros intestins dans les flèvres dites typhoïdes. Nombreux succès obtenus de leur emploi dans mon service soit à la Charité, soit à l'Hôtel-Dieu.

Toutes les fois que, dans des cas de fièvres graves (putrides, adynamiques, ataxiques, muqueuses, bilieuses, typhoïdes, pestilentielles), le plessimétrisme permet de constater, dans les gros intestins, la présence de matières demi-solides ou liquides, ou encore celle de liquides et de gaz dont l'odeur est très-fétide, j'ai recours à des irrigations abondantes et réitérées coup sur coup. et cela pendant quelques minutes, et l'on continue ainsi jusqu'à ce que l'eau et les gaz qui s'échappent de l'intestin, pendant et après l'irrigation, soient clairs et aient beaucoup moins de fétidité.

Pour favoriser cette évacuation si utile, je fais exécuter des frictions sur le pourtour du ventre, d'abord (comme il a été dit p. 240) à gauche et de bas en haut, le malade étant couché sur le côté droit; cette pratique a pour but de faire pénétrer le liquide injecté jusque dans le côlon ascendant; puis, plus tard, à droite, de bas en haut; ensuite, transversalement, et, ensin, de haut en bas (ce qui a pour esset de àiriger l'eau et les matières, suivant le cours naturel qu'elles doivent suivre). Évidemment, dans ce dernier cas, le malade doit être placé sur le côlé gauche.



#### FIÈVRES DITES TYPHOIDES; IRRIGATIONS INTESTINALES 247

Ces irrigations sont, dans les cas graves, renouvelées trois, quatre ou cinq fois par jour et même davantage.

Déjà, depuis quelques années, j'ai eu recours à cette pratique, mais c'est dans les trois dernières que j'y ai principalement insisté, soit dans mon service à l'hôpital, soit sur des malades de la ville, et je ne crains pas d'affirmer que, depuis ce temps, je n'ai presque pas perdu de malades atteints de l'ensemble de phénomènes dont il s'agit; et cependant il en est entré, depuis lors, un très-grand nombre, soit dans la salle Saint-Charles, soit à Sainte-Anne, soit dans les salles Saint-Bernard et Sainte-Agnès de l'Hôtel-Dieu; parmi eux, il y en avait plus de vingt qui présentaient à la fois : du délire (porté même, pour l'un d'eux, jusqu'à des tentatives de suicide); des éruptions (tellement considérables à la région sacrée, qu'elles simulaient la variosidermite), et une entérorrhée excessive. Chez ces vingt individus, on observait encore une énorme accumulation de matières dans l'intestin, une grande dépression du pouls, une pneumonémie hypostasique et une splénomégalie (c'est-à-dire une augmentation dans le volume de la rate). Les résultats ont été si remarquables dans ce cas, que la convalescence n'a pas eu de durée, et que, dix ou douze jours après la cessation de la diarrhée, les malades ont pu sortir en bon état de l'hôpital. Ce prompt rétablissement était dù à ce que, pendant le cours des accidents, je n'avais pas cessé de nourrir et de faire prendre des aliments réparateurs (1).

(4) Voyez mon Mémoire sur l'alimentation insuffisante et sur ses

467. Curation de la diarrhée ou entérorrhée.

Le principal moyen de remédier à l'entérorrhée (diarrhée), alors qu'elle n'est pas entretenue par des lésions organiques et persistantes, telles que les ulcérations intestinales, des cancers, etc., consiste à priver, pendant vingt-quatre heures, les malades de toute espèce d'aliments, et même de ne leur accorder des boissons aqueuses que dans de faibles proportions. Cependant, ces mêmes boissons aqueuses peuvent avoir quélquesois une certaine utilité. Une des plus convenables est la suivante : on fait bouillir pendant deux heures trente grammes de riz dans un litre d'eau, on passe le liquide à travers un linge dont le tissu est peu serré, puis on ajoute à froid le blanc de trois œuss et cent grammes de sirop de coing. Toutes les demiheures, un quart de verre de cette préparation est avantageusement administré.

Lorsque la diarrhée a persisté pendant plusieurs jours, il faut se donner garde de continuer de soumettre le malade à l'abstinence, car c'est bien assez qu'il perde constamment des liquides par la sécrétion intestinale, sans l'affaiblir encore par le défaut d'aliments; mais la nourriture que l'on donnera alors sera peu abondante, très-saine et surtout ingérée par petites proportions à la fois.

dangers dans le procédé opératoire de la percussion médiate en 1827, et reproduit dans les articles iléospilosie, hypémie, etc., du Traité de Médecine pratique.

Les bouillons très-réduits, les jus de rôtis, les viandes peu cuites et très-lendres, le poisson, les œufs frais (s'ils se digèrent sans causer des éructations fétides seront, dans de tels cas, beaucoup plus convenables que les substances végétales. Ces dernières sont élaborées par les intestins, ce qui y cause une augmentation de circulation, tandis que les matières animales exigent surtout le travail de l'estomac.

Presque toujours, une entérorrhée qui persiste pendant plus de deux jours dépend de quelque circonstance matérielle qu'il importe de reconnaître et qui, en général, exige les consciencieuses investigations d'un médecin familiarisé avec l'étude et l'exercice du plessimétrisme et de la palpation.

468. Entérorrhée suite de l'accumulation des matières dans les intestins.

Il est une entérorrhée que Sauvages désignait sous le nom de diarrhea a stercore.

La connaissance en ést très-importante; voici en quoi elle consiste : soit une personne qui éprouve, depuis quelques jours, de la lenteur, de la difficulté dans l'excrétion alvine, laquelle est devenue rare et insuffisante; alors les matières (scories) séjournent dans le tube digestif ou angibrôme; elles s'y endurcissent, deviennent des corps étrangers qui blessent la membrane interne de l'intestin avec laquelle elles sont en contact, Bientôt la souffrance de celle-ci provoque la formation de mucosités qui finissent par solliciter la contraction

de l'organe. Cette contraction rejette au dehors soit les matières accumulées et délayées, soit le liquide muqueux dont il vient d'être parlé, et ce liquide continue encore à être formé après l'excrétion des scories. En général, cette série d'accidents se dissipe spontanément. Les seuls moyens, d'ailleurs très-simples, que l'on doit y opposer consistent dans la diminution de la nourriture, dans l'usage de boissons ou d'aliments légèrement purgatifs, tels que la purée de lentilles, la décoction de petits pruneaux, les viandes gélatineuses (par exemple, le jeune veau), ou dans l'emploi d'injections anales composées avec la décoction de guimauve, de graines de lin, etc.

169. Diverses espèces de constipations ; ridicule de cette expression.

Le défaut d'évacuations alvines a reçu, en général, le nom de constipation; cette expression se rapporte à des circonstances fort différentes les unes des autres. telles que :

- 1º L'absence de selles, due à la stase des matières;
- 2º Le manque d'excrétions alvines résultant de ca que l'intestin n'en contient point, comme il arrive alors que les malades ne prennent pas d'aliments;
- 3º La difficulté d'accomplir la défécation, comme cela a lieu consécutivement aux hémorrhoïdes ou aux écorchures à l'anus, à l'induration et à l'augmentation de volume des matières. Dans des cas semblables, les sco-

ries traversent avec peine un anus souvent sec, étroit et contracté (1).

## 470. Absence de selles due à l'abstinence ou à l'insuffisance de la nourriture.

Il est d'abord de toute évidence que le défaut d'excrétions alvines, dû à ce que l'on prend peu d'aliments, exige évidemment que l'on fasse usage d'une nourriture plus abondante.

 Accumulation des matières dans l'intestin, qu'elles distenden (scorentérasie), causant de la gêne dans leur excrétion.

Si les matières ou scories s'accumulent dans l'intestin (scorentérasie), ainsi que le prouvent : soit le plessimétrisme, soit cette circonstance, que le malade, bien que continuant à s'alimenter, n'a pas d'évacuations alvines ou n'en obtient que d'insuffisantes; si le ventre grossit, devient douloureux avec ou sans formation de gaz, il devient utile de prendre un purgatif fort doux, tel que la rhubarbe en poudre, la limonade magnésienne, l'eau de Sedlitz ou de Pulna, etc.; mais, en général, on n'aura recours à ces moyens qu'après

<sup>(4)</sup> Le mot constipation est si mauvais et doit être si bien abandonné, qu'en Espagne il se rapporte au rhume des bronches et surtout du nez; tandis qu'en France, on l'applique à certaines souffrances de l'extrémité intérieure de l'intestin. De la peuvont résulter de très-ridi cules méprises alors que l'on entend parler des dames espagnoles, qui disent, sans y attacher la moindre importance, qu'elles sont constipées (constipada); ce qui fait sourire les personnes françaises qui lea écourent.

# 252 CONSTIPATION PAR RESSERREMENT DE L'ANUS avoir bien constaté la présence, dans le tube digestif, des matières stercorales.

Les moyens qui font ici courir le moins de risques, êt dont l'action est le plus souvent utile, son : 1° le lavement onctueux dont il a été parlé (p. 242); 2° des injections dans le rectum, avec le mélange purgatif que voici, dont l'action est à peu près constante : follicules de séné, 15 grammes, que l'on fait infuser dans 300 grammes d'eau bouillante, en ajoutant à ce mélange 50 grammes de sirop de nerprun; 3° le plus ordinairement l'eau un peu chaude injectée dans le fondement, et que l'on y retient pendant quelques minutes, suffit pour provoquer les évacuations nécessaires.

## 472. Resserrement des sphincters; douleurs lors de l'excrétion des matières.

Si des matières dures et volumineuses sont les causes du défaut d'excrétion, si la douleur qui résulte de leur passage par les sphincters fâit resserrer encore ces anneaux musculaires; si des tumeurs hémorrhoïdales, des écorchures, etc., rendent la défécation très-pénible (et il y a des gens qui souffrent horriblement par suite de ces circonstances diverses), voici ce qu'il convient de faire:

On injectera abondamment dans le fondement le liquide onctueux précédemment indiqué (p. 242), et l'on introduira avec le doigt, très-profondément dans le rectum, soit avant de rendre ce liquide, soit au moment

même de l'évacuation, une couche très-épaisse d'une mixture graisseuse très-consistante du même genre et semblable à celle dont il a été parlé (1); c'est bien audessus du rétrécissement que l'anus présente naturellement et à 3 ou 4 centimètres au-dessus de son orifice extérieur que cette introduction doit être faite. Bien entendu qu'on aura le soin de tenir prêts, pour le lavage, de l'eau et du savon.

La proportion du mélange graisseux introduit dans le rectum doit être considérable, et il faut, si l'on veut obtenir un bon résultat de ce moyen, que tout le pourtour de l'intestin, au-dessus du sphincter interne, en soit recouvert.

Pour pouvoir se servir du mélange graisseux dont il est ici question, il faut légèrement l'échauffer à sa surface, en l'exposant à la flamme d'une bougie, ou le gratter superficiellement avec l'ongle. En été, par une température chaude, on y ajoute plus de beurre de cacao ou de la cire vierge. Si la mixture graisseuse ici recommandée n'était pas très-consistante, on n'en obtiendrait pas les résultats avantageux que l'on en attend. Dans le cas où des hémorrhoïdes volumineuses et enflammées rendent difficile ou très-douloureuse l'introduction du doigt dans les sphincters de l'anus contractés, on y supplée assez bien en faisant fondre de la graisse de veau, à 30 ou 36 degrés de température, en l'introduisant dans une petite seringue à longue ca-

<sup>(1)</sup> Graisso de veau, 30 grammes; beurre de cacao, 5 grammes.

254 INSPIRATIONS PROFONDES MOYENS D'ÉVACUATION nule, qui sert à injecter ce corps gras dans l'anus.

Les effets de ces moyens sont: 1° de favoriser par glissement la sortie des scories; 2° de protéger la membrane interne du rectum et de l'anus contre les inégalités que pourraient présenter les matières excrémentitielles; 3° d'empêcher les humidités délétères contenues dans l'intestin de venir salir et infecter les gerçures, les déchirures, les surfaces excoriées de l'anus; 4° de prévenir le contact des scories avec des parties enflammées ou tout au moins malades.

Cette application de corps gras, chez les gens qui sont sujets aux accidents dont il vient d'être parlé, doit être réitérée le matin, le soir, avant et après les évacuations; et alors que celles-ci seront effectuées, on aura le soin de bien laver le fondement avec l'eau tiède, et de réduire, par une douce pression, l'intestin faisant saillie hors de l'anus.

473. Utilité de provoquer l'expulsion des matières par des mouvements d'inspirations profondes.

Un autre moyen de rendre la défécation plus facile est d'éviter que l'anneau musculaire dit sphincter se resserre lors des efforts d'expiration qui d'ordinaire sont pratiqués pour déterminer l'expulsion des matières. Pour cela, il faut exècuter des inspirations trèsprofondes plutôt que des expirations, et diriger ces inspirations vers le bas-ventre et le rectum. On parvient, avec un peu d'habitude, à obtenir ainsi une excrétion plus facile; mais cela n'a guère lieu que si, en même

HÉMORRHOIDES; CORPS GRAS DANS LE RECTUM 285 temps, l'anus est enduit d'une couche graisseuse, éphisse et consistante.

On ne peut assez insister sur l'utilité que présentent, dans une foule de cas, les applications des corps gras dont il s'agit. Nous allons citer quelques exemples remarquables à l'appui de cette proposition.

474. Curation et pallistion des hémorrhoïdes ou tumeurs phlébostasiques de l'anus.

Les tumeurs dites hémorrhoïdes, qui se forment à l'anus, et qui ne sont autre chose que des dilatations de veinules réunies et communiquant entre elles, sont des infirmités d'autant plus cruelles qu'en général on les calme difficilement, et qu'on ne les guérit que par des òpérations dangereuses et très-pénibles; de ce nombre sont l'excision, plusieurs sortes de cautérisations et l'écrasement linéaire.

475. Étude des causes et de la pathogénie des hémorrholdes.

En étudiant avec soin la manière dont les hémorrhoïdes se forment, le mécanisme et les causes anatomiques de leur production, on voit qu'il est possible
d'éviter par des moyens très-simples, non-seulement
les opérations douloureuses et parfois terribles dont il
vient d'être parlé; mais encore des méthodes de traitement qui ont aussi leurs inconvénients. De ce nombre
sont : 1° les applications de cataplasmes (qui favorisent
les dilatations veineuses), ou de sangsues qui donnent
parfois lieu à des hémorrhagies dangereuses; 2° la

## 256 HÉMORRHOÏDES; LEURS CAUSES ORGANIQUES

belladone administrée en suppositoire ou en injection; ce médicament toxique est ici complétement inutile, et, si on le donne sous forme de pommade, il n'a d'autre vertu que celle qui est propre à la graisse dans laquelle il est incorporé; 30 la ratanhia, qui souvent exaspère les douleurs et ne guérit pas, etc., etc.

Pour bien comprendre comment il faut traiter les hémorrhoïdes, il est indispensable de savoir :

- 1º Que les matières volumineuses et endurcies, quand elles sont contenues dans le dernier intestin, génent le retour du sang qui revient par les veines de l'anus;
- 2º Que les anneaux ou sphincters, alors qu'ils se resserrent, compriment les veines dont il s'agit, et y mettent obstacle au retour du sang;
- 3º Que, dans le cas où la membrane anale est blessée, ou rendue douloureuse, ces mêmes sphincters se resserrent;
- 4° Que, par conséquent, il en arrive ainsi lors du passage par le fondement de scories indurées et inégales;
- 5. Que, si une ou plusieurs tumeurs hémorrhoïdales ou polypiformes sortent de l'anus lors de la défécation, les sphincters en se contractant étranglent la base de ces tumeurs, y retiennent le sang, exaspèrent la congestion, produisent ainsi de la phlegmasie ou de la douleur, et le mal devient d'autant plus grave que l'anus est plus sec et plus resserré. Ajoutez à ceci que ces mêmes tumeurs, très-hyperémiées et dont le tégument est aminci, peuvent être déchirées, ulcérées par

#### HÉMORRHOÏDES; LEUR RÉDUCTION

des scories ou par d'autres causes matérielles (attouchements, pressions, frottements), et que des hémorrhagies, des écoulements de liquides sanieux et fétides, mélangés ou non de matière, peuvent en être les résultats. En tenant compte de tout ceci, on comprendra la gravité, ou du moins l'immense incommodité, qui sont les conséquences des circonstances organiniques précédentes.

476. Moyens simples et hygiéniques de calmer, de réduire et même de guérir les hémorrhoïdes.

Il suffit, pour calmer les graves accidents dont il s'agit, et pour les prévenir : 1º de tenir les hémorrhoïdes parfaitement propres, et cela au moyen de lotions avec de l'eau tiède; - 20 d'introduire dans le fondement, au moyen de l'indicateur ou, s'il est trop volumineux, du petit doigt, une couche très-épaisse de la mixture graisseuse indiquée page 253; cette substance doit recouvrir ces mêmes doigts jusqu'à leur base : sans cette précaution, leur introduction serait difficile et fort douloureuse. C'est au-dessus du sphincter ou anneau interne, à trois ou quatre centimètres de profondeur, que l'intestin doit être enduit du corps graisseux qui doit complétement recouvrir toute la surface hémorroïdaire. - 3º De réduire alors par de douces pressions les hémorroïdes sorties, et l'on y parvient facilement en faisant exécuter au malade, pendant que l'on comprime ces tumeurs, de grands mouvements d'inspiration qui sont généralement accompagnés du relachement des sphincters. — 40 D'insister sur des manœuvres de ce genre alors que s'accomplit la défécation. — 50 D'avoir recours à des purgatifs doux ou à des lavements mucilagineux et purgatifs, et cela dans l'intention de bien vider l'intestin des matières qu'il pourrait contenir. — 60 De continuer plusieurs jours de suite les applications locales de graisse. — 70 De soutenir avec un petit bandage en T les hémorrhoïdes alors qu'elles ont de la tendance à s'échapper par l'anus. — 80 On peut éviter d'introduire le doigt dans cet orifice, en y injectant, avant et après les selles, une proportion notable de la graisse précédente liquéfiée par la chaleur. Ce dernier moyen est même le seul qu'il soit possible d'employer alors que le pourtour du conduit est enflammé, étroit et très-douloureux.

C'est en suivant ponctuellement le traitement qui vient d'être indiqué que maintes fois j'ai été assez heureux pour voir les douleurs hémorroïdaires les plus vives se calmer et se dissiper, les tumeurs qui les causaient se flétrir et se réduire facilement, les accidents cesser, les ulcérations se cicatriser, des indurations se ramollir et des écoulements de sang se tarir.

476 bis. Relàchement des sphinoters. applications (même dans un bain tiède) de poches en caoutchouc pleines d'eau glacée, sur l'anus devenu trop large et permettant la chute du rectum atteint d'hémorrhoides.

Il m'est arrivé, dans un cas fort remarquable et que j'ai observé sur un négociant de Saint-Domingue, de satisfaire à une double indication qui se présentait : celle de calmer avec des corps gras des souffrances excessives dues à des tumeurs hémorrhoidales ensiammées, et celle de remédier en même temps à une chute du rectum causée par un relachement du sphincter.

Une vessie de caoutchouc fut remplie d'eau et maintenue à 0 par de la glace, elle fut placée sur la tumeur qui faisait saillie au dehors.

Les hémorrhoïdes externes très-douloureuses que portait le malade rentrèrent, l'anneau se contracta et le malade fut immédiatement soulagé. Cette application de réfrigérants pourrait être faite sur une partie circonscrite, alors même que l'on prendrait un bain tiède destiné à apaiser les douleurs.

477. Les pertes de sang et de divers liquides par l'anus, le flux hémorrhoidal, etc., ne sont pas des efforts médicateurs de la nature.

Les flux sanguins ou autres ayant lieu par les hémorrhoïdes ne sont point en général utiles. Le public, se fondant, comme toujours, sur d'anciennes hypothèses médicales dont la science et le temps ont fait justice, croît que les écoulements sanguins par le rectum, par l'anus, par les hémorrhoïdes, etc., sont des bénéfices de nature. Il admet que ces flux préviennent et guérissent des maladies, qu'il les jugent; que, si on les arrête, il en résulte de terribles accidents. Ce sont là de monstrueuses et de déplorables erreurs. (Voyez ma thèse latine d'agrégation en 1823, An omnes morbi sanabiles sanandi? (Faut-il guérir toutes les maladies curables?)

#### 260 IL FAUT CHERCHER A GUÉRIR LES HÉMORRHOÏDES

On sait maintenant que presque toutes les hémorrhagies sont produites par l'ouverture, la rupture, l'éraillement de vaisseaux, dus eux-mêmes à des dilacérations d'organes, à des éraillements, à des ulcérations, etc. On sait encore que ces lesions anatomiques ne sont pas produites par une nature bienveillante et médicatrice, mais qu'elles résultent de circonstances physiques variées.

Il faut laisser aux médecins des temps passés ces vieilles et dangereuses erreurs, et se rappeler que les pertes abondantes de sang ou que les hémorrhagies faibles, mais continues, épuisent ceux qui en sont atteints et altèrent plus ou moins l'organisme. (Voyez pages 262, 263 des observations à l'appui, de cette proposition.)

478. On doit remédier le plus tôt possible aux hémorrhoïdes.

On doit remédier le plus tôt possible aux hémorrhoïdes, et cela, soit pour les empêcher de prendre du développement, et de devenir le siège d'altérations graves dans leur tissu; soit pour prévenir la formation d'abcès, de fissures, de fistules à l'anus et, à la longue, de can ærs intestinaux; soit encore pour arrêter les pertes habituelles de sang qui ont lieu par le rectum.

179. Les petits moyens précédents ne sont en rion d'un emploi dangereux; à la rigueur, les opérations chirurgicales seraient préférables à une expectation ridicule et funeste.

Les petits moyens qui viennent d'être proposés contre les hémorrhoïdes n'ont aucune espèce de dan-

ger, et les accidents que causent de tels états pathologiques sont graves à ce point que, si ces moyens échouaient, il vaudrait mieux encore exposer les malades à la douleur et aux suites d'opérations périlleuses que de conserver des lésions que le préjugé le plus stupide a fait considérer comme utiles.

#### 480. Fissures hémorrhagiques et névralgiques de l'anus.

Les précautions et les soins applicables aux hémorrhoïdes le sont encore à une affection très-douloureuse et très-dangereuse; je veux dire aux fissures à l'anus, c'est-à-dire à des éraillures profondes, existant entre les plis du fondement, et qui, résultant du déchirement de la peau, déterminent des souffrances très-vives, soit pendant les évacuations, soit à leur suite; c'est à mon ancien maître Boyer que la description d'une telle lésion est due. D'après les faits que j'ai observés, nonseulement ces fissures donnent fréquemment lieu aux excessives douieurs dont parlait le grand praticien de la Charité; mais encore, dans un assez grand nombre de cas, elles sont les sources d'hémorrhagies, tantôt légères et habituelles, et tantôt beaucoup plus fortes. C'est quand des veines ou même des artérioles sont situées au fond de la fissure, que ces écoulements sanguins surviennent, et cela principalement à la suite des efforts pour la défécation ou consécutivement au passage des matières.

On reconnait ce mal, que les bonnes gens nomment un flux hémorrhoïdal, en faisant exécuter quelques 262 PLUX HÉMORRHOÏDAL, ANÉMIE, PALPITATIONS efforts pour l'excrétion des scories et en examinant alors l'anus, qui se déploie, en quelque sorte, et permet de découvrir les plis et les enfoncements qui le circonscrivent. Alors on voit sourdre des gouttelettes sanguinolentes ou même s'échapper des jets de sang, parfois lancés au loin et qui sortent de petites écorchures linéaires. Qu'il me soit permis de citer, à cette occasion, parmi un très-grand nombre d'autres, deux faits remarquables.

181. Faits remarquables d'accidents d'hypémie et de symptômes graves du côté du cœur, dus à des fissures hémorrhagiques.

Le neveu du maréchal Gérard, officier de cavalerie, me fut adressé comme étant atteint de maladie du cœur; c'était à l'époque où les idées généralement reques sur l'irritation et l'inflammation conduisaient à abuser des saignées et des sangsues, et certes, on ne les avait pas ménagées au pauvre malade; il était, lorsque je le vis, d'une pâleur excessive; le pouls se faisait très-faiblement sentir, et l'on entendait sur la région cardiaque un bruit de souffie extrèmement fort; les évanouissements se déclaraient fréquemment, la dyspnée était extrême, et les digestions ne s'opéraient qu'avec une grande lenteur. Le cœur me parut alors être d'un volume normal, et il me sembla que, dans ce cas, il s'agissait plutôt d'une diminution très-grande dans les proportions du sang, que d'une cardiopathie.

J'appris bientôt, par une interrogation attentive, que tous les jours, au moment de l'évacuation des scories,

#### PLUX HÉMORRHOÏDAL; CARDIOPATHIES

963

le malade rendait plusieurs cuillerées d'un liquide rouge. J'examinai l'anus, je sis exécuter des essorts de désécation, et je vis tout d'abord un jet de sang qui, sortant d'une fissure linéaire située très-haut dans le sondement, était projeté à un demi-mètre. Cet accident avait lieu une, deux ou trois sois chaque jour. Dès lors la cause de l'état du malade sut expliquée; je cautérisai la sissure avec l'azotate d'argent, opération qui sut accompagnée et suivie d'une extrême douleur; je recommençai le lendemain; l'hémorrhagie sut complètement et subilement arrêtée; un régime réparateur sut donné au jeune militaire, chez lequel les bruits de sousse cessèrent bientôt, et qui, deux mois après, jouissait de la plus brillante santé.

Une dame de quarante ans présentait les mêmes symptômes; on la traitait pour une chlorose; je reconnus la même lésion et le traitement précédent réussit avec autant de promptitude.

Les malades dont je viens de parler (page 262) étaient menacés d'une anémie mortelle, ils guérirent d'une manière complète sous l'influence des petits moyens qui viennent d'être indiqués.

482. En se servant de l'introduction de la graisse, on peut souvent so dispenser de la cautérisation des fissures.

Depuis lors, j'ai vu un grand nombre de cas semblables; mais, le plus souvent, je n'ai plus besoin d'avoir recours à la cautérisation avec l'azotate d'argent, dont le très-grand inconvénient est l'extrême douleur qu'elle cause presque toujours. J'obtiens peu à peu la guérison des fissures hémorrhagiques et de celles dont la douleur est le phénomène dominant par les moyens bien simples dont il a été parlé à l'occasion des hémorrhoïdes. Ces moyens consistent, comme on l'a vu (page 257): 1° dans l'introduction, en abondance audessus du sphincter interne, d'une mixture graisseuse et consistante, introduction que l'on réitère plusieurs fois par jour; 2° dans la précaution d'éviter les efforts de défécation, etc. C'est par des procédés semblables que sur un très-grand nombre de malades, j'ai obtenu la guérison de fissurcs douloureuses ou saignantes, et dont la persistance aurait pu compromettre la vie.

#### CHAPITRE-IX

#### MALADIES DU FOIE (HÉPATHIES).

183. Il est indispensable d'avoir recours à l'examen plessimétrique du foie, avant de croire à l'existence d'une maladie de cet organe.

Les maladies du foie sont loin d'être aussi communes que le public et le plus grand nombre des médecins le pensent. Beaucoup d'affections en imposent pour des hépathies. Une douleur, un malaise, se déclarent-ils au niveau ou au-dessous des côtes inférieures droites, on admet tout d'abord que le foie est malade, et l'on oublie que les muscles, les ners intercostaux, la plèvre, l'estomac, l'intestin, etc., etc., peuvent être le siège decette souffrance. C'est faute d'explorer convenablement, c'est parce que l'on néglige de percuter et de dessiner la glande hépatique que l'on commet de graves erreurs de diagnostic, qui compromettent la science, et, qui pis est, la vie des malades.

Que de personnes sont envoyées à Vichy pour y guérir de maladies du foie qu'elles n'ont pas; tandis

### MALADIES DU POIE (HÉPATHIES)

266

qu'elles sont atteintes de quelques troubles de digestion et surtout de gastralgies causées par des acidités gastriques, gastralgies que l'on calme en prenant les eaux à Vichy, mais qui seraient encore mieux soulagées à Paris, si l'on faisait usage, suivant ma formule (p. 234), de bicarbonate de soude à hautes doses!

Que de frais on éviterait à ces personnes, et combien ne leur serait-on pas utile en leur disant ces vérités en quelque sorte banales : les eaux et le sel de Vichy n'exercent sur le foie aucune action utile; c'est l'estomac, l'intestin et les substances contenues dans ces viscères qu'ils modifient; cette modification heureuse a lieu partout où l'on donne, dans des proportions suffisantes, le bicarbonate de soude, et où l'on administre en même temps un régime réparateur et secondé par l'exercice au grand air et par le calme de l'esprit, etc. Avant d'aller à Vichy ou ailleurs prendre des eaux (ce que l'on fait d'une manière si irrésléchie et en se laissant entraîner par une mode qui n'a d'autre avantage sur l'homœopathie que d'être un peu moins ridicule). il faut consulter un médecin consciencieux, habile dans le diagnostic, capable de dessiner plessimétriquement et à l'aide du crayon flermographique les organes en général et le foie en particulier. C'est alors que l'on saura si les eaux de Vichy et le bicarbonate de soude peuvent être utiles, et que, dans bien des cas, l'on évitera aux malades de grandes dépenses et des traitements qui ne sont pas toujours exempts d'inconvénients.

484. Utilité des respirations profondes et réitérées dans les congestions sanguines du foie (hépatémies).

Lorsque l'on est certain que le foie est congestionné, c'est-à-dire augmenté de volume par suite de l'accumulation du sang dans ses vaisseaux et dans son tissu (1), le principal moyen de remédier pour le moment à cet état est de faire pratiquer, coup sur coup, dix à vingt soupirs très-profonds et très-étendus.

Sous l'influence de ces soupirs, la figure plessimétrique qui, lors de la congestion, dépassait les limites observables dans l'état normal (13 à 14 centimètres de haut en bas, au niveau de la partie moyenne de la clavicule droite, et 3 ou tout au plus 6 centimètres à gauche de la ligne médiane), diminue de 3, 4 ou 5 centimètres dans le premier sens, et de 5 ou 6 centimètres dans la direction transversale.

Lorsque les grandes respirations dont il s'agit sont exécutées chez un adulte bien portant et robuste, en même temps que le foie diminue de dimension, les symptòmes en rapport avec l'hépatémie et surtout la dyspnée et la sensation pénible de pesanteur dans le côté droit se dissipent immédiatement.

(4) Volci les principaux caractères diagnostiques de ce fait : augmentation récente de volume, constatée par le plessimétrisme, quelquefois par la palpation; diminution rapide du foie par les inspirations profondes et accélérées; difficulté à respirer dont la cause se fait sentir dans le côté droit; sensation de pesanteur à la hauteur de la ceinture, alors que l'on est dans la station.

Le foie congestionné a quelquefois 15, 20 et même 25 centimètres de haut en bas, et dépasse souvent la ligne médiane de 40 à 20 ou 30 centimètres. 185. Jaunisse ou ictère (cholémie). Teinte jaune et physiologique de l'urine due à la présence dans la vésicule du principe colorant de la bile.

Il est une affection très-commune à laquelle on donne généralement un nom moins ridicule encore que celui dont les médecins se servent pour la désigner, car le public l'appelle jaunisse, tandis que la dénomination scientifique reçue est celle d'ictère, terme qui signifie belette aux yeux jaunes; la jaunisse est due à ce que le principe colorant jaune de la bile est résorbé par les vaisseaux et teint alors le sérum ou l'eau du sang, laquelle, pénétrant dans la trame des tissus blancs, donne à ceux-ci la coloration jaune.

Cette teinte est en même temps communiquée à l'urine elle-même formée de matériaux contenus dans le sang. La teinte jaunâtre de l'urine normale est aussi due à la même cause (1). Ceci explique comment il se fait que, dans la jaunisse, à laquelle j'ai donné le nom de cholèmie (bile dans le sang), le liquide urinaire présente une couleur d'ocre plus ou moins foncée. Or, presque toujours, dans les cas qui nous occupent actuellement, le plessimétrisme fait trouver le foie volumineux et le réservoir de la bile distendu par ce fluide.

186. Obstacles au cours de la bile dans les vaisseaux excréteurs, causant le plus souvent la jaunisse.

La raison matérielle de cette distension de la poche

<sup>(4)</sup> J'ai fait récomment des expériences sur la bile ajoutée à l'eau simple ou à l'urine, puis traitée par l'acide azotique, desquelles il résulte que la coloration jaune de l'urine normale est due à une certaine proportion du principe colorant jaune de la bile.

biliaire et de l'augmentation du foie si bien et si facilement constatées, est que, par suite de gêne, d'obstructions survenues dans les conduits extérieurs de la bile, et cela, soit par un épaississement de celle-ci, soit par les calculs, soit par suite de l'inflammation du canal cholédoque, il arrive que le liquide biliaire, sans cesse formé par le foie, ne s'écoule pas dans l'intestin et s'accumule, d'une part, dans les vaisseaux hépatiques, et, de l'autre, dans la vésicule; alors celle-ci fait ordinairement saillie, au-dessous de l'organe, dans la largeur de 3, 4 ou 5 centimètres, ce que l'on constate aussi par le dessin plessimétrique. Il arrive même parfois que les radicules des canaux biliaires, qui naissent des glandules du foie, deviennent malades, que ces glandules s'altèrent et sont le siège du dépôt de divers produits de sécrétion qui augmentent leur volume et en altèrent profondément la substance; la circulation dans les vaisseaux sanguins de l'organe biliaire étant troublée ou rendue difficile par suite de la gêne survenue dans l'excrétion de la bile, il en résulte des hépatémies et des hypertrophies du foie.

187. Moyens simples de remédier à la distension de la vésicule et à la jaunisse.

Or, quand un médecin exercé à ce genre d'exploration a reconnu un tel état pathologique, ce n'est certainement pas à un mélange d'essence de térébenthine et d'éther sulfurique (potion de Durande), ou à des capsules qui en contiennent (comme le conseille un médecin qui avoue lui-même n'avoir aucune cansiance

#### ICTÈRE, CHOLÉMIE; TRAITEMENT

270

dans ce remède); ce n'est pas au bicarbonate de soude ou à l'eau de Vichy (qui, certes, ne liquéfient ni le sang ni la bile), qu'il convient d'avoir recours, mais à des moyens bien simples et avoués par la raison qu'il faut s'en rapporter. Ces moyens sont les suivants:

- 4º Des frictions et des pressions assez fortes, pratiquées sur le lieu où le dessin plessimétrique permet de constater la présence du fond de la vésicule. Cette manœuvre, même à l'état normal, évacue si bien la poche biliaire du liquide qu'elle contient, que si on la rencontre mate dans une étendue donnée et si l'on vient ensuite à pratiquer pendant cinq ou dix minutes la friction et la pression dont il s'agit, on reconnaît bientôt que le réservoir biliaire reste vide; car on ne trouve plus sur le lieu qui lui correspondait que la sonorité et l'élasticité propres à l'estomac et à l'intestin.
- 2º Dans les cas où l'obstacle existant dans le conduit d'excrétion peut être facilement surmonté, la vésicule anormalement distendue par la bile, se vide de la même façon. Si l'on veut encore favoriser cette évacuation, il faut, pendant que la main presse sur le fond du réservoir biliaire, faire exécuter au malade des efforts semblables à ceux du vomissement (1) qui sont faciletiment obtenus en titillant la base de la langue et le

<sup>(4)</sup> Notons ici que l'évacuation de la bile par le vomissement à la suite d'efforts pour vomir, n'est en rien un signe d'affections dites bi-lieuses, car il ne s'agit ici que d'un phénomène d'expression du à la compression qu'exercent dans ce cas le diaphragme et les muscles abdominaux sur la vésicule distendue, qui laisse alors la bile s'écouler dans le duodénum.

cholémie; pressions sur la vésicule biliaire 271
pharynx avec une plume ou le doigt. Il me serait facile,
si je ne craignais pas d'étendre inutilement ce travail, de
citer un grand nombre d'observations à l'appui des
propositions précédentes.

488. Pressions, frictions exécutées sur le fond de la vésicule biliaire, calmant ou faisant dissiper les douleurs dites hépatiques.

En employant les procédés qui viennent d'être indiqués; j'ai soulagé brusquement plusieurs malades qui souffraient excessivement de coliques dites hépatiques. - Celles-ci étaient dues probablement à des névralgies en rapport avec la présence de calculs biliaires dans le conduit cholédoque; ce ne pouvait guère être dans le conduit cystique qu'ils s'étaient engagés, puisqu'une grande quantité de bile avait pu pénétrer dans la vésicule et la distendait. Un des cas les plus remarquables de ce genre, que j'ai observé (le 2 mars 1863) est celui du docteur J ..., des Ternes, atteint depuis huit jours de cholémie et qui, souffrant extrêmement, portait un foie de près de 20 centimètres de haut en bas (tandis que, dans l'état normal, cet organe n'en présente que 13 ou 14), (1) et qui dépassait de 12 centimètres la ligne médiane (l'état normal étant seulement de 3 à 6 centimètres par delà cette ligne). Chez ce malade, la vésicule du fiel (cystichole ou cholocyste) (2), présentail 8 centimètres dans le diamètre de son

(2) Voyez le Traité de plessimétrisme.

<sup>(1)</sup> C'est par le mot angicholalgie (douleur existante dans les vaisseaux de la bile) qu'il conviendrait de désigner la série d'accidents à laquelle on a donné le nom de colique hépatique.

#### 272 ICTÈRE OU JAUNISSE; BOISSONS ABONDANTES

fond, et l'on pouvait la reconnaître au-dessous du foie par la matité absolue qu'elle présentait. M. le docteur Berthold, ancien interne des hôpitaux, a constaté, ainsi que moi, que sous l'influence des inspirations profondes et accélérées, le foie diminuait et que le réservoir biliaire avait considérablement diminué à la suite de frictions, de pressions et des efforts de vomissement dont il vient d'être parlé.

# 489. Boissons à doses réitérées dans la jaunisse (éctère ou mieux jaunisse).

Des gardes-malades ne manquent guère de donner aux personnes atteintes de jaunisse de l'eau de carotte; très-probablement ce moyen a été homæopathiquement proposé, parce que la carotte est souvent elle-même d'une couleur jaune-rougeatre; aucun autre médicament n'a plus d'efficacité contre la cholémie que le suc de cette racine potagère qui n'en a aucune; les seules médications que la raison et l'expérience conduisent à employer alors que les éléments de la bile ont pénétré dans le sang, sont d'administrer en abondance, mais par petites proportions à la fois, des boissons aqueuses, en même temps que l'on fait prendre des injections d'eau dans le rectum, que l'on donne des bains, et que l'on administre des purgatifs pour évacuer la sérosité du sang. Dans de tels cas, les vomitifs sont aussi indiqués, mais principalement comme provoquant des mouvements qui, pressant sur la vésicule, font évacuer soit la bile, soit les calculs ou les productions plastiques

DYSENTERIE; LAVAGE DE L'INTESTIN 273 que les conduits biliaires peuvent contenir et qui ont causé la jaunisse.

490. Propreté de l'in: estin dans la dysenterie (colorectite épidémique) prévenant les maladies chroniques du foie.

Le foie devient très-fréquemment malade à la suite des ulcérations des intestins et surtout de celles qui affectent le côlon et le rectum. Ces eleosies se forment chez les malades atteints de colorectite épidémique (dysenterie épidémique des auteurs). C'est à la suite de la résorption par les veines qui naissent de ces intestins et qui se rendent par la veine porte à la glande hépatique, que celle-ci devient le siége d'abcès et de dégénérescences variées. Le principal moyen de prévenir ces fâcheuses suites des ulcérations intestinales est d'avoir le soin de les nettoyer fréquemment au moyen d'irrigations dans le rectum avec l'eau tiède pratiquées abondamment et le plus fréquemment possible.

Il faut très-peu compter sur les médicaments spéciaux dits résolutifs, fondants, etc., alors qu'il s'agit de maladies chroniques du foie (chronhépathies), ou de dègénérations organiques. Les moyens qui réussissent le mieux dans de tels cas sont d'une part, ainsi que l'a le premier prouvé mon confrère et ami M. le docteur Fleury, l'emploi de douches froides sur la région où l'organe malade est placé, et de l'autre, les respirations suspirieuses réitérées, comme je l'ai fréquemment constaté; comptez beaucoup moins, dans de tels cas,

#### 274 DYSENTERIE; LAVAGE DE L'INTESTIN

sur les eaux de Pougues, (préconisées sans raisons sérieuses), sur cèlles de Vichy, etc., que sur les ressources de l'hygiène et de la médecine du bon sens.

On a beaucoup abusé, dans le traitement des maladies du foie, de ces naux qui ont une efficacité trèsmarquée dans les affections de l'estomac. C'est faute d'avoir constaté suffisamment, par le plessimétrisme, l'état du foie, que l'on envoie souvent à Vichy des gens chez lesquels cet organe est parfaitement sain; et dont les souffrances sont dues à des affections gastriques.

Le tartre stibié (émétique), les purgatifs actifs et hydrorrhéïques faisant écouler aussi la bile et méritant le nom de cholorhéiques, administrés avec prudence, les secousses de vomissement provoquées, l'iodure de 'potassium à l'intérieur, les frictions avec la teinture d'iode additionnée de vingt parties d'eau, à l'extérieur, les pressions du foie à l'aide d'un bandage réussissent bien mieux que les eaux de Vichy, la térébenthine, l'éther, à remédier aux maladies chroniques du foie augmenté de volume; citer les observations de ce genre que je possède me conduirait trop loin.

Quand l'organe hépatique est volumineux, on calme parfois les douleurs que cause sa masse, au moyen d'une ceinture placée au-dessous de lui.

١.



#### CHAPITRE X

MALADIES DE LA RATE (SPLÉNOPATHIES OU SPLÉNIES).

191. Changement du lieu d'habitation dans les fièvres d'accès.

Ce n'est guère par des procédés hygiéniques que l'on peut, en général, remédier aux splénopathies et aux fièvres d'accès auxquelles elle donne lieu. Cependant, beaucoup de gens qui avaient contracté, dans les colonies, des pyrexies intermittentes rebelles, ont vu, sous l'influence du changement de lieu, leur accès se dissiper. C'est là un moyen hygiénique qui aurait été plus utile que les innombrables médicaments par lesquels on avait autrefois cherché à combattre ces affections; mais autre chose est de suspendre pendant quelques mois des phénomènes fébriles, et de guérir radicalement soit la lésion qui cause la fièvre, soit cette fièvre ellemème. Le plus souvent, après un temps plus ou moins long, on voit, dans ces prétendues guérisons, reparaître, à l'occasion de la moindre cause et avec

276 MALADIES DE LA RATE; SPLÉNOPATHIES un caractère périodique, les frissons, la chaleur, les sueurs, ou encore des nevralgies en rapport avec l'état fébrile.

Si l'on vient alors à explorer plessimétriquement la rate, on la trouve volumineuse et présentant verticalement 5, 6, 7, 8, 9, 40 centimètres, tandis que dans l'état normal elle n'en a été que 4 à 4 112 (1).

492. Utilité de la quinine solubilisée et de l'extrait quinoïde dans la curation des splénopathies et des flèvres d'accès.

L'intumescence splénique (splénomégalie) ne se dissipe pas par l'action de la bienfaisante nature; j'ai vu des malades qui, depuis dix, vingt, ou même trente ans, présentaient cette lésion de la manière la plus marquée, et chez lesquels, en un temps très-court, la quinine soluble, l'extrait de berbéris, administrée à de hautes doses, a remédié au mal et fait cesser les accès fébriles irréguliers, les sueurs nocturnes, les névralgies frontales, l'état dit cachectique (leucocythémie de M. Benett), qui ne manquaient pas d'accompagner la splénomégalie.

Il faut donc, dans le plus grand nombre des cas, avoir recours à des moyens actifs pour remédier aux accidents dont il vient d'être parlé, et c'est surtout dans les pays marécageux, dans ceux où sévissent les flèvres dites pernicieuses, qu'il convient, tout aussitôt que l'on trouve la rate augmentée de volume, d'em-

<sup>(1)</sup> Voyez le Traité de plessimétrisme.



ployer à hautes doses : soit l'alcoolé ou le sulfate de quinine, soit l'extrait de berberis (proposé par M. Armand, de Lyon), qui, agissant exactement comme la quinine, a sur elle l'avantage précieux de ne pas occasionner d'accidents cérébraux et d'être beaucoup moins dispendieux.

L'emploi de ces moyens ne rentre pas, du reste, dans le cadre de ce travail (1).

193. Douches froides sur le côté gauche pratiquées dans les engorgements de la rate et dans les fièvres d'accès.

Il est un moyen presque hygienique et qui a une trèsgrande efficacité contre la splénomégalie due à une congestion sanguine, et contre la fièvre intermittente, qui en est le symptôme à peu près constant. Ce moyen n'est autre que l'emploi des douches froides dirigées plusieurs jours de suite et pendant quelques minutes sur le lieu où la rate a son siège (c'est-à-dire sur le côté gauche et non loin du rebord costal). On doit à M. le docteur Fleury, professeur agrégé à la Faculté de médecine, des expériences remarquables sur ce sujet, expériences desquelles il résulte que l'organe splénique, tuméfié sous l'influence des douches froides, diminue presqu'à l'instant même. J'ai vérifié les faits de ce

<sup>(4)</sup> Remarquons sculement ici que la quinine n'a d'action réelle, qu'autant qu'elle est soluble. Ce médicament à l'état de poudre ne produit d'effet que chez les gens dont l'estômac contient des acides actifs et abondants. Voilà pourquoi il faut, en général, administrer la quinine solubilisée par l'acide sulfurique ou l'alcool, dont l'action n'esténergique qu'à de hautes doses.

genre qu'a observés ce médecin distingué, et j'ai même vu des cas, très-rares d'ailleurs, dans lesquels une splénomégalie avait résisté à l'alcoolé de quinine et à l'extrait de berberis, se dissiper sous l'influence des douches froides. Par contre, il est plus souvent arrivé que ce dernier moyen a échoué, tandis que les premiers ont réussi. En général, même, les douches m'ont paru avoir une action moins persistante sur la rate malade que les médicaments dont il vient d'être parlé.

194. Utilité du sel marin dans la splénomégalie et des flèvres d'accès.
 — Ses inconvénients.

Il est un remède que chacun a sous la main, qui fait promptement diminuer la rate augmentée de volume, et qui prévient alors les accès de fièvre périodique. Je veux parler du sel marin, recommandé et employé avec succès par M. le docteur Scelle-Montdézert. J'ai fait de nombreuses recherches sur ce médicament qui, donné à la dose de trente grammes, est d'une très-grande efficacité, mais qui a pour inconvénients son goût détestable et les vomissements très-pénibles qu'il cause. Ce sont exclusivement ces inconvénients qui font que, malgré les avantages incontestables que présente le sel marin, administré dans les flèvres d'accès, avantages que j'ai signales dans un rapport sur ce sujet, lu par moi à l'Académie, je n'emploie presque jamais le médicament dont il s'agit.



## RATE ABAISSÉE; PIÈVRE D'ACCÈS

185. Cas de guérison de flèvres intermittentes au moyes d'un bandage qui soutenait la rate abainsée.

Il est une lésion de la rate, qui cause la fièvre intermittente, et que ne guérissent ni la quinine soluble mi l'extrait de berberis, ni le sel marin, ni tous les médicaments du monde; je veux parler de l'abaissement de l'organe splénique. Ce viscère, mal fixé et très-mal soutenu dans le lieu qu'il occupe, peut tomber en quelque sorte dans l'abdomen, descendre jusque vers le bassin, et causer par son poids des tiraillements sur les nerfs et sur les vaisseaux qui la maintiennent dans l'hypochondre gauche. Trois fois, j'ai été assez heureux pour faire dissiper des fièvres intermitteutes, qui avaient résisté à toutes les médications ordinaires, et cela en faisant porter aux malades une ceinture garnie à gauche d'une pelote qui soutenait la rate et prévenait les tiraillements dont il vient d'être parlé.

L'un de ces saits se rapporte à une jeune créole des Antilles, qui éprouvait depuis plusieurs années une sièvre quotidienne, laquelle avait résisté à tous les moyens généralement employés. La splénomégalie qui existait céda à la quinine soluble, mais la rate restait abaissée; les accès persistèrent. Or, le bandage dont il vient d'être parlé sit cesser les accidents sébriles. Plusieurs mois après, la jeune dame ayant cessé de porter cet appareil, les accidents reparurent et surent de nouveau dissipés alors que la rate sut convenablement maintenue.

#### 280 DANGER DE LAISSER DURER LES FIÈVRES D'ACCÈS

196. Il ne faut pas attendre que plusieurs accidents aient eu lieu pour traiter la flèvre intermittente.

On voit des praticiens, qui, se fondant sur un travail de M. Chomel, pensent qu'avant de combattre la fièvre intermittente chez un malade, il faut attendre que plusieurs accès se soient succédé.

Le rapport académique de M. Chomel, s'ir ce sujet, à cause de sa forme éminemment scientifique, est on ne peut plus dangereux. D'abord, il tend à consacrer un fait complétement faux : c'est qu'ordinairement les flèvres d'accès guérissent spontanément. Or, j'ai vu plus de cent fois, dans les hôpitaux ou en ville, des cas dans lesquels on avait soumis les patients à une trèslongue expectation; à la suite de celle-ci, la rate était restée malade; les accès, qui d'abord s'étaient calmés, avaient bientôt repris une nouvelle violence.

Je me demande ensuite de quel droit un médecin ayant entre les mains un médicament innocent comme l'extrait de berbéris ou la quinine (quinine dont le seul inconvénient est de déterminer des vertiges momentanés), de quel ároit, dis-je, un médecin peut attendre plusieurs accès, laisser souffrir un malade, l'exposer à des accidents pernicieux, quand en vingt-quatre heures il est très-possible d'arrêter le mal. Ma réponse à cette question est celle-ci, c'est que l'expérimentation scientifique ne doit jamais être tentée alors que, pour la faire, on expose le malade à des souffrances et aux chances, quelque faibles qu'elles soient, d'être atteint d'accidents graves.



#### CHAPITRE XI

## MALADOS DOS REUS (MÉPRIOPATRISE)

197. Il n'existe pas de faits bien constanés qui démontrent que corrains médicaments augmentent la sécrétion de l'urine.

les organes chargés de la sécrétion urinaire, les reins, ne sont guère modifiés d'une manière directe par l'action des médicaments; ceux-ci ne peuvent leur parvenir que par la médiation du sang. On admet dans les livres un très-grand nombre de ces remetes dits diurétiques, dont les plus estimés sont : l'avoiate de potasse ou sel de nitre, la scille, la digitale, le este, la pariétaire, etc., etc. Malheureusement, ou n'a pas fait des expérimentations régulières sur ce sujet, et, par exemple, on n'a pas cherché si ces remedel, administrés sans cau, faisaient couler; lus d'urine qu'a l'ordinaire, et si l'eau donnée seule, c'est-a-dire sans eddition de médicaments, ne provoqueit pas une hyper-urrhée (augmentation dens l'écontement d'urine, jéus considérable que les diurétiques réputés les plus actifs.

## MALADIES DES REINS (NÉPHROPATHIES)

On n'a pas non plus assez tenu compte, lors de l'administration de ces remèdes, des degrés d'humidité et de réfrigération de l'air, chose qu'avant tout, l'on aurait dù faire. En effet, dans des temps pluvieux et froids, l'urine coule beaucoup plus abondamment que si la température est sèche et élevée; on n'a pas noté davantage le degré de pression barométrique, la proportion de boissons prises par les sujets des expériences, l'abondance ou la rareté des sueurs qui, chez ces divers individus, ont pu se déclarer, les écoulements auxquels leur intestin a donné naissance; or, ces circonstances modifient si bien les proportions de la sécrétion urinaire, que si l'on veut apprécier l'action diurétique d'une substance, sans avoir constaté la manière dont ces circonstances se sont présentées à l'observation, on ne peut se former une idée juste de la réalité de cette même action diurétique.

Non-seulement il faudrait, pour savoir à quoi s'en tenir sur ce sujet, avoir pris toutes les précautions scientifiques précédentes, mais encore donner à la fois et le même jour, à un assez grand nombre de gens présentant les conditions organiques analogues, le même médicament administré à des doses semblables, tandis qu'à d'autres personnes qui seraient dans des circonstances du même genre, on donnerait de l'eau avec ou sans addition de substances réputées diurétiques. On comprend combien serait grande la difficulté de telles expériences, et, comme elles n'ont pas été faites, il en résulte que chaque auteur, chaque méde-

cin est obligé de s'en rapporter aux résultats généraux et à des éléments complexes que la mémoire lui fournit vaguement; de là, une immense confusion dans laquelle les hommes consciencieux cherchent la vérité sans pouvoir la démêler. Malheureusement, ces réflexions sont complétement applicables a l'étude des sudorifiques et d'un grand numbre de médicaments. Beaucoup de points de la médecine sont sussi positifs que les sciences physiques, et cependant, lorsqu'il s'agit de thérapisme, on procède de tout autre façon que dans ces sciences.

198. L'ean est le principal agent qui angmente la sécrétion urinaire.

Le modificateur par excellence des reins, c'est l'enu que l'on fait pénétrer dans le sang par queique voie que ce soit, mais particulièrement par le tube digestif. Par conséquent, les hoissons et les injections dans le rectum, les inspirations de vapours aqueuses et les bains, sont les moyens les plus propres a agir sur les organes sécréteurs de l'arine et sur l'urine elle-même. Or, ces moyens rentrent naturellement dans la catégorie des agents hygiéniques les plus sinoles.

Je ne parlerai pas ici des divers médicaments qui, ajoutés à l'eau, peuvent modifier les reins; le faire, serait sortir du cadre dans lequel je dois me rendermer.

l'ai seulement l'intention de mentionner ici quelques faits très-pratiques, relatifs will a l'atifié des boissons aqueuses, soit à leur privation dans certains cas de maladies. Urines concentrées, épaisses, sédimenteuses. — Boissons abondantes, injections rectales.

Beaucoup de gens s'inquiètent fort alors que leur urine est épaisse, rouge et sédimenteuse; et, en effet, il en arrive souvent ainsi dans les maladies aiguës, alors que les sueurs ont coulé en abondance ou que la respiration accélérée a fait perdre au sang beaucoup de sérosité, ainsi qu'on l'observe quand un écoulement séreux ou muqueux a eu lieu dans le tube digestif, ou encore lorsqu'une grande proportion du sérum du sang s'accumule dans le tissu cellulaire et dans les cavités séreuses. L'urine, dans de tels cas, se concentre et prend les caractères ci-dessus mentionnés. Or, les principaux remèdes au symptôme : urines épaisses et sédimenteuses, remèdes qui, malheureusement, ne sont pas applicables aux hydropisies (hydrorganies) (1), consistent à faire prendre, dans un temps assez court, de copieuses proportions de boissons données par petites doses rapprochées; on peut encore étendre l'urine de beaucoup d'eau au moyen d'injections urétrales avec l'eau tiède ou (lorsqu'aucune organopathie ne le contr'indique) en ayant recours à des bains tièdes prolongés. Sous l'influence de ces moyens, l'urine cesse d'être très-colorée, épaisse, pesante et sédimenteuse. Presque toujours ce liquide est, dans l'état de santé, plus trouble

<sup>(1)</sup> Administrer, en effet, beaucoup d'eau à des hydropiques, c'est augmenter ençore la tendance aux épanchements de sérosité,

URINES CLAIRES; ABSTINENCE DES BOISSONS 288
et plus bourbeux le matin, parce que, dursat la nuit,
on ne boit pas et l'on transpire davantage (1).

309. Influence de l'humidité et de la température de l'air sur les proportions et les qualités de l'urine.

La température froide et humide de l'air rend trèssouvent claire et transparente l'urine qui, dans les
conditions opposées que l'atmosphère présentait, était
épaisse, concentrée et sédimenteuse. La raison de ce
fait est que l'on absorbe, par les voies de la respiration, une grande proportion de la vapeur d'eau contenue dans l'air; cette proportion est si considérable,
que, s'il arrive que l'on ne boive pas par un temps trèshumide, on urine considérablement. Aux points de vue
hygiénique et thérapeutique, il est très-utile de tenir
compte de ces annotations.

304. En général, il faut diminuer la proportion des boissons lorsque l'urine est très-claire, aqueuse et abondante.

Dans les maladics non Ébriles, l'urine est généralement claire, abondante. Elle contient peu d'acide urique et de principes salins ou organiques:

- 1º Quand on transpire peu;
- 2º Quand il n'y a pas de pertes de liquides;
- 3º Quand la soif porte à beaucoup boire.

C'est pour cela que, dans les affections dites pévroses, dans les névralgies, dans le frisson des flèvres d'accès,

<sup>(</sup>i) Administrer, en effet, beaucoup d'eau à des hydrophobes, c'est sugmenter encore la tendance aux épanchements de sérosité.

en sur les molectes remire un liquide urientes prosper mentionne à l'une pure. Dans de mis-cas, les molectes duvent, en general, ne lure uneque que de pen de l'unemen, et respecte, mateux que possible, un air chand et me.

Of the second of

Dans les sus su l'acide urique ou les autres sels qui entrent dons la composition de l'urine y sont en telle abondance, su'ils se concretent et forment des graviers (arrithest, le principal moyen à employer est, à coup sir, de faire passer, en peu de temps, dans le sang, et, par suite, dans les reins et dans la vessie, une grande proportion d'eau. Cette esu a l'avantage, sinon de dissoudre les calculs, au moins de rendue leur formation plus difficile et d'en favoriser l'excrétion. Si l'on fait passer autour des urolithes une plus grande proportion de liquide, il arrivera que ces corps seront plus facilement entrainés au dehors que si les malades prenaient peu de boissons.

D'ailleurs, en augmentant la proportion d'eau contenue dans l'urine, on rend moins facile la formation de nouveaux calculs. La cristallisation des sels que renferme un líquide s'opère, en effet, d'autant mieux que la dissolution des matières qui sont susceptibles de se concréter est plus concentrée.

Bien que le bicarbonate de soude n'ait pas sur la gravelle un effet aussi marqué qu'on l'admet généralement, au moins est-il qu'il peut présenter, sous ce rapport, de l'efficacité; et, comme son emploi à dose modérée et même assez forte n'est pas dangereux, on peut l'ajouter dans les proportions de 5 ou 15 grammes par litre aux boissons que prennent les graveleux et les calculeux. Les eaux de Vichy, de Contrexéville, ont, dans ces cas, beaucoup d'utilité, mais la dissolution de bicarbonate de soude administrée à hautes doses en a encore davantage.

203. Boissons à hautes doses destinées à attènuer les effets de la cantharidine et d'autres poisons contenus dans l'urine. Cas remarquable d'empoisonnement à la suite de la respiration de l'hydrogène arsénié,

Ainsi que nous l'avons dit à l'occasion des toxémies (altérations du sang par les poisons, page 175), l'eau, à doses élevées et fréquemment réitérées, est le moyen le plus pratiquement utile dans les cas où des substances toxiques ont pénètré dans le sang. L'année dernière encore, un homme robuste a respiré de l'hydrogène arsénié, et a présenté des symptômes terribles qui, en peu de jours, ont été suivis de la mort. Que faire dans un tel cas (demandai-je à un chimiste distingué, M. Fordos, pharmacien en chef à l'hôpital de la Charité), quel est l'antidote le plus convenable à employer, alors que le sesqui-oxyde de fer, insoluble, ne peut pénetrer dans le sang? Hélas! il n'en put citer aucun; tous les deux nous convinmes, ce jour-là et le lendemain, après réflexions et recherches dans les bons ouvrages, qu'il n'était pas de substance capable de neutraliser le poison arsenical après sa pénétration dans l'appareil circulatoire (angième)! Donc, c'était l'eau à hautes doses qui seule pouvait faire excréter la subsance toxique!

Eh bien l'est vrai des altérations du sang l'est aussi des produits toxiques qui, provenant de ce sang, se trouvent dans l'urine : l'observation précédente peut être citée encore à l'appui de cette proposition.

L'urine, dès le premier jour de la toxémie par l'hydrogène arsénié, était chez ce malheureux extrêmement rouge; sa couleur rappelait celle du sang contenu dans les veines (phlébéme), et bien que l'analyse chimique ne permit pas de reconnaître l'hématine dans l'urine; bien que le microscopisme n'y fit pas voir de globules sanguins, il paraissait cliniquement évident que du sang s'était écoulé de quelques-uns des points de l'appareil urinaire (angiure), et très-probablement des reins. En effet, lors de la nécroscopie, on trouva dans ces organes des hémorrhagies dont le produit avait rempli les bassinets. Il était évident que les reins avaient été altérés par suite de l'arséniémie, et que l'urine avait contenu une partie du poison et du sang. C'est de là qu'était résultée la coloration observée. N'est-il pas certain que, dans ce cas encore, le seu moyen rationnel à employer était l'administration de l'eau à doses assez fortes et réitérées?

Les mêmes réflexions sont complétement applicable s à la toxémie cantheridique ou cantheridémie (altération



vésicatoires; cantharides dans L'urine 289 de l'urine par la cantharidine), qui a lieu, soit consécutivement à l'application d'un vésicatoire, soit par suite de l'emploi à l'intérieur de cette dangereuse substance.

Ici, encore, la chimie n'indique pas de neutralisants efficaces, et faire passer dans un temps très-court beaucoup d'eau dans le sang et dans l'urine, au moyen de boissons, de bains, d'injections rectales, ou même urétrales, parvenant dans la vessie, est la médication rationnelle et utile par excellence.

#### 200. Moyens propres à prévenir l'absorption des cantharides par la surface des plaies de vésicatoires.

C'est cette médication rationnelle qu'il convient surtout de mettre en pratique lorsqu'on fait appliquer de larges vésicatoires sur la peau; et, en effet, les expériences de Magendie ont prouvé que, dans les cas où les vaisseaux sont distendus, l'absorption devient trèsdifficile.

Remarquons, cependant que l'usage des boissons à doses élevées et réitérées présenterait de graves inconvénients, s'il s'agissait d'emplatres épispastiques posés dans des cas d'hydropisies pleurétiques, péricardiques ou autres. Dans de telles affections, il scrait fort peu logique d'administrer beaucoup d'eau à l'intérieur, alors que l'on cherche, par un vésicatoire, à faire écouler au dehors la sérosité contenue dans la plèvre, dans le péricarde, etc. Rappelons, à cette occasion, que M. Duméril, mon excellent maître, a utilement proposé,

## 290 ALBUMINUMBRÉE; ABSTINENCE DES BOISSONS

pour empêcher la résorption canthafidique, de placer entre la peau et l'emplatre épispastique une seuille de papier brouillard imbibé d'huile, qui, n'empêchant pas le vésicatoire de produire ses essets accoutumés, prévient l'absorption de la cantharidine.

# 205. Abstinence des hoissons dans l'albuminurrhée dite maladie de Bright.

Les médicaments qui ont été proposés ou employés : soit contre l'augmentation simple de la sécrétion urinaire (hyperurrhée), soit contre la présence de l'albumine et du sucre dans l'urine (albuminurrhée, glucosurrhée), ont, dans de tels cas, une efficacité douteuse; ils sont plutôt destinés à combattre les symptômes de ces affections (la faiblesse, les hydrorganies, l'émaciation, l'hypémie, l'hydrémie, divers accidents du côté de l'intestin, des poumons ou du système nerveux, etc.), que la lésion principale qui donne naissance à ces phènomènes secondaires. C'est ainsi que les diurétiques, les émétiques, les purgatifs, sont surtout dirigés contre les hydropisies (hydrorganies) qui surviennent consécutivement; que les toniques et le fer administrés dans l'albuminurrhée sont prescrits contre la faiblesse générale, qui est la conséquence du défaut de sang ou de quelques-uns de ses éléments constituants, et non pas contre les états de l'urine qui viennent d'être signalés : ceux-ci ne cèdent guère aux agents pharmaceutiques.

#### GLUCOSURRHÉE; TRAITEMENT

291

206. Traitements généralement suivis dans la curation du diabète.

C'est, en général, aux moyens hygiéniques que, dans le diabète, la plupart des médecins instruits ont recours. C'est ainsi qu'ils s'accordent presque tous à recommander dans ce cas l'abstinence du sucre, des fécules et des substances végétales, tandis qu'ils conseillent l'usage des aliments azotés, tels que la viande, le gluten, etc. Leur but, quand ils font ces prescriptions, est d'empêcher la formation du sucre que l'urine contient dans cette maladie.

Malheureusement, en agissant ainsi, on ne parvient pas à prévenir la perte journatière du sucre, de l'eau et des autres éléments constituants du liquide urinaire qui a lieu dans la glucosurrhée, mais on prive l'organisme d'une proportion de matière sucrée, évidemment utile à la vie, et on fait cela sans empêcher qu'il ne s'en évacue chaque jour par l'urine.

En attendant les résultats chimiques positifs que l'on espère obtenir dans la glucosurrhée; en écartant de mon esprit des recherches très-délicates sur l'urémie (urine contenue dans le sang), que l'on suppose exister dans l'albuminurrhée, recherches qui sont loin d'avoir conduit à des données pratiques, en m'en rapportant à des faits cliniques assez nombreux, et surtout en écoutant la voix d'un rationalisme prudent, voici les moyens simples et en quelque sorte dirigés par le bon sens que j'ai proposés et vraiment utilisés

292 ALBUMINURRHÉE; TRAITEMENT, OBSERVATIONS dans la maladie de Bright, dans l'hyperurrhée et dans le diabète.

207. Cas remarquable qui m'a conduit à prescrire dans l'albuminurrhée l'abstinence des boissons.

L'urine d'un malade, qui était couché dans les salles de la Pitié, contenait une énorme proportion d'albumine; les reins, mesurés par le plessimétrisme et le crayon, présentaient verticalement et transversalement deux ou trois centimètres de plus que dans l'état normal.

Je pensai d'abord qu'en augmentant de beaucoup la quantité des boissons aqueuses ingérées, j'allais calmer la souffrance rénale et diminuer l'albuminurrhée. Or, dès le soir, voici ce qui arriva : il y eut, à la suite de l'administration de l'eau à hautes doses, une nephralgie (douleur néphrique) excessive, une augmentation de trois ou quatre centimètres dans le volume des reins; les proportions d'albumine devinrent encore plus considérables que précédemment! On comprend que je renonçai à cette médication, et qu'éclairé par l'expérimentation, je procédai en sens inverse. Je prescrivis l'abstinence absolue de toute boisson. Chose remarquable : le soir, les douleurs étaient diminuées, et elles disparurent bientôt. Le lendemain, le rein était revenu à des dimensions presque normales et les proportions d'albumine étaient infiniment moindres que la veille. Je continuai ce traitement pendant plusieurs jours, et l'amélioration fut telle que le malade, un mois ALBUMINURRHÉE; TRAITEMENT; GUÉRISON 293 après, lorsqu'il sortit de l'hôpital, paraissait presque guéri. Alors l'albumine ne se retrouvait plus qu'en très-petite quantité dans l'urine.

#### 208. Autres faits du même genre.

Depuis lors, je constatai maintes fois, sur un grand nombre de malades, que, sous l'influence de l'abstinence aussi complète que possible des boissons, d'une alimentation sèche, de la respiration d'un air chaud, les reins congestionnés, mégalisés (plus gros qu'à l'état normal), diminuent de volume; et que, dans bien des cas, ils cessent alors d'être douloureux. J'ai remarqué, en outre, que les proportions de l'albumine contenues dans un litre d'une urine sécrétée en petite proportion, à la suite de l'abstinence des boissons, différait à peine de celle qui était évacuée dans un litre d'urine recueillie alors qu'une grande masse de ce liquide avait été formée à la suite de l'administration de boissons abondantes.

#### 209. Cas remarquable de guérison de l'albuminurrhée.

Une dame de Monluçon était amaurotique par suite d'une albuminurrhée en rapport avec une hypertrophie de l'un des reins, et avec une atrophie de l'autre. La privation habituelle des boissons et quelques purgatifs rendirent moins considérable la perte de l'albumine. La néphromégalie (augmentation de volume du rein) diminua à la longue; la maladie dite de Bright se dissipa; la vue resta longtemps un peu faible. Depuis plus

294 URINE TROP ABONDANTE; ABSTINENCE DES BOISSONS de dix ans, la santé de cette dame s'est conservée; mais l'atrophie de l'un des reins a persisté. Sous l'influence des mêmes moyens, j'ai fréquemment vu s'améliorer ou se résorber les épanchements séreux et consécutifs à l'albuminurrhée.

Il résulte de ce qui précède et aussi d'autres faits observés par moi, faits qu'il serait trop long de reproduire ici, que, dans l'albuminurrhée, la privation simple des boissons aqueuses, portée aussi loin qu'il est possible de le prescrire sans trop faire souffrir les malades, est un des meilleurs moyens (si ce n'est le principal) de remédier à cette grave affection et à la souffrance des reins qui en est la cause démesurément la plus fréquente (1).

210. Abstinence de boissons dans l'hyperurrhée (augmentation simple dans la quantité d'urine secrétée). — Fait curieux.

Les mêmes considérations sont applicables à l'hyperurrhée (diabète non sucré). Un homme avait reçu
un coup violent dans la région du foie; bientôt il fut pris
d'un tel écoulement d'urine qu'il en rendait par jour
jusqu'à 30 ou 40 litres. Ce liquide était limpide et non
sucré; la soif était excessive, et le malade buvait autant
de liquide qu'il en évacuait; le rein droit était considérablement augmenté de volume. En trois jours, cet
homme, qui, malgré son indocilité, s'était soumis à

<sup>(4)</sup> Dans presque tous les cas où j'ai rencontré dans l'urine une notable proportion d'albumine, et cela dès le début du mal, les reins étaient augmentés de volume et souvent douloureux.

l'abstinence absolue des boissons, ne rendait plus que 3 litres d'une urine devenue plus colorée. Les dimensions du rein diminuèrent considérablement. Cet état d'amélioration, avec quelques variantes, persista pendant plusieurs semaines; mais le malade, dont le caractère et la violence étaient insupportables, ne voulut jamais consentir à ne faire usage que de très-peu de boisson; tout au contraire, il se livra à des excès, devint impertinent, et bientôt il fallut le renvoyer de l'hôpital.

 Administration du sucre; abstinence des boissons dans la glucosurrhée (diabète sucré).

Me fondant sur les annotations précédentes, relatives à l'albuminurrhée (page 292), j'ai été conduit, il y a quelques années, à traiter aussi, par l'abstinence des boissons, les malades atteints de diabète sucré.

Lorsque l'on a longtemps privé des malades diabétiques, soit de sucre, soit de fécules, et que l'on a donné du gluten, prescrit un régime azoté, etc., et qu'il y a toujours une grande proportion de glucose dans l'urine qui continue à être abondamment excrétée, il est, dans mon opinion, tout à fait conforme à la raison et à l'expérience de rendre, autant que possible, à l'organisme le sucre qui se perd encore, quelque chose que l'on fasse. Il paraît donc convenable d'en administrer par jour une proportion plus que double de celle que contient l'urine diabétique, et de constater, par l'analyse, si la glucosurrhée augmente, reste statjomaire ou diminue.

## 296 DIABÈTES; GLUCOSURRHÉE; USAGE DU SUCRE

On tiendra surtout compte de la quantité du sucre observée proportionnellement à la masse totale de l'urine; s'il arrive, en effet, que, ce liquide ayant été seulement d'un litre en vingt-quatre heures, il s'y trouve à peine un peu plus de glucose (ou d'albumine) qu'il n'y en avait en un jour dans chacun des deux, trois, quatre ou cinq litres qui étaient auparavant évacués, il en faut déduire que la proportion totale du sucre (ou de l'albumine) contenu dans le liquide urinaire a sensiblement décru. Une autre conclusion de ce fait sera que, si de la glucose a été en même temps largement ingérée, il faut bien qu'il en soit resté une proportion notable dans l'organisme. Remarquez enfin que le sucre est trèssoluble, et, par consequent, susceptible d'absorption, et que, dans le cas même où il ne serait pas en totalité reporté dans le sang, au moins ses éléments y seraientils utilement parvenus. Personne ne peut douter, en effet, que cette substance ne soit, au point de vue de la nutrition ou de la respiration, un aliment essentiellement utile; presque tous les animaux la recherchent, la chimie a constaté qu'elle sert à la respiration; et certes, si l'organisme en perd par l'urine, sans qu'on puisse empêcher qu'il en soit ainsi, il faut chercher à lui en rendre par les voies digestives. Ce n'est pas parce qu'il y a du sucre dans l'urine que surviennent des accidents, mais bien parce que les organes en perdent sans cesse et en contiennent moins (1).

<sup>(4)</sup> Des considérations du même genre sont applicables à l'albuminurrhée, et elles m'ont conduit à administrer aux malades qui en sent



DIABÈTES; ABSTINENCE DES BOISSONS

297

L'abstinence des boissons portée aussi loin que possible est le second moyen hygiénique qui, dans la glucosurrhée (presque toujours compliquée de la formation trop abondante d'urine), est évidemment indiqué. En effet, puisque l'urine contient du sucre dans une proportion donnée, plus on évacue de ce liquide, plus on perd de substance sucrée; or, le meilleur moyen pour éviter cette perte est d'uriner peu, et par conséquent de peu boire.

C'est donc par l'usage du sucre et par l'abstinence des boissons que je combats la glucosurrhée, et je ne le fais guère que dans des cas où le traitement généralement suivi a échoué, et malheureusement il faut dire que c'est sur le plus grand nombre des diabétiques.

#### 242. Traitement de la soif dans le diabète et dans d'autres affections.

J'ai remarqué que les malades dont il vient d'être parlé, ont fréquemment le pharynx et la membrane de la bouche rouge et brûlante. Cet état morbide est peut- être pour quelque chose dans la soif inextinguible qui coexiste avec la perte du sucre. Je me suis même demandé si cette soif excessive n'était pas une des causes principales de l'hyperurrhée et de la glucosurrhée, et si les circonstances anatomiques et physiologiques qui modifient le pharynx et la soif ne pourraient pas jouer un rôle important dans le diabète. Il n'est même pas

atteints, de l'albumine de l'œuf l'état liquide et en proportion suffisante.

impossible que les lésions de certains points de l'axe nerveux agissent de cette façon pour rendre l'urine sucrée. Quoi qu'il en soit, la soif et l'état du pharynx et de la bouche sont, dans la glucosurrhée, des circonstances auxquelles il est bon de songer. Des gargarismes avec l'eau acidulée de la façon la plus agréable possible, l'aspiration continue de l'air à travers l'eau fraîche que l'on retient longtemps dans les parties les plus profondes de la bouche et près du pharynx (1); de la glace; des tranches d'orange, sont d'excellentes précautions à prendre pour faire que les malades supportent mieux la soif.

213. Le traitement du diabète par l'abstinence des boissons et par le sucre a été adopté par des praticiens distingués de Londres.

L'abstinence des boissons et l'usage du sucre, dans la glucosurrhée rebelle, ont été employés dans mon service avec des demi-succès.

Les malades qui en avaient fait usage sont sortis dans un état d'amélioration sensible. En ville, j'ai encore mieux réussi par ce traitement, ce qui s'explique par les soins convenables que reçoivent chez eux les malades. Depuis longtemps, de petites manœuvres que je ne veux pas signaler éloignent les diabétiques de ma clinique et de mon observation particulière, de sorte que je n'ai pas réuni assez de faits personnels pour faire apprécier aux praticiens la valeur du traitement que

<sup>(1)</sup> Ce petit moyen, que j'ai été récemment conduit à employer, sur des malades auxquels il était contre-indiqué de donner des boissons, est d'une extrème utilité pour apaiser la soif.



j'ai proposé; mais les résultats que j'ai obtenus sur une petite échelle concordent pleinement avec les faits qu'en Angleterre ont requeillis des praticiens de premier ordre (4).

#### 344. Calculs des reins engagés dans l'uréfère (urolithes endourétériques).

Le seul traitement rationnel et pratique que l'on puisse utiliser, alors qu'un calcul, ayant pénétré du bassinet rénal dans l'urétère, y cause des douleurs vives, est de faire parvenir d'une manière très-rapide un grande proportion de liquides dans les conduits excréteurs des reins. Les boissons aqueuses à doses réitérées, des lavements coup sur coup, des bains tièdes prolongés, la respiration de la vapeur d'eau, tous les moyens, enfin, propres à augmenter brusquement la sécrétion urinaire, constituent, en effet, la médication la plus propre à favoriser la progression du calcul dans le conduit de l'urine. Cette proposition est si évidente que je ne crois pas utile de la développer.

Il est cependant une remarque utile à faire ici, o'est que ce n'est pas habituellement, mais de temps en temps et pendant deux ou trois heures de suite, qu'il faut chercher à porter, par tous les moyens précédents, beaucoup d'eau vers les reins. Le but de cette pratique est que la grande proportion du liquide qui s'écoule alors per ces organes forme une sorte de flot qui entraine les urolithes.

<sup>(1)</sup> En 1865 et 1866, plusieurs faits que j'ai recueillis à l'hôpital ou en ville, m'ont démontré l'utilité de ce traitement.

#### CHAPITRE XII

## MALADIES DE LA VESSIE (CYSTUROPATHIES OU CYSTURIES).

245. Écoulement spontané d'urine pendant le sommeil.

Les enfants et quelques adultes sont sujets à l'infirmité qui consiste à uriner involontairement pendant le sommeil. La plupart des médications échouent contre cette incommodité déplorable. Des moyens très-simples m'ont réussi, alors que les narcotiques, et surtout la belladone recommandée par la thérapeutique nuageuse, n'avaient eu sucune espèce de succès, et ces moyens, les voici :

- 1º Diminuer de beaucoup, au repas du soir et à l'approche de la nuit, la proportion des boissons. Il este en effet, difficile que la vessie se distende alors que l'on n'a bu que peu; le matin, au contraire, on donne des substances aqueuses pour que l'organisme ne souffre pas par suite du manque d'eau.
  - 2º Provoquer, par des frictions, par l'échaussement

#### URINATION TROP FRÉQUENTE

du lit, une transpiration modérée qui rende moins abondante la sécrétion des reins.

- 3° Faire uriner, avant qu'elles se mettent au lit, les personnes atteintes de l'infirmité dont il s'agit.
- 4º Recommander de les éveiller, dans la nuit, toutes les trois heures et une heure avant celle du lever habituel, et cela pour que la vessie ne se remplisse pas trop d'urine.
- 5° Vider le rectum, dès le matin, par un lavement ou par des purgatifs très-doux, et cela pour faire que l'intestin, excité par la présence des matières, ne provoque pas la contraction de la vessie.
- 6° Enfin, s'il s'agit d'adultes, ils doivent éviter toute stimulation des organes génitaux.

Quand on est parvenu à rompre l'habitude de l'urination involontaire et nocturne, il arrive en général que cette urination ne se reproduit pas.

#### 216. Urination trop fréquente.

Il est un assez grand nombre de personnes qui urinent d'une manière très-fréquente, et cette pénible incommodité dépend de diverses causes qu'il est souvent fort difficile d'atteindre. Tantôt, il s'agit seulement d'une habitude vicieuse, et alors il suffit de surmonter tous les jours un peu plus longtemps la sensation qui porte à uriner, pour qu'à la longue on prenne la coutume de conserver le liquide pendant un temps suffisant.

Ailleurs, la vessie est naturellement petite et devient

doulourcuse alors qu'elle contient peu d'urine. Dans ce cas encore, c'est d'une manière très-lente et successive que l'on parvient, par l'habitude, à dilater suffisamment cet organe pour qu'il puisse se laisser distendre par le liquide.

Dans d'autres cas, ainsi que j'en ai vu quelques exemples, des gens qui avaient été atteints d'abord de cysturasie (distension de la vessie) excessive, survenue pendant la durée d'une fièvre grave, puis de rétraction consécutive de cet organe dont les parois s'étaient considérablement épaissies, urinaient presque à chaque instant. Le liquide sortait par une sorte de canal qui a'étendait des urétères à l'urètre.

Or, il est arrivé qu'en donnant peu de boisson, en faisant retenir chaque jour un peu plus l'urine, j'ai été assez heureux pour remédier à la lésion que, chez d'autres malades, la nécroscopie m'avait précédemment permis de constater.

Il arrive encore qu'un corps étranger, un calcul vésical, par exemple, provoquent très-fréquemment le besoin de rendre l'urine, et ici les boissons abondantes peuvent avoir leur utilité.

L'éréthisme vénérien peut provoquer enfin des besoins fréquents d'urination, et c'est contre cet éréthisme qu'il faut diriger une médication convenable.

247. Suites fâcheuses de l'incontinence d'urine; moyen d'en atténuer la triste influence.

Des dermites, des dermonécrosies (inflammation et

RÉTENTION D'URINE CHEZ LES PETITS ENFANTS 303 gangrène de la peau), la résorption urineuse (urémie), sont, chez les paralytiques et les vieillards, les funestes effets de l'incontinence d'urine. Les soins d'une extrême propreté, l'application de poudres absorbantes, telles que celles de lycopode, de charbon, la fécule de riz, accumulées en couches épaisses et très-souvent renouvelées; chez l'homme, des réservoirs membraneux et imperméables entourant une éponge que l'on doit laver et changer toutes les demi-heures, l'exposition à l'air des parties humides et leur dessèchement, le changement fréquent de position, sont des moyens simples, utiles et généralement connus.

Ces médications peuvent, d'une part, prolonger la vie de ces infirmes et parfois donner le temps au thérapeutiste de combattre avec avantage les lésions anatomiques qui ont causé le mal.

Les applications de diachylum, saupoudré de poudre de lycopode, sont surtout d'excellents pansements pour recouvrir les rougeurs, les excoriations et les nécrosies de la peau que cause, dans les cas précités, le contact de l'urine, qui bientôt ne tarde pas à se putrésier.

218. Procédé fort simple pour vider chez les petits enfants la vessie distendue.

Lorsque, chez de très-jeunes enfants, la vessie se distend outre mesure par l'urine, on peut le plus souvent se passer de l'usage de la sonde; il suffit de presser assez fortement, mais doucement, sur les points du ventre auxquels la cysture (vessie) correspond pour que l'urine s'échappe par les voies naturelles avec facilité. (Cette annotation est due à Magendie.)

#### 219. Faiblesse du jet de l'urine due à ce qu'il ne s'accumule pas assez de ce liquide dans la vessie. — Moyen d'y remédier.

Quelques hommes, redoutant des maladies de la vessie ou du canal de l'urêtre, urinent trop fréquemment et s'inquiètent fort de ce que l'urine coule par un petit jet et à une faible distance; parsois même ils consultent certains spécialistes qui emploient de petites sondes. et, faisant plisser, en s'en servant, la membrane interne de l'urètre, qui forme alors un obstacle réel au passage de l'instrument, ils éprouvent, par suite, des difficultés dans le cathétérisme. Ils admettent, dès lors, et certes de la meilleure soi du monde, la présence d'un rétrécissement urétral ou même d'une affection prostatique. S'ils avaient présentes à l'esprit les recommandations de Mayor sur les avantages des grosses sondes, ils verraient souvent que de telles sténosies sont plutôt dans leur esprit que dans le trajet parcouru par l'urine, et qu'avec un cathéter volumineux ils arriveraient tout d'abord dans la vessie. Je suis d'autant plus autorisé à parler ainsi, que, plusieurs fois, j'ai été consulté par des malades que des hommes, d'ailleurs habiles, traitaient actuellement pour une sténosic urétrale, et chez lesquels, en me servant d'une très grosse sonde Mayor, je suis tout d'abord arrivé jusqu'à la vessie sans rencontrer sur la route le moindre indice de rétrécissement.



#### MOYEN DE FACILITER LE CATHÉTÉRISME

:

305

Lorsque l'on urine trop souvent, le liquide, étant alors en très-petite proportion dans son réservoir, ne l'excite plus d'une manière suffisante pour provoquer une contraction vive; il en résulte que l'évacuation du liquide se fait à une petite distance par un jet faible, étroit, et même en tournoyant; de là encore les terreurs qu'éprouvent les malades sur l'existence d'une paralysie vésicale.

Pour remédier à ce prétendu rétrécissement, à cette paralysie supposée dont on accuse à tort la vessie, il suffit de retenir l'urine pendant quelques heures, et de l'évacuer seulement quand un besoin pressant se fait sentir; alors la largeur et l'impétuosité du jet prouvent bientôt que la maladie est plutôt imaginaire que réelle.

219 54s. Petit moyen destiné à rendre le cathétérisme moins douloureux.

Un malade, atteint d'affection chronique de la vessie, redoutait infiniment le cathétérisme, qui chez lui assez difficile, causait de vives douleurs et des urétrorhémies légères; c'était, comme d'ordinaire, une sonde enduite d'huile dont on se servait. Me fondant sur les faits dans lesquels l'introduction dans l'anus d'un corps gras et consistant favorisait la sortie de scories indurées (page 257), et rendait l'introduction du doigt dans le rectum aussi peu douloureuse que facile, je recouvris une sonde de Mayor d'une couche épaisse de graisse de veau et de beurre de cacao (page 33), jo pratiquai avec elle le cathétérisme, qui ne causa aucune souffrance et s'opéra facilement.

230. Difficultés apparentes d'uriner résultant : de ce que la pensée est dirigée ailleurs que vers cette action alors que l'on cherche à l'exécuter ; ou de ce que le malade oublie de l'accomplir. — Moyens de remédier à cette préoccupation d'esprit ou à ce défaut de mémoire.

Un infinité de personnes ne peuvent uriner en public; arrive-t-il qu'on les regarde, il leur est impossible, malgré tous les efforts auxquels elles se livrent, de s'acquitter de cette fonction. Tout aussitôt qu'elles sont certaines que l'on ne s'occupe pas d'elles, le liquide s'écoule à l'instant. Non-seulement cela se voit chez les femmes élevées dans des sentiments modestes, mais chez des hommes qui n'ont guère de pudeur. C'est même là un des ennuis qu'éprouvent beaucoup de personnes qui voyagent, surtout lorsqu'en chemin de fer elles redoutent le départ du train, et qu'elles craignent de n'avoir pas le temps nécessaire pour uriner. Chose à laquelle on s'attendrait peu, c'est que, dans les salles d'hôpital, certains hommes, fort peu intelligents, sans éducation première, sans aucune espèce de retenue, ne peuvent, en présence des assistants, rendre l'urine nécessaire pour l'exploration chimico-médicale. Il faut faire fermer les rideaux, s'éloigner de ces malades, qui, une fois isolés, exécutent l'excrétion dont il s'agit avec une extrême facilité.

J'ai longtemps recherché quelle était la raison de ce phénomène, que M. le docteur Mercier a rapporté à une contraction spéciale de la luette vesicale. Je ne sais ce qu'il y a de vrai dans son explication; mais ce dont je



## DIFFICULTÉ D'URINER; MOYEN UTILE

307

suis certain, c'est que le défaut d'évacuation urinaire, dans les cas précédents, tient à un état particulier de l'intelligence dont il est, chez certaines personnes et au lit des malades, très-utile de tenir compte. Expliquons-nous à ce sujet.

Lorsque l'on est très-attentionné à un travail de cabinet, les objets qui sont en dehors de ce travail nous touchent peu. Archimède, cherchant à résoudre un problème mathématique, se laisse mettre à mort par un soldat romain, avant de s'apercevoir de la présence de l'ennemi. On écrit plusieurs heures de suite, on reste toute une soirée au spectacle, au bal, à une fête, sans songer même à l'excrétion urinaire (1). C'est que, dans tous ces cas, l'attention, portée sur des choses bien différentes de l'action qu'il serait parfois très-utile d'exécuter, ne peut en rien se fixer sur l'acte de l'urination, pour l'accomplissement duquel l'influence névraxique (2) sur la vessie est indispensable. C'est alors un véritable oubli d'uriner qui a lieu, et souvent la volonté se porte en vain vers l'accomplissement de l'urination; comme l'esprit est préoccupé de pensées nombreuses, telles que la crainte, un sentiment de pudeur, une appréhension très-grande du départ prochain du train du chemin de ser, etc.; ou encore, d'idées en rapport avec un travail intellectuel, il advient que l'action d'uriner ne peut s'opérer.

<sup>(4)</sup> Pendant un sommeil profond, l'urine s'accumule en très-grande proportion sans que la vessie se contracte.

<sup>(2)</sup> De l'axe nerveux.

Il en arrive surtout ainsi dans les cas de fièvres graves. Les révasseries du fébricitant (typhomanie des auteurs) le préoccupent infiniment; la sensibilité vésicale est d'ailleurs émoussée; l'urine alors s'accumule dans son réservoir, et les médecins qui ne tiennent pas compte de ces faits croient à une paralysie vésicale; celle-ci existe si peu qu'il suffit d'attirer l'attention des malades sur la nécessité où ils sont d'uriner pour que, s'occupant enfin de cet acte, ils l'exécutent tout d'abord avec facilité. Que de fois ne se serait-on pas abstenu d'avoir recours à la sonde, si l'on avait eu connaissance de ce fait (1)?

Ce n'est pas là, à coup sûr, le seul phénomène fonctionnel qui soit entravé, empêché par des impressions morales du même genre que celles qui viennent d'être signalées. Le besoin de la défécation, la contraction des gros intestins, ne se déclarent pas lorsque l'imagination conduit les idées loin de l'acte qu'il s'agit d'accomplir. Sous l'influence d'une pensée dominante, l'appétit se perd; un chagrin violent empêche la digestion gastrique de s'accomplir; l'homme absorbé par un

<sup>(4)</sup> Il est d'une utilité extrême, dans les fièvres graves, de bien constater si les malades n'ont pas la cysture (vessie) distendue par l'urine. Chez les personnes dont le ventre est rempli de gaz, de scories (fèces), ou mème de graisse, il est souvent difficile de parvenir par la palpation à obtenir la constatation de ce fait; or, il suffit, pour ne pas laisser passer sans le reconnaître un état pathologique si grave, de percuter plessimétriquement le bas-ventre, d'y trouver la matité hydrique (celle que donne l'eau) et de dessiner la vessie, pour ne pas s'exposer, par négligence et par défaut de savoir, aux accidents les plus graves. (Voyez le Traité de plessimétrisme).



travail intellectuel profond oublie en quelque sorte de respirer, et il faut que le besoin de le faire devienne pressant pour qu'il s'y livre; de là des soupirs profonds pratiqués de temps en temps et des attaques de dyspnée ou d'asthme qui, parfois, se déclarent chez des gens de lettres ou de bureau, dont le corps et les membres se refroidissent, lors du travail, avec une grande facilité.

Il est beaucoup plus dissicile qu'on ne le pense de remédier au désaut d'action vésicale qui survient par inattention. Il saut, pour y parvenir, chercher par un moyen quelconque à fixer sa pensée sur l'acte de l'urination. Stimuler légèrement l'extrémité du canal; compter successivement des chissres à l'esset de détourner les idées des objets qui causent des distractions; se rappeler, dans un voyage en chemin de ser, qu'il sussit de moins d'une minute pour uriner, alors que l'on a quatre, cinq, six minutes et plus à sa disposition avant que le train parte, etc.; tels sont de petits moyens physiques et moraux que l'on peut, avec le plus grand avantage, mettre en pratique dans de tels cas.

#### 221. Inflammation de la vessie (cysturite).

Les inflammations de la vessie sont, le plus ordinairement, causées, soit par la rétention de l'urine, soit par la condensation des matériaux constituants de ce liquide (condensation qui le rend très-actif et très-irritant), soit par le contact d'urolithes avec la membrane interne de la cysture (vessie); soit par

## 310 INFLAMMATION DE LA VESSIE (CYSTURITE)

l'addition de certains agents toxiques qui, tels que la cantharidine, sont dissous dans l'urine et altèrent alors les parois de la cavité dans laquelle ce liquide est contenu.

Ce n'est pas en général par des médications spéciales, par des substances à propriétés particulières, telles que les résines, les baumes, etc., que l'on remédie à la phlegmasie vésicale; c'est bien, au contraire, par des moyens simples, rationnels et en grande partie hygiéniques, par ceux, ensin, que je vais indiquer, que l'on arrive à ce résultat.

222. L'indication principale à remulir dans la curation des inflammations de la vessie, est d'éviter les aliments excitants et d'étendre l'urine de beaucoup d'eau.

Les indications fondamentales sont ici de faire en sorte que l'urine contienne le moins possible : d'acide urique; d'autres sels qui s'y trouvent d'ordinaire en dissolution et de son principe colorant jaune, (que j'ai expérimentalement démontré n'être autre que celui de la bile) (1). Il faut donc éviter les aliments dont l'usage est suivi de la formation de plusieurs de ces substances, o'est-à-dire de matières animales, d'alcool, etc.; d'un autre côté, le liquide que renferme la vessie doit être étendu de la plus grande quantité d'eau possible, et cela dans l'intention que son contact blesse peu la membrane endocysturique. Pour cela, il faut, comme il a été dit pour la curation des inflammations des

reins, porter de l'eau dans la circulation par toutes les voies où l'on peut en faire parvenir; c'est-à-dire par l'estomac, au moyen de boissons aqueuses; par le rectum et le vagin, en se servant d'injections; par la peau, en plongeant longtemps les malades dans des bains tièdes; enfin, par les voies de l'air, en faisant respirer des vapeurs aqueuses, etc.

En combinant ces diverses médications, on voit trèspromptement l'urine devenir abondante, claire, et finir par différer fort peu par l'apparence et par le poids de l'eau elle-même. Alors, comme corps dit irritant, elle a peu d'action, mais elle pourrait encore, par son abondance, avoir une influence fâcheuse sous le rapport de la distension qu'elle causerait et des contractions fréquentes qu'elle provoquerait. C'est pour cela qu'il convient de ne donner des boissons, des lavements aqueux, etc., qu'en petites proportions à la fois, mais d'en administrer d'une manière très-fréquente. On ne saurait croire combien on calme promptement les souffrances aiguës de la vessie ou cysture, en suivant les préceptes que je viens d'exposer, et combien la médication ici proposée est plus utile que les remèdes spéciaux qui sont généralement recommandés dans de semblables cas.

223. Injections d'eau par l'urêtre dans la vessie malade.

Les injections d'eau pure et surtout d'eau distillée pratiquées par l'urêtre dans la vessie enflammée sont aussi d'une extrême efficacité; mais ici il faut encore avoir le soin de ne pas les faire assez abondantes pour distendre la cysture. C'est pour éviter cette distension que la sonde à double courant, de M. Jules Cloquet, est d'une si grande utilité. Non-seulement les injections urétro-vésicales ont l'avantage d'étendre l'urine et de faire qu'elle blesse moins la surface interne de la vessie, mais encore elles entraînent hors de ce réservoir les produits pathologiques (mucosités, sang, pus altérés, concrétions d'acide urique, etc.) que le bas-fond de la vessie peut contenir. Ces substances blessent la membrane muqueuse cysturique, et, susceptibles d'être en partie absorbées, elles exposent ainsi le malade aux accidents que causent la pyémie, l'urémie, etc.

#### 224. Traitement du catarrhe de la vessie.

Sous le nom de catarrhe de la vessie on a réuni des lésions variées, telles que des écoulements muqueux ou puriformes et chroniques; de véritables sécrétions purulentes dues à des ulcères eux-mêmes entretenus par la présence de graviers (urolithes) et des cysturrhées (écoulements par la vessie), résultant de la souffrance du réservoir urinaire par suite de la rétention fréquente de l'urine, suite elle-même du rétrécissement du col prostatique ou de l'urètre. Ici, comme ailleurs, c'est avant tout la cause organique (calcul ou urolithe, rétrécissement du col vésical, sténosie du canal d'excrétion) qu'il faut combattre. Ces médications fondamental s ne sont remplies que par des moyeus physiques dits chirurgicaux ou par des médications p.us ou moins



CATARRHE DE LA VESSIE; CAS DE GUÉRISON compliquées, dont je n'ai pas à parler. Lorsque l'on a satisfait à ces soins si utiles, il faut évidemment remédier à l'état de la membrane vésicale qui donne lieu à l'écoulement; pour y parvenir, ce n'est guère sur les médicaments qu'il faut compter, et la térébenthine, les baumes de toutes sortes, le poivre cubèbe et le baume de copahu lui-même (que, dans des cas pareils, j'ai inutilement employés) ne réussissent pas plus que le goudron, les bourgeons de sapin, et la plupart de ces médicaments qui, donnés avec assurance, font bien prendre patience aux malheureux atteints de ce que l'on appelle catarrhe vésical, mais qui, en général, ne soulageant guère, ne guérissent pas beaucoup plus. Dans des cas pareils, les vésicatoires sont dangereux, et les cautères, les moxas, ne remédient pas au mal.

#### 225. Moyens aussi rationnels qu'utiles à employer dans les cas de catarrhe de la vessie.

Dans le catarrhe de la vessie, disons mieux, dans la cysturie chronique avec écoulement muqueux ou puriforme (cysturrhée, cysturopyorrhée), qu'il y ait ou non état dit insiammatoire, les indications sont exactement les mêmes que dans la cysturite aiguë (p. 310). C'est dans l'usage de tous les moyens capables de rendre l'urine moins abondante et moins chargée d'acide urique, de sels, etc., qu'il faut établir les bases principales du traitement. On aura recours à cette médication en même temps que l'on remédiera, autant que

314 CAS DE GUÉRISON DE CATARRHE DE LA VESSIE

possible, aux divers états pathologiques qui coexisteront, tels que le défaut de sang, les maladies des
reins, les affections du tube digestif, si tréquemment
observées dans les cas de catarrhe vésical des auteurs.

# 226. Observations remarquables de guérison du catarrhe de la

Les deux observations suivantes choisies entre un assez grand nombre d'autres, serviront à prouver la justesse des considérations précédentes.

M. B..., sexagénaire, était atteint, depuis deux ans, de tous les symptômes attribués au catarrhe de la vessie porté au plus haut degré. Urines infectes, troubles à leur sortie, et laissant déposer, par le refroidissement, des mucosités puriformes, épaisses, qui s'élevaient à un tiers de la hauteur du liquide : douleurs habituelles et parfois excessives dans le lieu où la vessie (cysture) a son siége; gêne dans l'émission du liquide urinaire; en même temps, état fébrile continu avec paroxysmes parfois réguliers, et, de plus, émaciation considérable; teinte jaune de la peau, qui était ridée et comme tannée, etc., etc.; tels étaient les principaux symptômes qu'éprouvait ce malade, qui paraissait devoir promptement périr. Me fondant sur les considérations précédentes, je soumis M. B.... à l'usage d'abondantes boissons aqueuses, et données par petites doses; aux injections, fréquemment réitérées, d'eau pure dans le rectum; à des bains tièdes longtemps continués; à un régime réparateur, mais médiocrement animalisé, et je fis proportionner les quantités de liquide ingéré au degré de densité, d'épaississement de l'urine et à sa composition. En peu de jours, le sédiment devint moins abondant et peu épais, les douleurs se calmèrent, puis cessèrent; tous les symptômes s'amendèrent; l'appétit reparut; les aliments rétablirent le corps émacié, et le malade vécut quinze années dans un état de santé presque parfait; seulement, quelques rares rechutes survinrent; mais sous l'influence des mêmes moyens, aucunes suites fâcheuses n'eurent lieu. Tous les médicaments généralement usités dans des cas pareils avaient échoué, et les narcotiques n'avaient en rien calmé les douleurs.

M. L. S..., banquier américain et l'un de mes excellents amis, fut exactement dans le cas de M. B..., avec cette différence qu'il était atteint, en outre, d'un rétrécissement de l'urètre, et qu'il ne pouvait, en conséquence, se passer de l'usage des bougies. Inutilement avait-il eu recours à des hommes de premier ordre comme chirurgiens; et, probablement, s'ils n'avaient pas réussi à guérir cette urêtro-sténosie, c'était à cause du caractère assez difficile du malade. Les symptòmes du catarrhe vésical chez M. L. S... ne différaient en rien de ceux que présentait M. B... Le même traitement fut suivi de résultats aussi heureux chez l'un que chez l'autre; ce n'est qu'il y a peu de temps, et vingt ans après mes premiers soins, que M. L. S... succomba, mais non pas à la maladie de la vessie, qui, cependant,

## 316 CATARRHE DE LA VESSIE

venait de reparaître; ce fut un érysipèle de la face, suivi d'un abcès de l'orbite, lequel avait fait proéminer énormément l'œil gauche, qui détermina la mort (1).

(4) Cette complication ne méritait pas plus à l'érysipèle (dermite periasique) l'épithète exophthalmique, que le goître ne doit être ainsi désigné alors qu'il est suivi de la saillie du globe oculaire.



#### CHAPITRE XIII

# MALADIES DES ORGANES GÉNITAUX DE L'HOMME (ANGIOSPERMIES.)

227. Les prétendus médicaments aphrodisiaques sont inutiles et dangereux.

Un seul médicament exerce une action spécifique et incontestable sur les organes génitaux de l'homme, et cette substance est un affreux poison qui porte, sur l'appareil urinaire ou angiure, une déplorable influence; cet agent est le principe actif des cantharides ou la cantharidine, laquelle, pénétrant dans le sang par résorption cutanée, par ingestion stomacale ou rectale, détermine un état morbide des voies urinaires d'où résulte l'inflammation des reins (néphrite), la phlegmasie de la vessie (cysturite), l'albuminurrhée, etc. C'est dire que le médecin consciencieux, l'honnête homme, ne doivent jamais avoir recours, alors qu'il s'agit des maladies de l'angiosperme (organes génitaux de l'homme), à un semblable moyen, et que les faibles avantages qui pourraient parfois résulter de son emploi ne seraient que

### 348 MÉDICATIONS APHRODISIAQUES

momentanés et de trop peu d'importance pour compenser les énormes inconvénients dont l'emploi de la cantharidine serait souvent la source.

Les prétendus médicaments que l'on dit agir en sens inverse de la cantharidine, et dont autrefois on louait si fort les vertus, tels que le nénuphar, l'agnus castus, sont à peu près d'une inefficacité absolue.

Tous les toniques du monde sont incapables de rendre les forces à des organes usés; et c'est ailleurs que dans la matière médicale qu'il faut chercher les moyens de remédier à l'inaction dont l'angiosperme est parfois atteint.

Les médications utiles dans les cas dont il vient d'être parlé se tirent de l'hygiène, du régime, de la manière de vivre, de la gymnastique, des mœurs et de l'influence du moral sur le physique.

223. C'est dans les ressources de l'hygiène qu'il faut rechercher les médications véritablement aphrodisiaques.

Les moyens capables de prévenír la faiblesse maladive et anticipée des organes génitaux est de ne pas abuser de ces organes et d'en user avec modération. Que la jeunesse ait ce précepte profondément gravé dans l'esprit; qu'elle se rappelle que les excès de tout genre auxquels elle se livre trop souvent, que les plaisirs solitaires ou prématurés, et surtout que la honteuse orgie et la volupté, avec absence de sentiments affectueux, détruisent l'homme au physique tout aussi bien qu'au moral. Les vieillards de vingt ans, que les plai-



IMPUISSANCE, PRÉOCCUPATIONS D'ESPRIT sirs solitaires ou la débauche sans frein et sans mesure ont condamnés à une décrépitude anticipée, sont les plus malheureux de tous les vieillards !

Ce n'est pas assez que certains hommes qui se sont ainsi usés aient ainsi perdu la virilité; il en est d'autres qui, ayant excité au delà de toutes proportions le système nerveux, l'intelligence et leurs organes, deviennent nosomanes par excellence. Ils se persuadent être atteints d'affections graves alors qu'ils n'ont que des indispositions et de ces douleurs légères, de ces malaises auxquels presque tous sont sujets, et qui inquiètent fort peu un homme doué de quelque philosophie.

229. Cas d'impuissance causé par la préoccupation d'esprit, la distraction. - Guérisons remarquables.

Parmi les craintes habituelles des nosomanes dont il vient d'être parlé, il en est une qui les désespère et qui les jette dans une profonde tristesse, dans un découragement absólu : c'est celle d'avoir perdu complétement la virilité. Cette malheureuse appréhension les poursuit si bien, que leur imagination, fixée sur leur terreur perpétuelle, les détourne de toute autre pensée, et même de celle qui a rapport à l'acte qu'ils veulent exécuter. De là le défaut de toute disposition à ce même acte, et une absence complète d'aptitude à l'accomplir. C'est là un fait analogue à celui qui consiste à ne pouvoir uriner devant témoins (p. 306).

Après avoir interrogé avec soin un grand nombre de ces nosomanes qui se croyaient impuissants, j'ai constaté que, pour la plupart, au moment où ils devaient accomplir la fonction qu'ils désiraient exécuter, ils en étaient détournés par cette idée fixe qu'ils ne pourraient y parvenir et qu'ils en seraient pour la honte de leur faiblesse. J'ai pensé, dès lors, que tant que leur appréhension continuerait d'avoir lieu, leur débilité persisterait. Je les engageai donc à avoir en eux toute confiance; je leur affirmai que leur débilité n'était que dans leur esprit; j'ajoutai qu'il ne fallait, en aucune façon, douter d'eux-mêmes; que leur imagination devait être ramenée vers l'acte qu'ils voulaient accomplir, et que, sans se laisser entraîner par une crainte chimérique, il s'agissait de s'abandonner en quelque sorte, sans appréhension ridicule, aux sensations actuelles qu'ils éprouveraient. Mes conseils, l'influence d'une assirmation sorte sur des esprits saibles, ma volonté franchement accentuée, domptèrent la pusillanimité de ces personnes, et j'ai été assez heureux pour ramener ainsi à la virilité bien des individus qui ne pouvaient se rendre maîtres d'une tristesse, je dirai même d'un désespoir de tous les moments. Des consultations semblables sont des preuves de plus que le reproche fait aux organiciens, de ne pas assez tenir compte de l'influence du moral sur le physique, est aussi peu fondé que malveillant.

#### 230. Stérilité chez l'homme.

C'est la présence, dans le liquide spermatique, de zoospermes actifs et bien constitués, qui chez les ani-

maux est le caractère principal de l'aptitude à la procréation de nouveaux êtres. Ce sont donc les circonstances propres à favoriser la nutrition, c'est la continence observée pendant un certain temps avant de se livrer à l'acte vénérien, qui peuvent réussir à faire devenir pères des gens que les excès ont épuisés. Ne comptez en rien ici sur les médicaments, sur les excitants de toute sorte, sur le fer, etc.; le régime, l'hygiène, seuls, peuvent donner à l'organisme les matériaux nécessaires à la formation d'organismes nouveaux. Certes, le principe animateur de ces derniers, le mythe, qui donne la vie, et que j'ai désigné par le mot psychatome, et que la philosophie est forcée d'admettre, n'est pas créé par l'alimentation; mais, au moins, les substances organisables que ce principe, quel qu'il soit, peut animer, ne rentrent dans la sphère de son action qu'autant qu'elles y sont portées par la médiation des organes de la nutrition et de la circulation. Ce serait dépasser les limites de la stupidité que d'attribuer au quinquina, au fer, au musc, etc., une action telle qu'ils fissent former et animer des zoospermes. On se demanderait tout au plus si la matière cérébrale, si la laitance des poissons donnerait plus que d'autres aliments quelques matériaux nécessaires à l'organisation primitive des spermozoaires; mais encore ce serait en faire une question relative à une hypothèse qui, tout en n'étant pas inadmissible, n'en serait pas moins tout à fait en dehors de l'observation et de la froide raison.

#### PERTES SÉMINALES

#### 231. Spermorrhée ou pertes séminales.

De toutes les causes d'épuisement ou de stérilité, la plus active est à coup sûr la spermorrhée ou spermatorrhée, dont Lallemand a exagéré les tristes effets, mais qu'il a étudiée avec un soin extrême. Je suis loin d'admettre, avec ce grand observateur, que de lègères cautérisations pratiquées vers l'orifice des conduits éjaculateurs suffisent pour remédier à l'écoulement spermatique; mais, profitant de ses intéressantes recherches et appelant la physiologie et l'observation clinique à mon aide, j'ai réussi très-fréquemment à remédier à la spermorrhée par des moyens hygiéniques aussi simples que faciles à mettre en pratique, et ces moyens les voici :

- 1º Les pertes séminales de la nuit ont lieu, en général, dans les premières heures qui suivent le moment de se mettre au lit, ou le matin de très-bonne heure. Conséquence logique: il faut réveiller ceux qui en sont atteints quelques minutes ou un quart d'heure avant l'époque dont il s'agit.
- 2º L'usage modéré des fonctions génitales, alors qu'il a pour point de départ des sentiments affectueux, est le moyen par excellence pour faire cesser brusquement la honteuse habitude des excès solitaires. Ce même moyen, si utile dans ce cas, est le meilleur remède contre la spermorrhée.
- 3. Les rêves sont en général les conséquences des impressions, des sensations ressenties la veille ou les



#### PERTES SÉMINALES

jours précédents, et les songes érotiques sont principalement dans ce cas; c'est donc un conseil utile à donner que d'engager le spermorrhéique à éviter la vue de tout objet licencieux et la lecture de livres du même genre, ainsi que toutes les circonstances capables d'exciter les organes dont le repos est ici absolument nécessaire.

- 4º C'est surtout lorsque des matières stercorales contenues dans le rectum pèsent sur les vésicules séminales et les compriment que la spermorrhée a lieu; l'usage de purgatifs doux et habituels peut avoir ici une grande utilité.
- 5° C'est encore lorsque le dernier des intestins est irrité, douloureux, que se déclarent parfois, la contraction des vésicules séminales (cystospermes), et, par suite, les pertes de semence. C'est dire qu'il faut surveiller avec soin l'état du rectum, nettoyer cet intestin avec de l'eau, et remédier aux hémorrhoïdes et aux autres lésions que cet organe présente. Des injections avec l'eau froide ou avec la graisse liquéfiée par une douce chaleur sont ici particulièrement utiles.
  - 6° C'est surtout la compression exercée par les matières sur les cystospermes, au moment de la défécation par des scories volumineuses, inégales et dures, ce sont les efforts auxquels on se livre lors de cette évacuation, qui déterminent très-fréquemment la spermorrhée. Il faut chercher à rendre moins volumineuses et moins dures les masses stercorales qui passent par l'anus; introduire abondamment et très-haut, par cette ou-

verture, une grande proportion de la matière graisseuse dont il a été parlé (p. 33). Le mucilage de graines de lin très-épais pourra favoriser le glissement des matières. On doit surtout ne pas exécuter de grands efforts et avoir plutôt recours à ceux qui se font par une inspiration forcée, et non pas par des expirations énergiques.

7º Lallemand a parfaitement établi que les pertes séminales se manifestent fréquemment à la suite de l'excrétion urinaire, et qu'elles se manifestent par l'écoulement d'un liquide clair, visqueux et filant, tachant le linge, et dans lequel le microscope permet de constater l'existence de zoospermes. C'est beaucoup plus rarement que du liquide spermatique coule avec le jet d'urine, tandis que bien plus souvent des efforts ultimes d'excrétion donnent lieu à la spermorrhée. De là l'utilité, dans cette affection: 1º d'uriner rarement et de faire que la vessie soit pleine avant de se livrer à cette fonction: 2º de ne boire que modérément, asin de rendre moins fréquent le besoin d'exécuter cette action: 3º de chercher à s'abstenir des efforts qui, souvent. ont lieu lors de l'excrétion des dernières gouttes d'urine; 4º de s'enquérir, par les symptômes fonctionnels et par le cathétérisme, s'il n'existe pas quelque circonstance matérielle, telle que des urolithes, des troubles permanents de circulation, des érosions, des rétrécissements du canal urétrique, des affections de la prostaste, etc., qui soient, pour les vésicules sémineles, des causes organiques de souffrance et de contraction:



PRÉSURVATION DE LA STPULLE, MOTENS RYGIÉROQUES 2006 dans le cas où il en serait zinsi, le point culminaut du traitement-acrait de remédier à ces états pathologiques, sources de la spermorribée.

Ce n'est que dans le cas où les moyens et les précautions hygiéniques précédentes seraient sans résultats avantageux qu'il fandrait cautériser légèrement les orifices urêtraux des conduits éjaculateurs.

8° Des douches froides, l'application de glace sur la région du périnée (espace compris entre l'anus et le scrotum), des injections dans le rectum avec l'eau froide, peuvent aussi avoir, dans la curation de la spermorrhée, le plus grand avantage.

222- Affections vénérieunes (syphinosorganies); moyens de préservation.

Laissons-à des trafiqueurs de malades les annonces pompeuses de médicaments préservatifs contre les afections syphiosiques, et affirmons, comme des vérités de premier ordre, les propositions suivantes:

4º Si l'on n'est pas assez prudent et assez sage pour éviter de s'exposer aux causes de ces affections, il faut au moins être assez soigneux de sa santé pour laver avec une attention extrême les organes par lesquels le mal peut être contracté. C'est avec l'eau tiède ou froide, mais toujours abondante, rendue même un peu savonneuse, que les lotions dont il s'agit doivent être faites, et ces lotions seront pratiquées immédiatement après l'acte qui pourrait donner lieu à l'affection dont il est ici question.

## 326 PRÉSERVATION DE LA SYPHILIS, MOYENS HYGIÉNIQUES

- 2º Un lavage du même genre doit être fait au moyen d'un petit courant d'eau dans le canal de l'urêtre. Pour l'y faire parvenir, on écarte les fords de l'ouverture de ce conduit; la légère injection dont nous parlons doit être continuée pendant une minute au moins.
- 3. C'est particulièrement au-dessous du repli de la peau, près du gland et dans l'enfoncement qui s'y trouve, que le nettoiement dont il s'agit doit être fait avec la plus grande attention.
- 4° Les personnes chez lesquelles une sécrétion trèsabondante de matières sébacées a lieu vers ces parties, les individus dont le gland est habituellement couvert et dont le tégument est rouge et l'épiderme balanique mince, doivent principalement mettre en pratique les conseils précédents.
- 5° Toute douleur vive, en rapport avec une déchirure cutanée des organes exposés à un contact dangeroux, doit faire immédiatement cesser l'action dont nous parlons, et doit être à l'instant suivie de lavages faits avec soin.
- 6º Après les lavages, des bains locaux seront extrèmement utiles,
- 7° A la moindre écorchure observée, on apposera sur le mal, après le lavage et le desséchement du tégument, du diachylum échauffé et recouvert de poudre de lycopode (p. 20).
- 8° Si, malgré tous ces soins, il arrivait, ce qui n'est pas croyable, que dans les jours suivants il se manifestât une éruption, une vésicule, etc., le médecin au ni-



SYPHILIS; UTILITÉ DE LA PROPRETÉ

veau de la science ne manquera pas de toucher la partie malade avec l'azotate d'argent, et d'avoir recours à quelques applications hydrargyriques peu excitantes.

0° S'il surveneit, dans les huit jours qui auraient suivi l'action dont on redouterait les conséquences, le plus léger écoulement blanchâtre ou jaunâtre par l'urêtre devenu le siège de démangeaisons ou de picotements, tout d'abord, et sans attendre l'inflammation, on prendrait, pendant quatre jours et toutes les trois houres, 10 grammes de potvre cubèbe en poudre, délayés dans un quart de verre d'eau aromatisée avec le sirop de fleurs d'oranger. En même temps, on aurait recours, toutes les trois heures, à une injection faite avec une ou deux cuillerées de dissolution d'un gramme de sulfate de zinc dans 100 grammes d'eau.

J'affirme que ces moyens si simples guérissent promptement les écoulements urétriques. Si le mal reparait après quelques jours, on recommence le même traitement et presque toujours alors avec le plus grand succès.

233. Extrèmes inconvénients de la malpropreté; utilité des moyens de préservation précédents.

La propreté la plus minutieuse est le moyen préservatif par excellence des affections dont il vient d'être parlé; elle contribue surtout à en calmer les symptômes et à les rendre moins graves.

Les moyens, presque tous hygiéniques, qui viennent

## VÉTEMENTS MAL COUPÉS; INCONVÉNIENTS

328

d'être conseilles, sont tellement utiles, et il serait si important de les vulgariser, d'en rendre la connaissance presque populaire, que, s'ils étaient partout ponctuellement suivis, la syphiosorganie non-seulement perdrait de sa gravité, mais encore ne tarderait pas à disparaitre complétement. La malpropreté est la source des maux les plus graves. Les matières pourries, solides, liquides ou gazeuses, venant à se mêler aux virus, aux miasmes, communiquent à ceux-ci un caractère pernicieux qui en exagère infiniment le danger. Le septiose (agent septique) est une sorte de serment délétère qui altère profondément le sang et les organes; et dans quelque maladie que ce soit, l'hygiène prescrit d'éliminer ou de détruire les matières putrides. Si les hommes n'étaient pas soumis à la viciation des substances animales contenues dans l'air stagnant et ne se renouvelant pas, la plupart des épidémies disparaîtraient ou perdraient toute leur gravité. C'est ce que j'ai établi dans vingt mémoires, dont il serait trop long de donner ici l'analyse sommaire (1).

234. Pantalons mal coupés, donnant lieu à des douleurs testiculaires (didymalgies).

On m'a quelquesois consulté pour des douleurs dont les testicules étaient le siège, et qui ne reconnaissaient en rien pour cause une affection syphiosique de l'urêtre,

<sup>(1)</sup> Mémoires: sur les causes de la fièvre typhoïde; sur les causes de choléra et sur l'ophthalmie palpébrale. (Clinique médicale de la Pitié.); Sur les épidémies qui ont régné en France de 4830 à 4836. (Mémoires de l'Académie impériale de médecine, 1836.) Sur les épidémies qui ont

ou une altération organique de quelque gravité. Rien d'appréciable aux sens ne pouvait être observé; cependant un examen attentif, des recherches relatives à la manière dont le mal s'était déclaré et aux circonstances qui avaient accompagné sa manifestation, me portèrent à croire que, la saillie du pantalon entre les cuisses n'étant pas assez remontée et ne s'élevant pas assez haut, il en résultait : que le didyme était sans cesse en contact avec cette saillie; que, lors des mouvements exécutés par les membres inférieurs, l'organe se trouvait comprimé, blessé, modifié, et que de là résultait la douleur. Si la lésion testiculaire ainsi produite avait persisté, des inconvénients graves en aurajent pu résulter. Il m'a suffi de faire remonter le pantalon pour que les douleurs dont il vient d'être parlé se dissipassent complétement et avec promptitude.

235. Moyens de compression très-simples et très-utiles dans certains cas de didymomégalie (augmentation de volume du testicule.)

Dans un assez grand nombre de cas de didymies, il serait extrémement utile d'établir sur la partie malade une compression méthodique (1), mais la plupart des

règné en France en 1837. Sur les habitations privées. (Thèse de concours pour le professorat, 4838; Traité de diagnostic, tome 1°°; Traité de médecine pratique, article septicémie.) Sur les dermopathies de la région sacrée. (Thèses de la Faculté par M. le docteur Blanchet); Traité de médecine pratique, etc., etc.

(1) On lira avec utilité dans le Courrier médical n° 37 de 4865, une observation relative à une affection remarquable du conduit déférent et de la glande dont ce conduit émane.

## 330 TUMEUR SCROTALE; BARDAGE COMPRESSIF

moyens que l'on cherche à employer pour l'exécuter remplissent d'une manière très-incomplète le but que l'on veut obtenir.

Appelé pour donner des soins à un lord anglais, le comte de D..., je constatai l'existence d'une énorme hernie scrotale que l'on avait prise pour une hydrocèle. Ce fut au plessimétrisme que je dus l'exactitude de ma diagnose. D'abord, je ne pus faire rentrer la tumeur; alors je l'entourai d'un suspensoir en tricot, je passai une multitude de lacets dans ses mailles, et, tirant sur eux d'une manière successive, puis les nouant, j'arrivai ainsi à établir, dans toute l'étendue de cette énorme masse, une compression égale. Bientôt la hernie diminua, et, trois jours plus tard, les intestins avaient repris leur place dans l'abdomen. L'observation dont il s'agit a été publiée, en 1834, dans le Bulletin clinique, recueil qui ne se trouve plus dans le commerce et qui renserme des faits nombreux qu'il serait bon de réimprimer.

Récemment, j'ai eu recours à un procédé très simple pour comprimer de toutes parts l'organe dont nous parlons, en laissant libre toutefois (précaution indispensable) le cordon des vaisseaux. Je pris une bandelette d'emplatre de diachylum étendu, comme je l'ai dit (page 20), sur du taffetas. Cette bandelette avait tout au plus un centimètre et demi de largeur. Je m'en servis pour établir un lien circulaire à l'entour de la partie de la tumeur située près du cordon des vaisseaux, et je fis ensuite un second tour semblable avec une

autre bandelette placée par dessus la première. Entre ces deux petites bandes ainsi disposées en cercle, je plaçai d'autres bandelettes analogues, mais qui coupaient à angle droit les premiers liens. Je plaçai ces bandelettes de façon à ce qu'elles anticipassent les unes sur les autres et à ce qu'elles pussent se recouvrir sans laisser entre elles d'espace vide. Leurs deux extrémités, qui dépassaient les liens circulaires, furent repliées sur ceux-ci, à l'effet de donner aux liens transversaux un point d'appui. Il résulte de l'ensemble de cet arrangement que l'on avait une série de petites bandes qui, entourant l'organe de toutes parts de la manière la plus solide, et se fixant par leurs deux extrémités aux liens circulaires, établissaient une compression d'autant plus forte que les bandes étaient serrées davantage. Les vaisseaux du cordon ne souffrirent pas de cette compression, et la glande, toute pressée qu'elle était, pouvait encore verser, par le canal déférent et les veines, dans la circulation, les liquides qu'elle contenait. Cet avantage est le plus grand que l'on puisse espérer de l'emploi de ce bandage.

Dans plusieurs cas chroniques, je me suis servi de l'appareil qui vient d'être décrit, et cela avec une extrême utilité. Dans la craînte de déterminer une carcinémie secondaire, je me donnerais garde de l'employer dans les didymocarcinies.

## CHAPITRE XIII

## MALADIES DES ORGANES GÉNITAUX DE LA FEMME

S'il s'agissait ici de passer en revue les innombrables affections de la femme et de faire voir combien les meyens hygieniques et les plus simples modifient heureusement chacune d'elles, il faudrait entrer dans des détails si étendus, qu'à eux seuls ils formeraient un volume. Telle n'est pas mon intention, et je ne parlerai dans ce travail que de quelques médications hygiéniques qui sont d'une utilité incontestable dans diverses souffrances de l'angiove (appareil génital de la femme).

## 236. Apparition première de la menstruation.

Les moyens que le bon sens et l'hygiène conseillent pour provoquer chez la jeune fille impubère la première apparition de la menstruation consistent exclusivement dans l'ensemble des circonstances propres à développer ses organes, à la bien nourrir et à lui donner les matériaux nécessaires pour former un sang riche, et dont les éléments constituants soient dans des proportions convenables. C'est donc une nourriture abondante, d'excellente qualité, composée en trèsgrande partie de substances animales de premier choix, de végétaux frais, de fécules vertes et de boissons salubres contenant peu d'alcool, qu'il faut surtout donner à cette enfant qui va bientôt devenir une femme. Seconder cette alimentation par l'exercice modéré au grand air et à la lumière, qui permette de mieux respirer et qui développe les muscles et les autres tissus; ne pas élever ces jeunes êtres dans une existence sédentaire et dans des lieux humides, froids ou encombrés; ne pas exciter outre mesure et aux dépens de leur constitution leurs sens et leur intelligence, etc.; voilà quelles sont les véritables précautions à prendre pour que la puberté s'établisse avec régularité et sans troubles dangereux.

Ne pensez pas que les médicaments, quels qu'ils soient, remplacent en rien ce régime et ces bons soins. Sans doute le fer, sous quelque forme qu'il soit administré, peut rendre au sang des matériaux qui lui sont indispensables; sans doute encore le phosphate de chaux, chez des sujets dont l'organisme est en retard, donne à ce même organisme des éléments matériels nécessaires pour le développement des os; mais ni le vin antiscorbutique, ni la rhue, ni le seigle ergoté, ni toutes ces drogues dangereuses adoptées par de sots préjugés n'ont d'efficacité réelle. Les eaux minérales, les bains de mer, n'ont même ici d'autres avantages

334

que de favoriser l'action des moyens de régime dont il vient d'être parlé. Les bains de pieds, les demi-bains chauds, les frictions sur la région des reins et du basventre, ont quelque utilité pour décider l'apparition de l'évacuation périodique; mais il est plus que douteux qu'ils exercent une action assez énergique pour la provoquer, alors qu'elle ne doit pas se manifester.

## 237 Pâles coulsurs, chloranémies (hydrémonévries des jeunes filles).

Les considérations qui précèdent sont entièrement applicables à l'ensemble des symptômes que l'on a appelés pâles couleurs. Dans de tels cas, le sang est séreux, et fréquemment se prononcent des accidents névropathiques, ce qui me fait donner très-justement à cette collection phénomenale le nom d'hydremonevrie : ici encore les médicaments échouent, et le régime réparateur précédent, aidé de l'emploi du fer et peut-être des préparations d'écorce de quinquina, réussit. Mais il faut bien se rappeler qu'un très-grand nombre de jeunes filles, supposées atteintes seulement de palcs couleurs, de chlorose ou chloranémie, sont frappées d'une affection bien autrement grave, et que les médecins qui ne savent pas se servir habilement du plessimétrisme ne peuvent reconnaître : je veux parler de tubercules crus ou phymies existant au sommet des poumons. Sans doute il est utile d'étudier le cœur et les vaisseaux du cou par l'auscultation, à l'effet de savoir s'il n'y existe pas un bruit de souffle doux et plus ou moins saccadé, ce qui, pour la plupart des praticiens, est un signe de l'état qu'ils désignent par le mot chloranémie; mais il l'est encore plus de percuter plessimétriquement le sommet des poumons pour constater s'il ne s'y rencontre pas une obscurité de son et un léger défaut d'élasticité, phénomènes qui, alors qu'ils ne se dissipent pas par les respirations profondes, sont les indices trop positifs d'induration pulmonaire. Quand de tels caractères se prononcent chez une personne hydrémonévrique, on ne trouve que trop la raison de la décoloration du sang et de l'extrême faiblesse du pouls.

C'est encore au médecin habite dans l'art de constater, par le plessimétrisme et le crayon, le volume réel de la rate, qu'il appartiendra de distinguer l'une de l'autre l'hydrémonévrie et la leucocythémie pour désigner la présence de globules blancs dans le sang. Ce dernier état pathologique est le plus souvent en rapport avec une splénopathie (maladie de la rate) accompagnée d'accroissement de volume. Dans ce cas, il arrive assez fréquemment que les stades des fièvres intermittentes : frissons, chaleur, sueurs, ainsi que la céphalalgie sus-orbitaire (pentanévralgie frontale), sont mal dessinés; alors on méconnaîtrait le mal si l'on ne constatait pas l'augmentation survenue dans les dimensions de la rate. Il est ici d'une grande importance pratique de distinguer un tel cas de l'hydrémonévrie, car, dans celle-ci, le traitement par un régime réparateur est le principal moyen de curation (page 334), tandis que, s'il s'agit d'une splénomégalie (grosse rate) avec leucocythémie, c'est à la quinine solubilisée ou à l'ex336 PALES COULEURS; HYDRÉMONÉVRIE, TRAITEMENT trait quinoïde qu'il convient d'avoir recours. (p. 277).

Des considérations du même genre, sous le rapport de la diagnose de l'état dit chlorotique, sont également applicables à toute autre lésion organique qui a pour conséquence l'hypémie ou l'hydrémie. En effet, qu'il s'agisse de modifications dans la nutrition ou dans la configuration du cœur ou de ses orifices génant la circulation, et, par suite, mettant obstacle à l'hématose (hémogénisme); que des cancers de l'utérus ou de tout autre organe; que des fissures à l'anus ou des hémorrhoïdes fassent journellement perdre assez de sang pour donner lieu à l'hypémie (page 183); que des ulcérations de l'intestin causent une diarrhée ou entérorrhée continuelle qui entraîne une diminution dans les globules du sang; qu'une néphropathie donne lieu à la déperdition de l'albumine ou du sucre par les voies urinaires, d'où résulte une diminution dans les principes constituants du liquide sanguin, etc., etc., il arrivera toujours que l'ensemble des caractères de l'hypémie ou de l'hydrémie se prononcera; qu'on pourra confondre de tels faits avec la chlorose des auteurs; que la malade se trouvera fort mal d'une telle méprise, et qu'une grande habileté dans le diagnostic anatomique est le seul moyen d'éviter des erreurs déplorables.

238. Truitement des pàles couleurs ou hydrémonévries.

Quelle que soit ma confiance dans l'utilité des préparations ferrugineuses si largement annoncées à la



PALES COULERS: EMPERIMENTALE, SEASONET 22 quatrième page des journaux, il est, pour mon, men. plus positif encore qu'un régime reparatient énantaine de viandes d'excellente qualité, maires, pou cuttes, et de végétaux frais : que l'insolution et le seguir dans une atmosphère pure et saintée : que l'exercice, le resvail corporel et modéré, et le gymnastique aien entendue; que les voyages, la distraction. Casoitation dans les montagnes et sur les barés de la mer, unit les urconstances les plus milles pour remedier à l'invirentenévrie ou pales condeurs. Absudez, sé paris el vantez, a cette excellente médication levziendene : du der réduit, des pilules martiales on du vin engentle, de l'élisse au citrolactate de fer du docteur Terries. De Jean Jerries. des eaux de Forges, de Passy, de Caartille, 1, ste., et même du vin de quinquas : men de maeux ; man A faut toujours se rappeder que des médicaments, administrés seuls, ne réussiraient pas, et que les suevens hygiéniques dont je viens de traces le tableau serent. dans presque tous les cas de chironne niquie, d'une immense utilité.

Quand l'usage de la précédente médication, condumé pendant un temps assez long, ne produit pas les exectlents effets que l'on est en droit d'en attendre, il y a

<sup>(</sup>i) Il existe à Chaville, près de l'étang ét de la muiosu du garde abandonnée une source abondante d'use eau Serrogiususe que j'ui souvent prescrite avec avantage. Seulement cette localeté out tous-mu-récageuse, il ne faut pas la frequenter le sour; et pour avons adoptique cette précaution, j'y ai contracté une spiémopathie grave et une flouve intermittente promptement combattue avec unous par l'extent de touberis.

#### 388 MENSTRUATION INSUFFISANTE ET IRRÉGULIÈRE

tout lieu de craindre qu'il n'existe dans quelque organe, et surtout dans les poumons, des lésions organiques profondes qu'entretiennent le mal. Alors, loin que la malade soit atteinte d'hydrémonévrie primitive, il s'agit presque toujours d'une altération du sang consécutive à des tubercules ou à toute autre affection profonde de l'organisme.

# 239. Irrégularité dans l'évacuation menstruelle. Retard dans cette évacuation.

Les principes qui viennent d'être exposés, relativement aux adolescentes et aux chlorotiques, sont, en très-grande partie, applicables aux troubles de menstruation qui consistent dans le retard ou dans l'insutfisance des règles. En général, on ne tient pas assez de compte, lorsqu'il s'agit de l'absence ou d'une diminution de l'utérhémisme, des proportions de sang des femmes.

Avant de s'enquérir des circonstances matérielles qui font que les hémorrhagies ovarique et utérine ne se manifestent pas à l'époque ordinaire, on a recours empiriquement à tous les médicaments dits emménagogues. De toutes ces circonstances organiques, la plus fréquente est, à coup sûr, une diminution dans les proportions du sang en circulation (hypémie). C'est ce qui a lieu : à la suite de pertes abondantes; lorsqu'une entérorrhée persistante a exténué la malade; quand elle a été astreinte pendant longtemps à une nourriture insuffisante, ou encore lorsqu'une lésion profonde

HYPÉMIE; TROUBLES DE MENSTRUATION CONSÉCUTIFS 339 a mis obstacle à l'hématogénisme (hématose). Tant que les proportions du sang ne seront pas assez considérables pour réparer les pertes et pour entretenir la nutrition, vous prodiguerez inutilement la rhue, la sabine, l'aloès, etc.; peut-être alors agirez-vous sur l'utérus, y déterminerez-vous des névropathies et même un travail congestif incomplet; mais l'écoulement sanguin périodique n'aura pas lieu. Il reparaitra tout aussitôt qu'un certain degré de pléthore (panhypérêmie) viendra à se déclarer. Il en arrivera ainsi, même lorsqu'existeront des altérations profondes dans des organes importants à la vie, et que le médecin sera parvenu, malgré la présence de ces lésions, à rendre à la circulation, par un bon régime, les liquides dont la diminution avait été la cause réelle du défaut d'évacuation menstruelle. Que de fois n'ai-je pas vu de jeunes filles atteintes de tubercules pulmonaires, et, n'ayant pas eu leurs règles depuis six mois, être ramenées, par l'emploi de l'iode, de l'hyperpnéisme et d'une alimentation abondante, à un meilleur état de santé, et n'ai-je pas ainsi rétabli l'évacuation de chaque mois! Celle-ci disparaissait de nouveau tout aussitôt qu'un peu de diarrhée ou des sueurs abondantes ramenaient l'hypémie. Il résulte de ces réflexions et de ces faits que, pour un grand nombre de femmes, c'est une alimentation réparatrice et un régime semblable à celui qui a été indiqué pour le traitement de la chlorose (page 336) qui rétablissent, chez les femmes faibles et pales, l'écoulement menstruel.

#### MESURE PLESSIMÉTRIQUE DE L'UTÉRUS.

340

240. Avant de chercher à ramener les règles, il faut s'assurer qu'il n'existe pas de grossesse ou de lésions organiques qui empêchent leur retour.

Pour que l'alimentation et le régime puissent réussir à ramener le flux menstruel (uterrhémisme), il faut qu'il n'existe pas quelque état anatomique de l'utérus ou des ovaires qui s'oppose à sa réapparition. De ce nombre sont : le défaut de développement de ces organes et de leurs vaisseaux; la présence du produit de la conception; l'hypotrophie utérine, qui a lieu alors que la femme est parvenue à l'âge dit critique; des lésions profondes du corps et du col de la matrice, tels que des corps fibreux, des carcinômes, etc. Avant de chercher à rétablir l'évacuation périodique, on doit donc constater, avec le plus grand soin, l'état des organes qui doivent en être le siège; il faut surtout, lorsqu'il s'agit d'une jeune fille chez laquelle les règles éprouvent un retard prolongé, songer à la possibilité d'une grossesse, et n'insister sur des médicaments dits emménagogues qu'après s'être bien assuré qu'il n'y a pas d'embryutérisme.

211. Mesure plessimétrique de la matrice examinée en arrière.

Il y a peu de temps, le plessimétrisme m'a permis de constater en arrière, dans la région du sacrum, et de dessiner sur la peau qui la recouvre, le volume exact et la forme de la matrice (1).

(1) Cette investigation se fait avec une extrême facilité, n'exige qu'un peu d'habitude, et est en diagnostic d'une extrême importance.

MESURE PLESSIMÉTRIQUE DE L'UTÉRUS EN ARRIÈRE 341 Aînsi examiné et dessiné, cet organe présente, sur une femme saine, adulte, bien conformée, 4 centimètres et demi au plus dans ses deux diamètres. Dans l'état de grossesse et suivant l'époque de celle-ci, les dimensions de ces diamètres s'élèvent à 5, 6, 7, 8 centimètres et plus. On conçoit toute l'importance diagnostique de ces faits, dont l'exposition fera le sujet d'un prochain mémoire. Elle est telle que le médecin, qui sait les constater, reconnait, par le plessimétrisme, l'augmentation de volume de la matrice, et partant, la grossesse dès les premiers temps de son existence. Ce moyen est d'une extrême utilité pour faire découvrir, même à l'insu des femmes, ou sans qu'il ait été utile de pratiquer le toucher, un embryutérisme (grossesse) datant de six semaines ou deux mois. Cette étude peut se faire sans que le médecin paraisse supposer l'existence de l'état organique qu'il a des raisons de croire possible. Ce procédé d'investigation présente aussi beaucoup d'avantages dans les cas d'hémorrhagies internes, de tumeurs utérines, lorsqu'il s'agit de déterminer si une douleur a pour siége la matrice, etc., etc.

#### 242. Moyens extérieurs de ramener les règles,

Il est un certain nombre de pratiques généralement employées pour rétablir l'évacuation périodique et sur lesquelles il faut peu compter. On en peut dire ainsi des lavements et des bains de siége pris à une température

(Voir la Gazette des Hópitaux, année 1863, ainsi que le Traité de plessimétrisme,.)

## 342 ÉPOQUES DE LA MENSTRUATION; INDISPOSITIONS

élevée. Bien rarement ces moyens ont de l'utilité. Il m'a semblé, dans quelques cas, que l'emploi combiné: 1° d'une position du corps telle que le bassin soit situé plus bas que le tronc et les membres; 2° de lavements et d'injections avec l'eau chaude; 3° de frictions sur le bas-ventre et sur la partie interne des cuisses; 4° de promenades fréquentes dans une voiture un peu rude; 5° de ventouses sèches appliquées sur la région périnéale, ont eu quelque efficacité pour rétablir l'uterrhémisme.

Ces moyens peuvent surtout réussir quand on les met en pratique tous les vingt-huit jours, c'est-à-dire aux époques où les règles ont ordinairement lieu; mais, quoi qu'il en soit, ces médications ne doivent jamais être tentées qu'après s'être bien assuré qu'il ne s'agit pas d'un retard causé par la gestation.

# 243. Indispositions fréquentes des femmes avant et après l'évacuation menstruelle.

Ce serait bien mal connaître la constitution et la santé générale de la femme, en un mot être pour elle un bien détestable médecin, que de ne pas savoir qu'à l'époque voisine des périodes menstruelles, et que, dans les jours qui suivent immédiatement ces périodes, il se manifeste une foule d'indispositions qui sont les conséquences soit des modifications organiques qui se produisent alors dans les ovaires et l'utérus, soit des troubles névriques qui résultent de ces modifications.

Parmi ces troubles, il faut noter : 1º les douleurs qui

ques; tout au plus l'éther sous forme de perles ou de gouttes administrées en potion ou sur du sucre, endort pour quelques instants les états névropathiques dont il s'agit; mais ce qui réussit le mieux, ce sont les bains, les applications émollientes, quelquefois les distractions et l'ensemble des moyens hygiéniques propres à améliorer la manière dont la menstruation s'ac-

INDISPOSITIONS AUX ÉPOQUES MENSTRUELLES

244. Règles trop abondantes. — Pertes utérines (uterrhémies): moyens de les modèrer ou de les arrèter.

complit.

Certains médicaments, tels que le perchlorure de fer, le sang-dragon et l'alun (pilules d'Helvétius) modèrent souvent les pertes utérines. Le seigle ergoté, en faisant contracter l'utérus, les arrête parfois d'une manière très-prompte; mais ces médicaments, et particulièrement l'ergotine, ont de grands inconvénients. On ne doit y avoir recours qu'après avoir bien déterminé quelles sont les lésions qui donnent lieu à l'écoulement

### PERTES UTÉRINES, UTERRHÉMIES

311

du sang. Là, comme ailleurs, c'est toujours la connaissance exacte de l'état anatomique, cause d'un phénomène qui conduit à diriger le traitement exigé par celui-ci.

Une dame de cinquante-cinq ans éprouvait continuellement, depuis trois ans, une perte journalière de sang qui la rendait presque anémique. On avait essayé, à l'intérieur et à l'extérieur, d'un très-grand nombre de médicaments dits hémostatiques; le toucher avait été pratiqué, et l'on n'avait rien reconnu d'anormal. Il y a lieu de croire que l'on ne s'était pas servi du spéculum, car tout aussitôt que je l'eus introduit, je reconnus l'existence d'un polype gros comme un pois, reposant sur un tissu très-sain. Ce polype laissait abondamment couler le liquide sanglant qui était rendu chaque jour, et il me suffit de toucher trois fois avec l'azotate d'argent cette petite production anormale pour faire cesser la perte et pour rendre cette dame, que, plus de cinq ans après, j'ai revue bien portante, à la plus parfaite santé.

Dans un grand nombre d'autres cas où existaient des hémorrhagies utérines et d'ancienne date, il s'agissait seulement d'ulcérations légères et granuleuses du col de l'utérus. Il en suintait du sang avec abondance; l'écoulement sanguin cessait lorsque je remédiais au mal par de légères cautérisations et par l'emploi d'injections avec le sulfate de zinc étendu de 50 à 100 parties d'eau.

Ailleurs encore, les causes de ces uterrhémies sont

incurables, et l'on ne peut que les pallier; telles sont celles qui résultent de la présence dans la matrice de polypes, de productions cancéreuses ou de corps fibreux développés sur la surface interne de l'organe. Or, dans ces cas, lorsque l'on ne peut utilement employer des moyens chirurgicaux, les médicaments dits hémostatiques, àdministrés à l'intérieur, arrêtent tout au plus momentanément la perte de sang et peuvent quelques altérer la santé des malades.

Dans ces derniers cas, et dans un grand nombre d'autres, les moyens hygiéniques les plus simples sont en général les plus utiles. Ces moyens sont surtout les suivants: 1º le repos au lit, et dans une telle position, que le bassin soit placé, au moyen de coussins, sur un plan élevé de 8 à 10 centimètres au-dessus de la hauteur du tronc et des membres; 2º des ablutions et des douches froides (quelquefois même à 0 de température) sur le bas-ventre et sur la région du coccyx; 3º des lavements avec l'eau fraiche; 4º des soins de propreté minutieux; 50 l'exposition du bas-ventre à un courant d'air froid; 60 des injections avec la dissolution d'un centième ou même d'un cinquantième de sulfate de zinc dans cent parties d'eau; 7° sur beaucoup de femmes robustes et qui ont encore beaucoup de sang en circulation, un régime sévère et, au besoin, l'abstinence complète; 8° quand le repos au lit et la position élevée du bassin ne calment pas l'uterrhémie, quelquefois l'exescice musculaire, alternant avec le repos, agossant probablement parce qu'il fait porter le sang vers les mus346 HÉMORRHAGIES UTÉRINES; TAMPONNEMENT cles, a arrêté des uterrhagies qui avaient résisté à beaucoup d'autres moyens.

Que, si la perte de sang rendu par une femme devient inquiétante, il ne faut pas que le médecin hésite à avoir recours au tamponnement du vagin, et, quel que soit le procédé employé pour l'exécuter, il suffira, s'il est assez exactement pratiqué, pour que le liquide sanguin ne s'écoule plus au dehors,

245, Tamponnement du vagin et compression du veutre pratiqués après l'accouchement.

Ces considérations générales sont tout aussi applicables aux cas de pertes après l'accouchement que pendant la grossesse; mais dans les premiers de ces cas le tamponnement vaginal ne peut, dit-on, réussir parce que la matrice se dilate au-dessus du tampon par le liquide qui s'écoule sans cesse. Or, j'emploie un moyen bien simple pour éviter cette dilatation : c'est de pratiquer une forte compression du côté du basventre à l'aide de plusieurs serviettes molles pliées en huit ou en seize et soutenues par un bandage de corps. Ce tamponnement extérieur, combiné avec celui des parties, arrête presque à coup sûr l'hémorrhagie, surtout si, en même temps, on place des ligatures au-dessus des mollets et des coudes, à l'effet de retenir le sang dans les membres, et si, pour que ce sang se porte plutôt vers le cerveau que vers l'endroit où le liquide s'écoule, on tient abaissée la tête de la malade.



## ÉLYTHRORHÉES; FLUEURS BLANCHES

246. Écoulements muqueux et pyoides; flueurs blanches élytrorrhées pyoidiques.

Les écoulements blanchâtres, muqueux et parfois puriformes des femmes, les flueurs blanches sont, comme les pertes de sang, les résultats d'états pathologiques très-nombreux et très-variables. Le plus grand nombre de ces écoulements sont les résultats d'excorlations du col utérin. Celles-ci, lorsqu'elles sont anciennes et un peu étendues, réclament la cautérisation avec l'azotate d'argent ou d'autres traitements sur lesquels il n'entre pas dans le plan de ce livre d'insister. Je veux seulement établir ici quelques vues générales sur les moyens simples qui, lors des écoulements de nature grave, n'ont point de danger, et qui, dans les cas légers, ont une très grande utilité. Ces moyens sont les suivants:

- 1º Une extrême propreté et des lotions avec l'eau fraiche réitérées plusieurs fois par jour;
- 2º Éviter toutes les circonstances propres à exciter les organes qui sont le siège du mal;
- 3° Des injections abondantes avec l'eau froide; mais il faut avoir soin de les pratiquer lentement et avec douceur; car, si on les poussait avec énergie, il serait possible, comme on en a vu des exemples, qu'elles traversassent la cavité de l'utérus, les trompes, et que le liquide injecté parvint dans la cavité du ventre et y causat une péritonite partielle.
  - 40 Immédiatement après ce lavage de la membrane

## 348 ÉCOULEMENT CONTAGIEUX (10SÉLYTHRITES)

interne du vagin et du col utérin, on injectera avec les mêmes précautions trois ou quatre cuillerées de la dissolution d'un gramme de sulfate de zinc dans 100 grammes ou même dans 50 grammes d'eau. Pour que ce médicament agisse (et bien administré, il a une très-grande efficacité), il faut que le liquide dont il s'agit séjourne un certain temps dans la cavité où on l'a porté et, pour que cela soit, la malade doit être placée de telle façon, qu'étant couchée, l'ouverture extérieure du vagin soit située plus haut que les parties profondes. Il suffit souvent de quelques jours pour obtenir par ce procédé la disparition, ou, au moins, la diminution considérable de ces flueurs blanches qui font le tourment des femmes et qui altèrent considérablement leur santé.

On ne saurait croire combien les précautions précèdentes relatives au lavage employé préalablement à l'injection médicamenteuse et au séjour de celle-ci dans les parties sont importantes; elles le sont à tel point que, faute de les mettre en pratique, la plupart des substances les plus actives introduites dans le vagin réussissent fort mal à guérir l'écoulement.

5. Un régime réparateur, de l'exercice au grand air et à la lumière, contribuent puissamment à faire cesser es écoulements muqueux des femmes.

### 247. Écoulements contagieux (iosélythrites).

Les conseils précédents sont appliquables même aux cas dans lesquels les liquides puriformes qui s'écoulent

sont de nature contagieuse. Examen attentif des organes profonds, à l'effet de savoir s'il n'existe pas d'ulcérations que le médecin doit tout d'abord cautériser; soins de propreté réitérés; injections mucilagineuses et bains prolongés si le mal est très-inflammatoire; usage de bains locaux avec l'utérotherme ou métrotherme (1); aussitôt que la rougeur et la douleur se calment et même lorsqu'elles existent encore, injections avec l'eau froide d'abord, puis avec la dissolution de sulfate de zinc, etc.; tels sont les moyens simples de diagnose et de traitement qui, continués, réussissent ici le mieux.

Bien entendu que, pour la patiente comme pour autrui, elle doit éviter toutes les excitations des parties malades.

#### 248. Cancers de la matrice (utéro-carcinies).

La plupart des médecins, pour calmer les affreuses douleurs qui accompagnent les cancers incurables de l'utérus, prodiguent la morelle, la belladone, l'opium, la morphine, la codéine, etc., et je suis malheureusement, dans bien des cas, forcé d'avoir moi-même recours à ces moyens, qui ont au moins l'avantage de calmer un instant les malades et d'agir sur leur imagination. Cependant, ce qui m'a réussi le mieux pour

<sup>(1)</sup> Cet instrument, proposé par l'un de mes élèves (M. le docteur Colon), permet de donner un bain continu au col de la matrice; il est en général très-utile. On le trouve chez Charrière, rue de l'École-de-Médecine, n° 6.

350 endormir les douleurs, ce sont les petits vésicatoires de 2 centimètres de large, et pansés avec 2 à 3 centigrammes d'hydrochlorate de morphine; on les applique au pli de l'aine ou à la partie supérieure et interne des cuisses.

Mais ce qui calme bien mieux encore, ce sont les moyens tout à fait hygiéniques que voici :

- 1º Les injections aqueums faites abondamment et doucement, destinées à laver la cavité du corps de l'utérus des caillots et des liquides qu'elle contient; il est pour moi non douteux, en effet, que les douleurs utérines sont les conséquences des contractions qu'exercent les fibres musculaires de l'utérus sur les corps qu'il contient et sur les productions anormales qui s'y développent. Cette réflexion explique pourquoi, dans les rétrécissements du col de la matrice, les souffrances sont si vives alors que l'obstacle, produit par la sténosie cancéreuse, s'oppose à la sortie des liquides et des caillots renfermés dans l'utérus;
  - 2º Les bains prolongés;
- 3º Les frictions sur le bas-ventre avec la main imbibée d'huile;
- 4º Les lavements qui, vidant le rectum, évitent les douloureuses pressions que les matières indurées exerceraient sur la matrice.

248 bis. Moyens rationnels de remédier aux douleurs utérines dues à des cancers utérins,

Les douleurs utérines, lors du cancer de la matrice, '

CAUSES DES DOULEURS DANS L'UTÉRO-CARCINIE 354 ne sont pas dues toujours et à beaucoup près à des névralgies. Bien souvent ce sont les contractions des fibres charnues qui causent les souffrances. Ces contractions sont de même nature que celles qui ont pour but l'expulsion du fœtus ou des caillots formés lors de l'hémorrhagie menstruelle. Elles se renouvellent alors que du sang, une tumeur carcinique, etc., sont contenus dans la cavité utérine, et que le col rétréci par suite de la dégénérescence squirrheuse, s'oppose à la sortie des corps que la matrice renferme. On prodigue avec très-peu d'avantages dans de tels cas; la morelle, la belladone, le laudanum; mais les moyens de remédier, au moins momentanément, à de telles souffrances ne sont guère des narcotiques; ils consistent à dilater, s'il est possible, le col utérin (que, pour se servir d'un seul mot, on pourrait appeler stomutère); à employer des injections dans la matrice, propres à faire évacuer les liquides qu'elle contenait, à exciser, cautériser même les productions anormales qui provoquent les contractions utérines.

240. Soins à donner à la fomme enceinte ou en couches.

Pendant la grossesse, il arrive fréquemment que les pieds et les jambes s'ensient considérablement et que, chez d'autres femmes, des engourdissements, des douleurs vives se font sentir dans les cuisses, les jamhes et les pieds. Ces accidents sont le plus souvent des résultats de la compression exercée par la tumeur que forme la matrice distendue, sur les veines hypogastriques ou iliaques, et sur les plexus nerveux dits sacrés. Une position de corps, telle que cette compression soit momentanément évitée, est le principal moven de remédier à de tels symptômes. Dans un cas où une femme enceinte était atteinte d'une infiltration considérable des membres inférieurs, j'eus le bonheur de voir en vingt quatre heures, cette hydropisie se dissiper, alors que je venais de faire coucher cette femme alternativement sur les côtés et sur le ventre. Dans quelques autres cas analogues, si je n'ai pas complétement réussi, au moins ai-je arrêté les progrès du mal. Chez d'autres femmes enceintes, se plaignant de vives douleurs et de divers accidents névriques dans les membres inférieurs et dans le bassin, il est arrivé que les positions du corps dont il vient d'être parlé ont soulagé les souffrances de ces malades.

Quel praticien pourrait ignorer que les bains soulagent la femme enceinte; qu'une nourriture renfermant, sous un petit volume, beaucoup de principes réparateurs, puisse compenser les pertes journalières qui ont eu lieu dans la grossesse; qu'un exercice modéré est alors utile, et que ce sont là les principaux moyens de calmer la plupart des indispositions qui surviennent si fréquemment pendant la gestation?

Mais ce que beaucoup de médecins savent infiniment moins, c'est que du quatrième au neuvième mois, alors que les os de l'enfant s'emparent d'une grande partie du phosphate de chaux faisant partie de l'organisme de la mère, il est très-utile d'en administrer chaque jour quelques grammes à celle-ci, à l'effet qu'elle ne soit pas privée d'un sel calcaire si utile à la nutrition des parties solides de son corps.

250. Graisse demi-solide enduisant le col utérin et le vagin, favorisant le passage de la tête de l'enfant. Instrument proposé par M. le docteur E. H. Vernhes.

Qu'il me soit permis de faire ici une remarque relative à un procédé très-simple propre à faciliter le passage de la tête à travers le canal où elle est engagée. C'est l'introduction en couche très-épaisse et en proportion considérable de la mixture graisseusé dont j'ai déjà plusieurs fois parlé, et qui, favorisant beaucoup mieux que le mucilage ou l'huile le glissement du fœtus, a l'immense avantage de prévenir les déchirures du périnée. — J'ajouterai même que celles-ci ont rarement lieu alors que l'on ne se borne pas à soutenir cette partie, et que l'on a le soin, au moment de la sortie de la tête, de ramener ou de faire ramener, par une douce pression vers l'ouverture vulvaire, la peau des cuisses, de l'aine et même du siége.

M. le docteur Vernhes, un de mes meilleurs élèves, a proposé un spéculum perforé d'un grand nombre de trous destinés à laisser passer la graisse dont il est rempli. Il suffit d'introduire dans la cavité de cet instrument un corps solide pour que le mélange adipeux s'échappe par les ouvertures dont il s'agit, et enduise les parties dans tous les points de leur étendue.

251. Fièvres puerpèrales.

Sous le nom bizarre de sièvre puerpérale, les mêde-

cins ont réuni plusieurs affections qui, telles que des inflammations soit de l'utérus, soit des veines qui naissent de cet organe ou du péritoine, etc., se manifestent chez la femme qui vient d'accoucher. Quelle que soit la théorie que l'on se fasse de l'ensemble de ces états pathologiques, il est incontestable que la plupart d'entre eux ont pour causes principales:

- 1º La respiration d'un air altéré par les miasmes putrides formés lors de la réunion du nombre plus ou moins considérable d'accouchées dans un lieu trop étroit, ou lorsqu'une seule femme en couches habite dans un espace peu étendu et où l'aération ne se fait pas;
- 2° La présence et le séjour dans la cavité utérine de sang, de caillots qui s'y pourrissent et qui donnent lieu à une matière infecte qui empoisonne la surface qu'elle touche, pénètre dans des veines béantes et devient la source d'une septicémie trop souvent mortelle.

#### 252. Moyen de préservation contre la fièvre dite puerpérale.

Contre d'aussi terribles affections, une foule de médicaments et de médications variés ont été proposés, et l'expérience clinique a successivement anéanti les espérances que leur emploi avait fait naître tout d'abord.

Tout au contraire, la pratique est venue donner sa sanction aux propositions suivantes, qui sont exclusivement fondées sur des préceptes consacrés par le bon sens et par les faits :

4º La femme, dans les heures et dans les jours qui



FIÈVRES PUERPÉRALES; PRÉSERVATION 355 suivent la parturition, doit être placée dans un lieu spacieux où l'air se renouvelle; c'est une détestable chose que de l'enfermer dans une salle où d'autres accouchées se trouvent réunies, surtout alors que l'on n'a pas le soin de renouveler fréquemment l'air de ces salles en ouvrant les croisées soit le jour, soit la nuit. Les rideaux ne doivent même pas être tenus fermés autour du lit de la jeune mère. Si la pièce où elle couche est trop petite, il est infiniment moins dangereux de laisser pénétrer l'air froid extérieur que d'exposer la femme à la respiration d'une atmosphère infectée, tout aussi bien par une seule personne habitant un cabinet etroit que par une multitude de gens habitant des dortoirs peu spacieux.

2º Dans les deux heures qui suivent l'accouchement, dès que la putréfaction du sang et des caillots contenus dans la cavité utérine est à craindre, on aura recours à une injection abondante d'eau tiède, très-doucement portée dans les organes de la femme (page 347), et on la réitérera jusqu'au moment où toute odeur fétide et putride ne se manifestera plus. On renouvellera cette injection et ce lavage (la nuit comme le jour) toutes les trois heures, et toutes les fois même qu'en soulevant les draps, des exhalaisons méphitiques se feront sentir. On continuera ainsi pendant les quatre premiers jours qui suivront l'accouchement. La flèvre de lait ne devra pas empêcher d'y avoir recours.

3° Le corps de la femme doit être tenu dans un état d'extrême propreté.

# 356 FIÈVRES PUERPÉRALES; ABCÈS DES SEINS

Je suis autorisé, par des faits concluants, à conseiller, de la manière la plus formelle, l'emploi de cette méthode que, depuis longtemps, j'ai proposée. Pendant de nombreuses années où j'ai fait, comme médecin, le service à la Pitié et à la Charité, et bien que les prescriptions précédentes n'aient été souvent qu'incomplétement exécutées, à peine ai-je perdu quelques femmes atteintes de fièvres dites puerpérales. Il en est arrivé ainsi alors qu'aux mêmes époques la mortalité était telle à la Maternité, qu'à plusieurs reprises il fallut, pour remédier au mal, fermer cet hôpital et disséminer les accouchées.

## 253. Causes des abcès du sein chez les nouvelles accouchées.

On pense généralement que l'action du froid sur les seins, lors de la fièvre de lait, est la cause des abcès qui, à cette époque, se déclarent dans ces parties. Il est possible, en effet, que le refroidissement soit suivi de la coagulation du lait dans les conduits galactophores de la glande mammaire et du mamelon lui-même; mais ce n'est pas d'une manière directe que l'abaissement de température donne lieu à la formation de ces phlegmasies pyogéniques (inflammations formant du pus). Une cause bien plus fréquente produit chez les nouvelles accouchées les abcès du sein. C'est une stase survenant dans les vaisseaux excréteurs du lait par suite d'un obstacle survenu à sa sortie; comme conséquence de cette stase, le liquide dont il s'agit s'épaissit, se coagule et détermine ainsi le mal. En effet, il se passe ici des phénomènes analogues à ceux qui ont



## ABCÈS DES SEINS; MASTOPYCITES

lieu dans la parotidite (page 213), dans la didymite, etc., etc., et le caillot lacté, devenu corps étranger, enflamme le conduit excréteur, qui se distend du côté de la glande : la phlegmasie gagne le tissu conjonctif extérieur au vaisseau, et un abcès (pyoîte) se forme dans la glande mammaire. C'est ainsi que, lors de la phlébite, se déclarent, à la suite de la maladie de la veine, des collections purulentes dans le tissu cellulaire qui entoure le vaisseau. Les écorchures et les dermites du mamelon, les morsures qu'y fait le nourrisson. toutes les circonstances enfin qui génent ou empéchent l'éxcrètion du lait, sont les causes véritables des pyoïtes mammaires. Il est même possible qu'un grand nombre d'engorgements du sein à marche lente et susceptibles de dégénérescence cancéreuse reconnaissent une semblable origine.

#### 254. Moyen de préservation contre les abeès du sein.

D'après les considérations précédentes, il est évident que les meilleurs moyens de prévenir les abcès du sein chez les nourrices, ainsi que les accidents nombreux et si graves dont ces pyoïtes peuvent être suivies, est de favoriser la sortie du lait soit par la succion, soit par des pressions méthodiques, soit en humectant avec l'eau tiède les orifices des conduits galactophores, et surtout de soigner de la manière la plus attentive les piqures, les érosions, les contusions, les morsures et les inflammations dont le mamelon de la femme en couche ou de la nourrice peuvent être le siége. Certes.

358 ABCÈS DES SEINS; TRAITEMENT CHIRURGICAL
ces moyens hygiéniques sont bien autrement utiles,
dans des cas pareils, que tous les onguents et que tous
les médicaments préconisés, dans des cas semblables,
par l'empirisme et par de sots préjugés.

### 255. Traitement chirurgical des abces mammaires.

Les considérations précédentes m'ont conduit à un traitement très-rationnel et des plus utiles des abcès des mamelles. La pratique généralement suivie dans de tels cas est d'attendre, avant d'en faire l'ouverture. que la collection purulente soit très-étendue et qu'elle intéresse une grande partie de la glande. La mienne est fort différente de cette manière d'agir. Je cherche tout d'abord quels sont les points très-limités, mais parfois tres-nombreux, du sein où les adènes et les conduits galactaphores sont malades. La palpation et surtout le plessimétrisme (1) me permettent de les reconnaître et de les dessiner exactement; alors, et sans courir le risque qu'une accumulation de pus de plus en plus grande propage au loin la phlegmasie suppurative. je fais, avec la pointe d'un bistouri à lame mince et en détruisant le parallélisme entre l'ouverture cutanée et celle du petit abcès, une ponction qui permet au pus et au caillot lacté d'avoir une issue aussi complète que possible, puis je recouvre la petite plaie avec d'excellent diachylum. Un grand nombre de fois, à la Charité et à la crèche de la salle Saint-Bernard, de l'Hôtel-Dieu,

<sup>(1)</sup> Voyez le Traité de plessimétrisme.

j'ai été assez heureux pour obtenir de cette façon la guérison rapide du mal et préserver la jeune femme des suites parfois funestes de la lésion dont elle était atteinte.

255. Fait remarquable d'abcès du sein chez une petite fille àgée de six jours.

Par une étrange coïncidence, voici qu'au moment où, dans la cour de la Charité, je venais d'écrire ces remarques et où je sortais de mes salles, on me dit qu'une petite fille, née depuis cinq à six jours, était atteinte d'un abcès considérable au sein gauche, ce que je constatai tout d'abord. Pendant mon examen, M. Masse, externe très-soigneux, alors attaché à mon service, me fit observer qu'une sérosité assez abondante coulait de l'autre sein. L'explication du mode de formation de la pyoîte ressortait immédiatement des considérations qui viennent d'être établies. Heureux de trouver si à propos un fait à l'appui de ces idées (fait d'autant plus remarquable qu'il a été observé sur un enfant naissant, ce que je crois être assez rare), je lus aux élèves les pages qui leur firent admettre, comme à moi, que l'arrêt de la sérosité dans les conduits excréteurs avait été la cause matérielle de l'abcès mammaire.

 Abaissement, déviations de la matrice (hyputérotopie, dysutérotopie).

L'emploi d'un appareil auquel on a donné le nom de pessaire, entraîne une incommodité et une malpropreté

## 360 MATRICE ABAISSÉE; BANDAGE EXTÉRIEUR

telles, et présente tant d'inconvénients, qu'il est souvent plus pénible à supporter que le mal qu'il est appelé à combattre. Ce moyen est généralement mis en usage contre l'abaissement, les déviations et la chute de la matrice; loin de concourir à une guérison radicale de ces infirmités, ce corps étranger, quelle que soit sa composition (substances emplastiques, ivoire, caoutchouc vulcanisé et renfermant de l'air, etc.), quelle que puisse être sa forme (rond ou ovale, cylindrique ou en bilboquet, percé d'un trou central ou muni d'une tige allongée, etc.), ce corps étranger, dis-je, a toujours l'immense inconvénient de dilater encore le vagin déjà trop large, et dont les parois molles laissent en conséquence l'utérus s'abaisser et se porter même tout à fait en dehors.

Le pessaire, qui, momentanément, soulage la femme, mais qui la met, plus tard, dans la necessité de porter sans cesse cet instrument de prothèse, exige, si toutes les lois de l'hygiène ne sont pas méconnues, qu'un chirurgien habile renouvelle tous les huit jours l'application de cet incommode moyen de palliation.

Il est inutile de rappeler que toutes les injections dites astringentes ne réussissent pas à rendre aux parois du canal vaginal leur fermeté et leur étroitesse première; la ceinture dite hypogastrique, refoulant les viscères par en bas, augmente encore l'abaissement utérin.

Il est à croire que l'on ne trouverait guère de femmes disposées à supporter l'excision d'un lambeau longitu-



#### ABAISSEMENT DE L'UTÉRUS

361

dinal du vagin, alors même qu'il se trouverait un chirurgien qui se déciderait à proposer cette douloureuse et dangereuse opération!

257. Appareil extérieur, ou bandage utéro-périnéal, employé par moi avec succès contre l'abaissement de la matrice.

Il est un appareil des plus simples que j'ai depuis bien longtemps proposé et utilisé (1); cet appareil maintient convenablement l'utérus atteint d'abaissement ou même d'une chute complète. Il consiste dans une pelotte étroite et épaisse, appliquée sur le périnée; elle est destinée à soulever l'utérus avec la médiation du plancher périnéal. Cette pelotte est soutenue par une courroie qui, passant entre les cuisses, se fixe en avant et en arrière, au corset ou à une petite ceinture entourant le bassin. Plus on tend la courroie et plus la pelotte porte l'utérus en haut. Les avantages de ce moyen sont :

- 1. De maintenir suffisamment l'utérus;
- 2º De rapprocher les parois vaginales;
- 3º De n'empêcher en rien d'indispensables soins de propreté;
- 4° De ne point exiger les soins habituels d'un chirurgien;
- 5. De permettre d'ôter et d'enlever l'appareil, alors que la femme peut s'en passer, c'est-à-dire quand son corps repose dans la position horizontale;
  - (1) Trailé de médecine pratique, not 1668 et suivants.

6. De saire qu'elle le porte principalement quand elle doit se livrer à la marche, à la station verticale prolongée, à quelque essort;

7° D'élever l'utérus à des hauteurs variées, suivant le bien-être qui en résulte; car les courroies peuvent être plus ou moins serrées, et la pelotte peut présenter diverses dimensions en épaisseur;

- 8° D'éviter de devenir (comme il en arrive pour les pessaires) le foyer d'émanations fétides et repoussantes;
- 9° De ne pas exposer les femmes qui en font usage aux inflammations, aux écoulements, aux ulcérations, aux cancers, et certainement aux attaques d'hystérie, dont ces mêmes pessaires sont souvent la cause.

Ce qui vient d'être dit n'est pas de la théorie, mais de la pratique consacrée par les vingt années d'expérience passées depuis que j'ai proposé l'appareil utéropérinéal.

Faut-il citer un fait, parmi une multitude d'autres, à l'appui des propositions précédentes? L'épouse d'un secrétaire d'ambassade de l'une des républiques américaines éprouvait, depuis deux ans, des douleurs excessives dans les régions ovariques, douleurs que des chirurgiens justement estimés rapportaient à une ovarite, et qu'ils voulaient combattre par l'application de nombreuses sangsues et de vésicatoires multipliés. Cette jeune dame, étant fort peu disposée à supporter ce traitement, me consulta. Le toucher me fit tout d'abord penser que les douleurs et la gastralgie coexistante,



DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT ME L'ETÈRES, PLESSIMÉTRICE ME symptômes qui angmentaient infiniment d'inference alors que madame I... était descrit, pouvaient être dues à un absissement orosidérable de la matrice: bientôt j'eus la preuve matérielle que je ue me trompais pas : en soulevant, en effet, le col utérin avec le doiet, les accidents cessaient, et re; arainssiest avec une intensité extrême tout aussité: que j'abandonsis la matrice à son propre poids. Je sis porter l'aggareil méropérinéal à cette dame, et tout d'abord les sympthmes qui avaient conduit à prescrire les sangues et les vésicatoires disparurent; si bien que, depuis eing ans, la santé de madame X... est excellence. Cette dame. comme toutes celles auxquelles j'ai fait porter un landage du même genre, a souffert les premiers jours de la présence de celui-ci. C'est ce qui arrive aux hernieux alors qu'ils commencent à se servir d'un brayer: mais, en très-peu de jours, les femmes s'accoutament si bien à l'usage de l'appareil utero-périnéal, qu'elles s'apercoivent à peine de sa présence.

237 bis. Nécessité d'un examen préalable et attentif de la matrice, -

En terminant ce qui vient d'être dit sur quelques sifections utérines contre lesquelles de petits moyens peuvent avoir de l'utilité, rappelons-nous bien qu'avant d'en employer aucun, il faut absolument détermines quel est l'état organique de la matrice. C'est partieulièrement lorsqu'il peut y avoir des doutes sur la pensibilité de l'existence d'une grossesse initiale qu'il en est 364 DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DE L'UTÉRUS; PLESSIMÉTRISME ainsi, et à cette occasion, je recommande infiniment à mes confrères de s'exercer avec un soin extrême au plessimétrisme de l'utérus par la région sacrée, méthode qui leur permettra de reconnaître et de dessiner avec précision, dès le deuxième mois, l'augmentation de volume inséparable de la présence dans la matrice du produit de la conception (1).

(1) Voyez le Traité de plessimétrisme.



#### CHAPITRE XIV

## MALADIES DES MUSCLES (RHUMATISMES).

258. Rhumatismes; douleurs dites rhumatismales; névralgies.

La plupart des médecins, même des plus instruits, loin de rechercher la cause matérielle, la raison anatomique des douleurs, paraissent croire qu'il peut s'en déclarer sans qu'il existe quelque lésion, persistante ou momentanée, qui trouble la fonction de la partie où elles ont leur siège. Ils les désignent tout d'abord sous les noms de névralgies ou de rhumatismes. Ils attaquent alors directement ce qu'ils disent être l'élément douleur, par les narcotiques, tels que l'opium, la morphine soluble, le datura, le chloroforme, etc.

Malheureusement, la circonstance physique et moléculaire qui cause une souffrance plus ou moins vive, échappe souvent tout aussi bien à l'examen attentif des organes qu'aux recherches les mieux dirigées sur les troubles fonctionnels et sur l'histoire de la maladie. Alors on est réduit à faire de cette thérapeutique ba-

ale et empirique qui étend son domaine depuis la belladone jusqu'aux bains de vapeur ou aux eaux de Pougues; mais ce n'est pas là une raison pour que, dans une multitude d'autres cas, on ne puisse s'élever à la connaissance de l'altération matérielle qui cause et entretient la névralgie ou le rhumatisme supposé. C'est donc tout d'abord, alors qu'il s'agit de combattre les douleurs ainsi désignées, à une étude très-sérieuse de l'organisme qu'il faut se livrer, et si l'on n'agit pas ainsi, on court les risques de commettre, au trèsgrand détriment des malades, les erreurs les plus déplorables.

#### 256. Cas de cancer de la région lombaire pris pour une névralgie.

Un avoué de Poitiers se plaignait, depuis huit ou dix ans, d'éprouver d'atroces douleurs dans les reins. Sans avoir examiné la région où le mal se faisait sentir, on me demanda un mémoire-consultation. Je répondis qu'il fallait, avant tout, explorer soigneusement le malade. Il vint à Paris. Je mis à découvert le lieu douloureux. Quelle ne sut pas ma surprise de voir, au premier coup d'œil, une vaste tumeur dont le caractère cancéreux était évident! Depuis dix ans on traitait cette affection comme un rhumatisme. La source de la douleur n'était malheureusement plus douteuse, et si les ners intercostaux et lombo-abdominaux souffraient, c'était évidemment par suite de la terrible lésion qui existait. Le mal était devenu si étendu, que l'opération



douleurs dites rhumatismales; causes variées 367 que l'on fit bientôt après ne retarda en rien la mort du malade.

Il me serait facile de réunir un bien grand nombre de faits de ce genre, dans lesquels on cherchait depuis longtemps à guérir des névralgies ou de prétendus rhumatismes par la narcotisation, et qui cédèrent promptement à des médications fondées sur l'étude attentive de l'organisme et des causes matérielles qui entretenaient la souffrance. Tantôt il s'agissait d'une névralgie faciale qui, due à une maladie des dents, cédait brusquement à l'évulsion de celles-ci; tantôt d'un mal de tête au front (pentanévralgie frontale), compliquant ou remplaçant des accès fébriles, et qui, causée par une affection de la rate, se dissipait le lendemain du jour où j'avais administré une potion contenant en dissolution 1 gramme de sulfate acidifié de quinine, ou deux cuillerées d'extrait de berberis.

Dans un autre cas, c'était une sciatique (névrosciaticalgie) qui avait été combattue par des moyens héroïques, mais douloureux et inutiles, et que l'on avait appliqués sur le trajet des nerfs; le plessimétrisme démontra que le point de départ du mal était une tuméfaction de la région lombaire de la colonne vertébrale. La douleur céda bientôt à la curation de la maladie de l'os obtenue par le phosphate de chaux et le repos (4).

<sup>(4)</sup> l'avais encore sous les yeux. en 1863 et 1864, et lorsque dans la première édition de la médecine du bon sens. l'écrives sus ligues, deux cas semblables qui, cette année 1863, ont fourni es partie la tagiq de ma première leçon de clinique pour la Faculte à l'idipital de la

## 368 DOULEURS RHUMATISMALES; TRAITEMENT

Des névralgies thoraciques sont parsois encore les résultats d'un tiraillement des ners intercostaux causé par une mauvaise position de la tête. Dans cette attitude, le cou et le dos sont courbés de manière à produire une distension des ners, des muscles et des ligaments de la région dorsale. Or, on remédie à la douleur et on en prévient le retour, en faisant que le malade se tienne dans une meilleure attitude et en aidant à l'action musculaire par un appareil de corsets et de bretelles dont j'ai déjà parlé et qui sera mentionné plus tard, etc., etc.

260. C'est la cace organique des douleurs qu'il faut combattre pour les guérir.

C'est donc à la cause matérielle des névralgies qu'il faut, autant que possible, remonter, alors qu'il s'agit de guérir ces douleurs.

Le véritable médecin thérapeutiste sera donc celui qui, anatomiste et physiologiste, en même temps que praticien habile et expérimenté, saura, par cela même, indiquer un traitement rationnel de ces affections.

Quand, par malheur, la raison organique d'une souffrance est inconnue, alors on est dans la nécessité d'attaquer directement la douleur par des médications et surtout par des narcotiques; mais avant d'employer ceux-ci, il faut se rappeler que les bains tièdes et très-

Charité. Depuis lors, j'ai vu un assez grand nombre d'autres faits du même genre.

prolonges, que les applications émollientes, que les emplâtres qui protégent la partie endolorie et la maintiennent dans une humidité salutaire, que le repos et surtout l'éloignement des circonstances que l'expérience a appris ramener ou exaspérer les douleurs, sont d'une incontestable efficacité, tandis que la belladone, la jusquiame, l'opium, les pilules de Méglin, le chloroforme parviennent bien quelquefois à endormir le mal, mais ne le guérissent presque jamais.

Voyez comment, à la suite d'une saignée malheureuse dans laquelle un filet nerveux a été incomplétement divisé, se déclarent, sur ce filet blessé, des névralgies cruelles, que les narcotiques parviennent difficilement à calmer! Voyez surtout à quel point ils sont impuissants à les guérir! C'est qu'ici il y a une lésion matérielle évidente qui les a causées. Ainsi en est-il dans la plupart des névralgies; mais souvent la raison anatomique de la souffrance qui les constitue ne peut être reconnue, et, encore une fois, on est malheureusement alors réduit à combattre le symptôme douleur quand il faudrait remédier à la lésion névrique qui lui donne lieu. Ainsi en est-il des souffrances aiguës consécutives au zona, et de la dangereuse névralgie dite angine de poitrine.

261. Céphalalgies symptomatiques de splénopathies dissipées lorsque l'on remédie à la lésion de la rate.

Il en était encore ainsi de beaucoup de céphalalgies sus-orbitaires, qui ne sont que des névralgies de la cin-

## 370 NÉVRALGIES DE CAUSE SPLÉNIQUE

quième paire (pentanévralgie); mais ici le plessimétrisme a fait voir que la rate était souvent le point de départ du mal, et qu'en guérissant la splénopathie par l'emploi, à hautes doses, de la quinine dissoute ou de l'extrait quinoïde, on fait disparaître le mal de tête. Déterminez la cause matérielle d'une névralgie; si vous pouvez la détruire, la douleur cessera d'avoir lieu; si vous ne connaissez pas cette cause matérielle, la souffrance, momentanément amoindrie par vos empiriques médications, résistera d'une [manière indéfinie. Si la circonstance anatomique qui détermine la douleur, bien que connue, est incurable ou, du moins, résiste aux moyens de traitement employés, la douleur sera peut-être calmée pour un temps, mais elle reparaîtra plus tard avec une opiniâtreté désespérante.

#### 262. Névralgies variées se développant à l'époque menstruelle.

On explique, par les faits et par les réflexions précédentes, comment il se fait que les névralgies, si fréquentes chez la femme et dont les ovaires, l'utérus et leurs dépendances (angiove) sont les points de départ, se modifient avantageusement dans les jours qui suivent la menstruation, et par quelles raisons, elles reparaissent avec une persistance extrême, alors que la congestion ovarique et l'hémorrhagisme utérin se déclarent de nouveau. 265. Névralgies intercostales dans la pleurite.

Si vous voulez encore combattre un point de côté pleurétique, recherchez d'abord si la plèvre est enflammée ou s'il existe un épanchement qui donne lieu à la névralgie intercostale; remédiez à ces affections qui causent la souffrance observée, alors celle-ci disparaîtra.

264. Douleurs dites rhumatismales; lombago, myosalgies.

Pour peu que l'on éprouve des douleurs dans la région des reins (ce que l'on dit être un lombago), soit dans les membres, surtout alors qu'elles reparaissent et se dissipent en peu de temps, on appelle cela un rhumatisme; on prescrit toutes sortes de médicaments empiriques, des vésicatoires, des révulsifs douloureux, des bains de vapeur russes ou autres. On recommande encore des eaux minérales, chaudes, sulfureuses, des médicaments spéciaux ou même de ces recettes qui salissent la quatrième page des journaux politiques.

Ce n'est pas là faire de la médecine : c'est traîter en aveugle des douleurs dont on méconnaît les causes; c'est supposer un être purement imaginaire dit rhumatisme, et combattre cette chimère sans tenir le moindre compte des progrès scientifiques des modernes.

Il y a tout lieu de croire que, dans cinquante ans, les médecins instruits auront oublié le mot rhumatisme, et que s'ils s'avisent de le prononcer, ils ne pourront pas se regarder sans rire ou sans déplorer ce qu'il a fait à la médecine.

# 372 RHUMATISME : ÉTRE HYPOTHÉTIQUE

265. Étude profonde que j'ai faite du rhumatisme depuis 1830.

Il est peu de sujets que j'aie plus étudiés que les accidents réunis, par les médecins et par le public, sous le nom de rhumatisme. J'ai analysé, avec le plus grand soin, dans quelques miliers de faits, les états maladifs ainsi désignés : j'ai recherché quels étaient les tissus malades, la manière dont le mal s'était déclaré. les circonstances qui avaient accompagné l'invasion, la marche, la succession des symptômes; et, dans aucun cas, je n'ai pu trouver de faits qui pussent me conduire à constater l'existence d'un être dit rhumatisme, d'une constitution, d'un tempérament, d'une diathèse rhumatismale, etc. Cependant, ces choses sont admises facilement par des esprits prévenus ou par des personnes qui interrogent mal, qui ne vont pas au fond des choses, qui n'appellent pas l'anatomie, la physiologie ou l'organographisme à leur aide, et qui, pour s'éviter la peine de faire des recherches minutieuses, groupent au hasard, sous le nom de rhumatisme, des phénomènes très-différents les uns des autres et exigeant souvent des traitements opposés.

Les prétendus rhumatismes appartiennent presque toujours à quelques-unes des lésions suivantes :

## 266. Lésions désignées sous le nom de rhumatismes.

1º A des névralgies analogues à celles dont il vient d'être parlé; 2º à des douleurs de muscle (myosalgies; 3º à des souffrances des os eux-mêmes ou de leur mem-

bouleurs dites rhumatismes; nombreuses causes 373 brane d'enveloppe; 4° à des lésions de ligaments; 5° à des maladies aigués des jointures, accompagnées d'un état particulier du sang (sang couenneux, plasthydrémie, hémite); 6° à des arthropathies chroniques de diverses sortes; 7° à des maladies variées du cerveau et surtout de la moelle vertébrale; 8° à des souffrances viscérales donnant lieu à des douleurs névriques, etc.

267. Le froid humide est loin d'être toujours la cause des lésions dites rhumatismales.

Que l'on ne pense pas que l'action du froid et de l'humidité soit, en général, la cause réelle de ces prétendues affections rhumatismales. C'est la manière dont certaines personnes interrogent qui leur a fait croire qu'il en est ainsi. Presque toujours ont existé, chez les malades atteints de ces affections, des circonstances plus actives qui ont déterminé le mal; exemples : la fatigue et les marches forcées, la station continue, pour les douleurs rhumatismales des vieux soldats; les travaux excessifs de divers ouvriers, pour les rhumatismes des membres; les ruptures de muscles, dans les cas de lombago; les pertes séminales, les excès vénériens ou les calculs dans les reins, ou encore des maladies utérines, pour les souffrances lombaires; des affections syphiosiques pour des douleurs nocturnes; de profondes altérations dans divers organes, etc. Les ravages causés dans les muscles par les trichines ont peut-être été souvent rapportés en rhumatismes.

# 374 RHUMATISMES; NÉCESSITÉ D'UN DIAGNOSTIC EXACT La science fera voir tôt ou tard que toute souffrance à lamelle on a donné ce nom tient à une lésion d'organe.

la science fera voir tot ou tart que tome souffrance à laquelle on a donné ce nom tient à une lésion d'organes plus ou moins appréciable.

## 268. Le froid humide cause beaucoup d'affections non rhumatismales.

Le froid humide et surtout l'action du froid quand le corps est en sueur, donnent lieu à une foule de lésions dans lesquelles le sérum du sang est couenneux; c'est-à-dire tient de la fibrine en suspension, telles sont la pneumonite, la pleurite, la péricardite, etc. et personne ne voit dans de telles affections des maladies rhumatismales; pourquoi donc les inflammations articulaires, coexistant avec ce même état du sang, seraient-elles considérées comme le rhumatisme par excellence, comme le type de cette prétendue diathèse, alors que tant d'autres affections qui sont rapportées à celles-ci ne sont pas accompagnées de cette altération dite couenneuse du sang?

On a fini par tellement divaguer sur le rhumatisme, qu'on l'a presque identifié avec la cause froid humide, et que, ne pouvant dire ce qu'il est ni ce que l'on désigne ainsi, on a réuni sous ce nom la plupart des souffrances humaines.

Pour combattre utilement les douleurs dites si faussement rhumatismales, il faut s'élever, par un examen minutieux et par une interrogation attentive, à la connaissance de leur siège, des circonstances qui y ont donné lieu, des agents qui ont pu les produire, etc.; c'est dire que leur étude, au point de vue pratique, RHUMATISMES; CAUSES; HUMIDITÉ FROIDE 375 exige les recherches cliniques les plus approfondies et l'instruction la plus complète.

Je n'entrerai pas ici dans les détails que comporte cet immense sujet, je ne parlerai que de quelques notions générales qui pourront s'appliquer soit à la plupart des nombreuses variétés de souffrances dites rhumatismales, soit à l'indication de moyens simples et inoffensifs, applicables à la curation de la plupart d'entre elles.

269. Douleurs dans les muscles et les ligaments (myosalgies syndesmalgies), produites par l'humidité froide.

Le froid humide, agissant d'une manière continue, paraît donner lieu à des douleurs dans les muscles, les ligaments, etc.; c'est contre cette cause que l'on prescrit, avec raison: les bains de vapeur, les eaux thermales, les applications chaudes, les frictions, l'emmaillotage des parties douloureuses avec le coton recouvert de taffetas gommé, quelquefois le massage et même l'exercice. Ces moyens n'enlèvent pas, il est vrai, la cause froid humide, qui n'agit que momentanément, mais ils peuvent modifier ses effets organiques. Ceux-ci consistent en changements assez inconnus qui surviennent dans les tissus où les douleurs ont lieu, douleurs qui se reproduisent fréquemment à l'occasion d'un refroidissement nouveau (1). Ces souffrances sont tout

<sup>(1)</sup> La même cause, agissant de nouveau, doit nécessairement donner lieu aux mêmes effets; c'est ainsi que s'explique naturellement la reproduction du mal, et cela sans qu'il soit nécessaire d'admettre un rhumatisme dont rieu ne prouve l'existence.

376 RHUMATISMES; CAUSES: FROID HUMIDE; FATIGUE au plus calmées par les narcotiques et les anti-spasmodiques de toutes sortes.

270. Douleurs rhumatismales des anciens militaires.

Revenons sur quelques-uncs des annotations précédentes.

Le plus souvent on attache à l'action de la cause froid humide, des douleurs musculaires qui sont les suites de la fatigue que produit l'exercice des muscles. surtout alors qu'il est longtemps prolongé; on ne cesse de rapporter au refroidissement, au rhumatisme, les douleurs des reins et des membres que ressentent les anciens militaires, qui, dans leurs campagnes, ont fréquemment bivouaqué; or, parmi les soldats dits rhumatisants, il en est beaucoup qui n'ont amais été soumis à l'action de cette cause et qui ne soussrent pas moins de ces douleurs. Il est cependant certain que les marches forcées, surtout que la station prolongée, que les exercices musculaires continuels et excessifs donnent lieu à des douleurs de muscles qui, dues à une altération dans la structure de ceux-ci, se reproduisent facilement à l'occasion de mouvements et même du refroidissement. Les militaires sont assujettis à ces marches, à ces exercices, et les gardes nationaux qui sont une faction de deux heures ou qui assistent à des revues, peuvent dire si la station prolongée rend les muscles endoloris et malades. Les cavaliers qui ont été longtemps en selle, peuvent avoir, à la longue, altéré les muscles adducteurs de la cuisse, ainsi qu'il en arRHUMATISMES SUPPOSÉS; RUPTURES MUSCULAIRES 377 rive pour les personnes qui montent à cheval, quand ils n'en ont pas l'habitude. Il se peut donc faire qu'un grand nombre de souffrances, dites rhumatismales, éprouvées par les anciens soldats, soient les résultats de telles causes. S'il en était ainsi, comme tout me porte à le croire, ce ne serait pas à des médicaments dirigés contre l'agent rhumatismal qui n'existe pas, mais contre la lésion suite de l'action musculaire exagérée (hypermyosismie) qu'il faudrait agir, et cela : par le repos, alternant avec de légers exercices; par le massage, par les douches, par l'électricité et par les eaux thermales. Dans les cas chroniques, la gymnastique, convenablement dirigée, peut avoir beaucoup d'utilité.

 Ruptures des muscles, douleurs musculaires par compression, par distension, ou par d'autres lésions traumatiques (traumamyosalgies) (1).

La plupart des douleurs qui, à l'occasion d'un effort, se manifestent brusquement et avec une grande intensité dans les membres et dans toutes les parties charnues du corps, sont les résultats de la rupture ou de la distension forcée des muscles.

Depuis longtemps on a observé ce fait dans le mollet, et l'on a assigné, pour siége à l'accident dont il s'agit, le petit faisceau musculaire connu sous le nom de plantaire grêle.

<sup>(1)</sup> Voyez le nº 40 du Courrier médical, rédigé par mon secrétaire particulier, M. Adolphe Ramond,

## 378 RHUMATISMES SUPPOSÉS; RUPTURES MUSCULAIRES

J'ai constaté que, dans bien des cas, la rupture dont il s'agit a lieu dans les muscles jumeaux, comme l'ont démontré pour moi, d'une part, l'écartement notable qui survient entre leurs fibres charnues déchirées (phénomène qui s'observe surtout pendant leur contraction), et, de l'autre (dans quelques cas), une ecchymose considérable, et même de la fluctuation que l'on saisit dans l'écartement dont il vient d'être parlé (4).

Ce qui a lieu pour les muscles du mollet se passe exactement de la même façon, et, dans une multitude de cas, pour ceux de la région des reins. Là aussi j'ai parfois reconnu : un écartement notable entre les extrémités rompues des fibres charnues lombaires, une ecchymose, une fluctuation manifeste dans le sang épanché entre les masses divisées, et même un son hydrique obtenu au moyen du plessimétrisme.

Lorsque, après quelques jours ou quelques semaines, la cicatrice s'opère, la douleur cesse; mais celle-ci reparait fréquemment à l'occasion d'un mouvement, même léger, de la masse lombaire, survenant lors du redressement ou de l'abaissement rapide du tronc, et même de contractions musculaires exécutées pendant le sommeil.

Ces phénomènes ont reçu les noms de lombago, douleur de rein, rhumatisme dans les reins; et, loin d'être dus au prétendu principe ou vice rhumatismal, ils sont les résultats de causes physiques on ne peut pas plus matérielles.

(1) Voyez l'observation nº 1 dans le Bulletin clinique, 1834.

C'est à des circonstances du même genre que l'on doit rapporter certaines douleurs, parfois très-vives, dont le début est souvent instantané, et qui, à la suite des quintes de toux, se font sentir chez les phthisiques ou chez des gens atteints de coqueluche, de bronchite aiguë, etc.

Ces souffrances se déclarent : 1° dans les muscles des côtés de la poitrine (pleurodynie des auteurs); 2° du ventre; 3° dans le triangulaire du sternum ou dans le diaphragme (1).

Le torticolis est une affection du même genre, qui a pour siège les muscles du cou et souvent le sternomastoïdien. Des douleurs musculaires ont lieu encore chez des individus qui, ayant monté à cheval, ont ainsi comprimé les muscles adducteurs de la cuisse, etc., etc.

Contre les accidents dont il s'agit, les médicaments ont fort peu d'utilité. Il serait tout aussi absurde de les prodiguer alors, que d'employer, pour remédier à une fracture des os, l'emplâtre contra fracturam. Ne comptez donc en rien, dans les douleurs de reins récentes ou le lombago (que vous attribuez au rhumatisme, et qui sont les résultats de ruptures ou au moins de distensions musculaires), sur les bains de vapeurs sulfureuses, sur l'eau-de-vie camphrée, sur les liniments opiacés ou narcotiques de toutes sortes; n'ayez pas plus de confiance dans ces médications alors qu'il s'agira de toutes les affections analogues; soyez bien per-

<sup>(1)</sup> Bulletin clinique, nº 1, 1834.

380 DOULEURS MUSCULAIRES DUES A DES CICATRICES suadés que le repos, qu'une situation des parties blessées ou distendues telles qu'elles ne soient pas tiraillées, mais au contraire qu'elles soient aussi rapprochées que possible, sont, dans des cas semblables, les principaux moyens d'être utiles. Quelques applications émollientes peuvent cependant avoir une efficacité palliative; et si le déplacement du corps ne cause pas trop de douleur, des bains tièdes peuvent encore calmer les souffrances : tels sont les moyens simples et utiles qui conviennent dans les myosalgies dont il vient d'être parlé, lesquelles en général, ont peu de durée.

S'agit-il de douleurs existant depuis longtemps dans un muscle, et qui ont tout à coup succédé à quelque effort ou à quelque distension? Ce n'est pas là encore un rhumatisme, mais bien une lésion matérielle qui s'est déclarée dans les fibres musculaires à la suite d'une rupture ou d'une distension, et qui, ne pouvant guère céder aux médicaments, exige une médication tout aussi matérielle que les causes qui produisent les douleurs.

272. Cas remarquables de guérison de douleurs musculaires obtenues par la rupture d'anciennes cicatrices.

Un ouvrier entra, en 1860 (1), à l'hôpital de la Charité, pour une douleur ayant son siége à la partie interne et moyenne de la cuisse droite. Des pressions faites avec le doigt, puis le dessin, me permirent de

<sup>(1)</sup> Gazette des hópitaux, 1860; Courrier médical (1863) Clinique de la Faculté de Paris.

constater que le mal existait dans le muscle grand adducteur, et que la direction qu'elle présentait était transversale à la longueur de cet organe; il me sembla même sentir une légère dépression sur les points où la souffrance se prononçait. Il y avait près de deux ans que la douleur persistait; elle s'était déclarée brusquement et avec une violence extrême, puis elle avait continué sans interruption depuis ce temps; bien que, devenue moins intense, elle avait empêché le malade de vaquer à ses travaux et même de marcher. Je pensai que la souffrance était due à quelque lésion matérielle du tissu cicatriciel, à quelque dégénérescence des fibres musculaires, ou à une altération profonde de quelques fibrilles nerveuses. J'admis que, lors des mouvements, ces parties devaient être tiraillées et qu'elles produisaient ainsi la douleur. Dans ces idées, je fis porter la cuisse en dehors, de manière à tendre fortement le muscle malade, et, dans cette position, je donnai de suite sept ou huit coups assez secs, avec le bord cubital de ma main droite, sur le point malade.

Il en résulta une très-vive douleur, mais, un moment après, cet homme put se lever et en boitant à peine; il suffit de réitérer trois fois la même manœuvre pour que la guérison fût complète et pour que ce malheureux fût capable de reprendre ses travaux.

Depuis le temps où j'ai recueilli cette observation, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'obtenir des résultats avantageux de la même pratique. Loin que les douleurs ainsi combattues fussent les suites de rhumatismes, RHUMATISMES SUPPOSÉS; MYOSALGIES

elles étaient dues à d'anciennes lésions traumatiques. lesquelles n'avaient en rien cédé aux innombrables médications internes qui avaient été longtemps et inutilement employées.

Les exercices gymnastiques, les douches, les bains. le massage, les frictions profondes pratiquées sur les muscles endoloris, les applications de courants électriques, peuvent encore, dans les cas de myosalgie, avoir un avantage marqué.

Pour se faire une idée de l'importance qu'il y a d'étudier attentivement les causes des myosalgies, avant de déclarer qu'elles sont rhumatismales, il est bon de citer un cas dans lequel je remédiai à une douleur de l'avant-bras en faisant cesser la circonstance matérielle qui produisait la souffrance.

273. Observation relative à une douleur de l'avant-bras déterminée par l'action de jouer du violon.

Depuis quinze ans, alors qu'il avait maintes fois recu des contusions sur le nerf cubital au coude, un médecin était sujet à un très-léger tremblement des muscles de l'avant-bras (myopallie), qui n'avait guère lieu que dans certains mouvements d'abduction qu'exige l'action de se faire la barbe. Le nerf cubital, surtout à la hauteur du coude, devenait parfois douloureux.

Il y a trois mois, une souffrance très-incommode, que bien des gens n'auraient pas hésité à considérer comme rhumatismale, se déclara dans l'avant-bras, et elle s'y manifesta surtout à l'occasion des mouvements ou de la pression de cette partie du membre. Pendant longtemps la cause de cet accident resta entièrement inconnue; mais il arriva qu'une nuit, lorsque, le soir précédent, ce médecin avait longtemps joué du violon, la
douleur de l'avant-bras devint infiniment plus vive, et
il se rappela alors que très-ordinairement il se livrait,
le soir, à cet exercice; alors il le suspendit pendant
plusieurs jours, et la souffrance disparut; il le reprit :
la douleur revint, et à quatre ou cinq reprises, la même
relation entre cette cause et cet effet fut constatée; il ne
s'agissait donc pas ici d'un rhumatisme imaginaire,
mais bien de l'influence très-positive de certains mouvements névro-musculaires sur une névo-myosalgie.

274. Faiblesse dans l'action musculaire (hypomyosismie). Diminution dans le volume des muscles (hypomyotrophie).

Depuis quelques années, on a beaucoup étudié les maladies des muscles, qui, pendant fort longtemps, avaient été négligées, et l'on s'est principalement occupé de leur affaiblissement d'action (hypomiosismie) et de leur diminution de volume ou atrophie musculaire des auteurs (hypomyotrophie). Les études pathologiques sur ce sujet sont d'une haute importance. Je me bornerai à faire ici quelques réflexions relatives à la thérapeutique de ces états pathologiques.

275. Amaigrissement, débilité des muscles résultant de leur défaut d'action.

Quand un homme robuste à muscles puissants et volumineux a le malheur de se fracturer la cuisse, il arrive

#### 384 ATROPHIE OU HYPOTROPHIE MUSCULAIRE

que le membre est, pendant plusieurs mois, condamné à un repos absolu. Ce membre, lorsqu'il sort de l'appareil où il a été si longtemps maintenu, a considérablement diminué de volume, et parfois les muscles y sont réduits à une dimension fort petite. Ce n'est pas seulement la cuisse et la jambe comprimées et soustraites au contact de l'air et de la lumière qui ont éprouvé cette hypotrophie, car le membre du côté opposé a aussi considérablement perdu de son volume. Bien que le blessé ait été nourri convenablement, partout les chairs sont molles et faibles, partout elles ont perdu de leur dimension et de leur poids. Il en arrive encore ainsi dans les affections aiguës ou chroniques alors qu'elles ont forcé le malade à garder le repos au lit et à rester immobile.

Ce n'est pas d'une façon directe que, dans les altérations des nerfs, les muscles auxquels ces nerfs transmettent l'influence psychismique (vitale) ou névraxiques maigrissent; c'est parce que les fibres musculaires cessent d'agir qu'elles s'hypotrophient et finissent par être réduites aux plus minimes proportions.

276. Augmentation dans le volume et dans l'action des muscles à la suite de l'exercice.

Tout au contraire, les fibres charnues qui se livrent à des mouvements habituels plus ou moins énergiques et non portés jusqu'à la fatigue, se nourrissent davantage et acquièrent plus de volume qu'elles n'en avaient auparavant. Ce fait est entré dans le domaine vulgaire. Les athlètes devenaient démesurement musculeux à la suite de leurs exercices soutenus; nous sommes étonnés de voir les énormes cuirasses de nos anciens chevaliers, les pesantes épées des paladins de Charlemagne, et nous nous demandons comment il se trouvait des hommes capables de les porter ou de s'en servir. Mais nous oublions que leur existence se passait à exercer continuellement leur corps et leurs membres. Les danseurs ont des mollets volumineux; le boulanger qui pétrit est remarquable par le développement de ses bras, et tel qui se livre à l'escrime voit aussi grossir ses membres supérieurs.

Les viscères n'échappent pas à cette grande loi de l'influence des mouvements sur le volume de la fibre charnue.

Dans les rétrécissements des orifices du cœur, de l'estomac, du rectum, de l'utérus. etc., les tissus musculaires de ces organes, agissant d'une manière exagérée, à l'effet de déterminer la progression du sang,
du chyme; des scories, etc., acquièrent un développement exagéré et une énergie d'action nécessaire pour
surmonter la résistance des obstacles qui s'opposent
à la progression de ces diverses substances.

Ces faits s'expliquent facilement par cette réflexion ; que la circulation, devenant plus active lors de la contraction du muscle, doit y faire parvenir plus de sang et donner, en conséquence, plus de matériaux à la nutrition. 277. Moyens de remédier à l'hypotrophie et à la diminution des muscles.

Les remarques précédentes sont éminemment applicables aux indications curatives propres à remédier à la diminution du volume des muscles due à une insuffisance de nutrition (hypomyotrophie), et à la faiblesse de ces organes (hyposthénismie myosique). Dans de tels cas, on augmente l'énergie de l'action musculaire en la provoquant surtout par l'exercice volontaire. A son défaut, l'électricité peut le remplacer jusqu'à un certain point, et elle a quelquesois été utile dans la curation de l'hypotrophie musculaire. Les frictions, le massage (1), ont encore ici une efficacité incontestable. Il en est ainsi des douches froides employées en même temps que l'on donne au malade une nourriture réparatrice. Ce sont là les principaux moyens qui, dans des cas pareils, peuvent être utilement employés. Ils sont mille fois plus utiles que la strychnine, la brucine, dont l'emploi est si dangereux, et que les nombreux remèdes que l'on a proposés.

278. Utilité extrême de l'exercice musculaire dans la paralysie générale. Observation de guérison.

Des considérations du même genre sont aussi applicables à la faiblesse et à l'hypotrophie myosique, qui sont dues à une affection cérébrale ou myélique, c'est-àdire à l'ensemble de phénomènes désignés sous le nom

<sup>(1)</sup> Voyez l'article massage du Dictionnaire des sciences médicales, par M. Piorry (1819).

de paralysie générale, de paralysie atrophique, etc.

J'ai été assez heureux pour obtenir d'excellents résultats de l'influence d'un régime réparateur, des exercices réguliers, de plus en plus ènergiques et d'une sorte d'éducation donnée aux muscles des extrémités inférieures, éducation qui consistait à faire faire des pas de plus en plus étendus. En même temps, j'avais recours aux autres moyens dont il a été fait mention (page 386) Des personnes âgées, atteintes de faiblesse générale dans des membres pelviens, ont, dans ces cas, repris de la force et pu se livrer de nouveau à une marche régulière et continue.

Il en a été ainsi de notre illustre maestro R...; et depuis plus de six ans la progression s'est tellement rétablie chez lui qu'ayant suivi, m'a-t-il dit, les conseils que je lui ai donnés dans une consultation étendue, il se pivre encore actuellement à de longues et continuelles promenades.

D'autres malades, affaiblis à ce point qu'ils faisaient quatre-vingts petits pas pour traverser un salon circulaire de six mètres, parvinrent, après un mois d'exercice et d'un régime réparateur, à parcourir en dix pas la même distance. La santé générale, le volume et la force des autres muscles, l'intelligence, s'étaient en même temps améliorés.

279. Observation très-remarquable du même genre.

Un ouvrier peintre, atteint d'une entérie et d'une encéphalie causées par le plomb, après plusieurs mois

#### 388 MYOSATROPHIE - UTILITÉ DE L'EXERCICE

de souffrance entra, en 1862, dans mon service; il était exsangue, et les muscles des membres, ceux mêmes du tronc, avaient considérablement diminué de volume. Ce malade, réduit à un état de maigreur presque squelettique, pouvait à peine se mouvoir; cependant il n'était pas paralysé, car il parvenait encore à exécuter de très-faibles mouvements. On disait qu'il était atteint d'une cachexie saturnine; pour moi, je ne voyais dans l'état de ce pauvre homme qu'une émaciation extrême des muscles et un défaut de sang entretenus par le mangue d'exercice et par l'abstinence. Ce malheureux. depuis longtemps, se tenait immobile dans le lit, et ne voulait point manger. Il me fallut le menacer de le nourrir par force (en injectant par une sonde œsophagienne de la nourriture dans l'estomac) pour surmonter la répulsion absolue que lui inspirait une alimentation quelle qu'elle fût. La paleur était excessive; la peau présentait un peu cette coloration mate et jaunaire en rapport non pas avec une cachexie fantastique, mais bien avec l'absence du sang dans les capillaires cutanés, absence d'où résultait une teinte blême et cadavéreuse de la peau. Il fallut me céder; le malade se décida à prendre des aliments, qui, d'abord donnés dans de faibles proportions, furent ensuite largement administrés.

380. Appareil très-simple pour faire exécuter aux malades alités des mouvements énergiques.

Je voulus faire exécuter au malade une gymnastique quelconque dans le lit; mais comment parvenir à faire



APPAREIL TRÈS-SIMPLE POUR FAIRE AGIR LES MEMBRES 389 faire des mouvements à un malheureux incapable de se livrer d'une manière suivie au moindre exercice? J'établis un lien circulaire au bas de chaque jambe; le milieu d'une bande fut passée au-dessus de la barre de fer qui, dans les hopitaux, et vers le pied du lit, supporte les rideaux. — Les deux extrémités de cette bande furent ensuite attachées aux liens circulaires qui, audessus des malléoles, entouraient les jambes, et, de cette facon, toute traction exercée par l'un de ces membres soulevait celui du côté opposé. Alors je recommandai au malade d'exécuter le plus souvent possible des mouvements alternatifs d'élévation et d'abaissement de ces parties, ce qu'il exécuta ponctuellement. En très-peu de temps, cet homme prit tant de goût à cette manœuvre qu'il s'y livra d'une manière assidue. Quelques semaines s'étaient à peine écoulées que le malade devint moins pâle, que le pouls se releva, que les membres inférieurs reprirent du volume et de la force, mais les supérieurs restaient très-minces et privés de mouvement. Un appareil semblable à celui qui avait été appliqué aux jambes fut employé pour les bras et eut pour support le barreau de fer du milieu du lit. Ce barreau servit d'appui et de poulie pour exécuter des mouvements du même genre qui surent promptement suivis d'une guérison presque complète, à laquelle contribua, dans les derniers temps, un courant d'électricité que M. Courant dirigea avec ce zèle et ce dévouement dont il a donné tant de preuves dans mon service.

### 290 MYOSATROPHIE; UTILLTÉ DE L'EXERCICE

281. Autres cas analogues aux précèdents.

Je pourrais citer un bfen grand nombre de faits de ce genre, et par exemple celui d'un homme qui ne pouvait marcher, et qu'an jury de concours avait considéré comme atteint d'une inflammation de la moelle. Cependant, ce malheureux n'avait autre chose qu'une hypotrophie musculaire, suite du repos continué pendant six mois, repos auquel il avait été soumis pour une fracture de la jambe; il me fut impossible de trouver chez lui une lésion de la colonne vertébrale ou des signes de souffrances myéliques. Des exercices, d'abord pris dans le lit, puis une marche modérée, des frictions, le massage et un régime réparateur rendirent en deux mois cet homme à la santé et à ses travaux.

Les exemples précédents, choisis parmi un si grand nombre d'autres, suffisent pour faire voir que les moyens hygiéniques les plus simples réussissent, dans l'hypotrophie musculaire, beaucoup mieux que les médicaments.

Peut-être aurai-je plus tard à citer plusieurs cas dans lesquels l'exercice des membres dans le lit a été très-utile.

#### 282. Ataxie locomotrice.

Il règne en ce moment, parmi les médecins, une sorte d'épidémie scientifique, qui conduit un grand nombre d'entre cux à considérer quelques symptômes réunis, ou même un phénomène isolé et variable, comme une maladie. C'est elle qui a enfanté le goître exophthalmique et l'ataxie locomotrice. Qu'à la suite de quelques lésions chroniques de diverse nature, ayant pour siège le cerveau ou la moelle rachidienne; que consécutivement à une altération quelconque dans la structure des muscles ou des nerfs qui s'y distribuent, les mouvements ne soient plus entièrement soumis à l'influence normale de la volonté aidée par la vue, et que des faisceaux musculaires autres que ceux qui devraient volontairement agir, entrent en action (ce qui est nécessairement la cause de mouvements désordonnés), voici que, pour cette sorte de paralysie ou plutôt d'anomonervismie, on imagine et l'on admet l'existence d'une maladie spéciale!

Chose déplorable, on ne se borne pas à donner, contre cette entité fantastique, l'opium, le datura, la belladone, la strychnine, etc.; mais on ne craint pas d'administrer intérieurement, même à de jeunes personnes, le nitrate d'argent. Le moindre inconvénient de ce médicament, ainsi administré, est de donner à la peau une coloration bronzée qui rappelle assez bien la teinte des tristes habitants de certaines îles de la Polynésie! Arrive-t-il qu'après plusieurs mois de traitement, et sous l'influence de l'action organique, ou de quelque circonstance accidentelle, les mouvements se rétablissent plus ou moins, comme cela se voit à la suite des paralysies symptomatiques, ou des hémorrhagies cérébrales, alors qu'un travail réparateur se fait autour du

caillot, on ne manque pas d'attribuer au médicamentpoison l'effet observé. On recommande alors cette drogue; celui qui l'a administrée le premier a des imitateurs qui la prescrivent d'après la parole du maître et qui mettent tout autant de légèreté que lui dans l'examen du malade!

Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire de la médecine; ce n'est pas là de la pratique raisonnable: c'est se livrer à un empirisme irrésiéchi et dangereux, condamné par le bons sens et que la conscience n'approuve point!

Le devoir du médecin digne de ce nom est, dans des cas analogues comme dans tous les autres, d'interroger avec soin l'organisme, de rechercher dans le névraxe. dans la moelle, dans les nerfs, dans les muscles, dans les circonstances commémoratives, quels peuvent être le siège primitif, la nature du mal, et d'agir en conséquence. Sans doute, il arrivera trop souvent de ne pas pouvoir s'élever à la connaissance précise des causes et des effets des accidents observés; mais alors il faut se rappeler que, dans les cas douteux, la règle pratique. dictée par l'honneur et par le bons sens, est de n'avoir recours qu'à des moyens hygiéniques, ou, du moins, de n'employer que des médications qui ne peuvent pas nuire. C'est donc alors l'exercice provoqué avec prudence, dirigé autant que possible par une ferme volonté du malade, une véritable éducation des muscles, aidée de l'influence du rhythme (mouvements mesurés par le son du tambour, de la voix ou de quelque instrument);

ce sont les frictions, le massage, les douches, etc., qui seuls peuvent réussir à régulariser une locomotion dite ataxique.

283. Règles pratiques relatives à l'exercice musculaire.

Dans les considérations qui précèdent, j'ai souvent parlé pour des cas particuliers de l'exercice et de son utilité; mais il est une importante remarque à faire, au point de vue clinique, sur la manière dont il doit être généralement pratiqué. Cette remarque, la voici:

Dire à un malade, dont les muscles sont exténués ou affaiblis: Prenez de l'exercice, est, sans doute, donner, si ce malade peut l'exécuter, un excellent conseil ; mais ce conseil est presque toujours mal interprété. Loin d'en tirer parti, le patient s'en trouve parfois fort mal, Les mouvements continués malgré la fatique sont plutôt préjudiciables qu'utiles. Rappelons-nous que les bestiaux surmenés sont bientôt atteints de fièvres graves, et que les chevaux qui habituellement travaillent outre mesure, bien qu'ils mangent énormément d'avoine, finissent par n'avoir plus que des muscles hypotrophiés et débiles. L'exercice musculaire, pour être utile, doit alterner avec le repos, et c'est le sentiment de lassitude qui exige ce repos, auquel le mouvement doit succéder alors que la fatigue a cessé. C'est en se conformant à cette pratique que, dans bien des cas où il s'agissait de faiblesse des membres à la suite de lésions myéliques anciennes, de cicatrices qui avaient succède à des hémorrhagies du cerveau, d'hypotrophies musculaires,

#### 394 EXERCICE SURMONTANT UN OBSTACLE

suites d'un repos trop continu, etc., j'ai vu de nombreux malades présenter un prompt et heureux changement dans le volume de leurs chairs et de leurs membres.

Il est enfin un moyen utile à employer pour augmenter l'action des muscles, pour faire que leur nutrition devienne meilleure et qu'ils acquièrent de l'énergie: c'est de mettre un léger obstacle à leur action, de sorte qu'ils aient à se contracter activement pour le surmonter. Cette petite manœuvre m'a surtout réussi dans le cas de paralysie des muscles des doigts, causée par les oxydes ou les sels de plomb.

Un médecin distingué pensait qu'un enfant de douze ans était atteint d'une atrophie progressive du muscle opposant du pouce. Ce muscle avait été condamné à une longue inaction par une inflammation de la jointure voisine. Or, ce même muscle prit tout d'abord du volume et de la force, alors que, d'après mon conseil, on empêcha, à maintes reprises, le pouce d'exécuter le mouvement d'opposition et en n'y cédant qu'après un effort continué.



#### CHAPITRE XV

MALADIES DES OS ET DE LEUR MEMBRANE D'ENVELOPPE (OSTÉOPATHIES OU OSTÉIES; PÉRIOSTÉIES).

Loin de vouloir parler ici avec quelque détail des maladies des os et du périoste, mon intention est de faire seulement quelques annotations pratiques sur diverses lésions de ces parties, annotations qui, dans les opinions reçues, sortent du domaine de la médecine proprement dite.

584. Généralités sur les os, sur leur composition, leur consistance et sur le plessimétrisme de ces organes.

Les os sont formés de deux éléments principaux : 1º leur partie vivante, organisée, leur trame vasculaire, fibro-cellulaire et nerveuse; 2º les substances crétacées, calcaires, presque complétement constituées par du phosphate de chaux, qui se déposent dans ce parenchyme primitif, lequel s'accroît lui-même par le périoste, ainsi que l'a vu Duhamel du Monceau, et comme l'a si bien démontré M. Flourens dans de magnifiques expériences.

Or, les proportions relatives de l'élément vivant et de l'élément calcaire varient considérablement l'un par rapport à l'autre, soit dans les divers os, soit dans des régions différentes de chacun d'eux, et elles diffèrent non moins suivant des circonstances organiques nombreuses en rapport avec les dispositions de l'organisme en général et des os en particulier.

Depuis les travaux de Ribes, on sait que le phosphate de chaux, chez les gens qui avancent en age, est, en proportion relative, beaucoup moins considérable que chez l'adulte, fait contraire à tout ce que l'on croyait auparavant.

Dans les circonstances pathologiques, telles que les fractures, les intumescences de l'os ou exostoses, dans les maladies du périoste dites périostoses, les proportions du phosphate de chaux par rapport à la trame organique diminuent sensiblement, et il peut arriver que tantôt ce soit un chiffre moins élevé dans la masse de la substance calcaire qui soit la cause du mal, et que tantôt ce soit la lésion de la trame organique qui donne lieu à cet état organopathique. On ne saurait croire combien est grande l'importance pratique de ces réflexions s'appliquant aux fractures (ainsi que l'a prouvé M. le professeur Gosselin), au ramollissement des os (ostéomalaxie), à leur induration (ostéosclérosie ou éburnation), aux déviations osseuses liées au ramollissement (dysorthostéies), etc.

Les innombrables modifications survenues normalement ou anormalement dans les proportions du phos-



## PLESSIMÉTRISME DES OS; ÉTAT SAIN

397

phate calcaire contenu dans les os, doivent inévitablement se traduire au doigt et à l'oreille par le plessimetrisme de ces parties, et tous les faits, toutes les expérimentations démontrent l'exactitude de cette proposition.

285. Plessimétrisme des divers os; différences très-marquées entre les résultats qu'il donne.

Percutez sur la plaque d'ivoire : le cou-de-pied, le poignet, les condyles du fémur et du tibia, la rotule, etc., vous verrez tout d'abord que ces os donnent une résistance et une élasticité médiocre au doigt, et produisent à l'oreille un son assez obscur (1). Que, si vous explorez ensuite par le plessimétrisme la partie moyenne du fémur, du tibia, du radius, etc., vous constatez que ces · · organes présentent une grande dureté, une sécheresse, une sonorité extrêmes, en quelque sorte élastiques; tandis que, si l'on vient à percuter le crane, il y a, soit par le toucher, soit par l'ouïe, une résistance très marquée, accompagnée profondément d'un défaut absolu d'élasticité. Ces caractères du plessimétrisme du crane sont en rapport avec la présence du cerveau, organe mou et situé derrière une plaque osseuse. Les os de la face, du bassin, les vertèbres, etc., donnent aussi des bruits et des impressions acoustiques et tactiles variés.

On peut même affirmer que chaque os produit, par le plessimétrisme, des sensations qui lui sont propres

<sup>(1)</sup> Voyez le Traité de plessimétrisme

et qui sont composées, d'une part, des résultats en rapport avec la structure, l'épaisseur, etc., de l'os; et, de l'autre, des sons et des împressions tactiles dus au retentissement des parties qui entourent l'organe solide.

Toutes les fois qu'un os augmente de volume, les proportions de sels calcaires qui entrent dans sa composition sont modifiées tantôt en plus (ce qui est rare), comme il en arrive lors de l'éburnation et des exostoses éburnées (ostéosclérosie, sclérostéocélie), tantôt en moins, ce qui est fréquemment observé : 1º dans les intumescences des jointures (arthromégalies), réputées ou non rhumatismales, scrofuleuses, etc.; 2º dans les exostoses et les périostoses syphiosiques (célies syphiostéiques et périostéiques); 3° dans le ramollissement osseux dit rachitisme (ostéomalaxie). Le plus ordinairement, dans cette dernière lésion, il n'y a pas de tuméfaction. Non-seulement, dans les cas précédents, le phosphate de chaux varie de proportions, mais celle des éléments organiques de la trame vivante est loin de rester la même, et elle est modifiée dans ses principes constituants, dans sa vascularisation, etc. Il y a donc, dans les ostéopathies, deux circonstances principales dont il faut tenir compte : l'élément organique et l'élément calcaire.

#### 286. Augmentation dans les parties molles ou liquides des os.

Lorsqu'un os perd de sa consistance, il contient moins de phosphate de chaux, et souvent sa trame organique a également diminué, bien qu'en même temps la proportion de liquides séreux ou de graisse puisse avoir augmenté. De ces combinaisons variées entre les diverses quantités relatives des éléments constituants des os, peuvent résulter des augmentations de volume avec diminution de consistance, des ramollissements, des indurations, des tumeurs, etc.

Les considérations générales précédentes sur le plessimétrisme des os et sur les variantes qu'ils peuvent présenter dans leur composition, étaient indispensables pour motiver les annotations thérapiques qui vont suivre.

## 337. Rachitisme; ramollissement des os (ostéamalaxie) (i).

Le ramollissement des os, d'où résulte leur déformation, a reçu le nom de rachitisme, expression qui porterait à croire que la colonne vertébrale peut seule être atteinte de cette lésion, et cependant on l'observe fréquemment dans le bassin, les tibias, les fémurs, etc. On a été plus loin : on a considéré les cas dont il s'agit comme des phénomènes symptomatiques, comme la manifestation d'une maladie interne dite rachitisme, et dont tout l'organisme serait le siège. Dans ces idées, on a cherché à combattre cette affection dite générale : soit par des médicaments dits spéciaux, toniques, antiscrosuleux, etc., qui, largement prônés dans les livres,

<sup>(4)</sup> Voyez l'article ostéomalaxie du Dictionnaire des sciences médicales, par M. Piorry. Cet article a-t-il été pour quelque chose dans l'idée ultérieure du pathonomisme?...

400

réussissent peu dans la pratique; soit par des moyens hygiéniques, qui sont ici bien autrement utiles.

C'est par suite d'une diminution dans leur consistance que les os se courbent et s'infléchissent. Ces accidents ont lieu, en général, sur des individus de divers àges, mais d'une faible constitution, mal nourris et dont l'organisme est plutôt au-dessous (hyporganisme) qu'au-dessus de l'état normal. Dans de tels cas, nonseulement la partie vivante de l'os éprouve une déperdition, mais encore les proportions du sel qui donne de la solidité aux os, c'est-à-dire du phosphate de chaux, diminuent considérablement. Les recherches auxquelles je me suis livré ne laissent pas de doute à ce sujet, et le plessimétrisme vient surtout à l'appui du fait dont il s'agit. Si l'on vient à percuter la partie moyenne d'un os long, tel que le tibia, partie dont la solidité est grande, on trouve qu'elle donne à la fois un son clair et une dureté élastique. Si, comme il a été dit, on explore par le même procédé les extrémités spongieuses de ce même tibia ou le pied, on constate tout d'abord que les sensations acoustiques et tactiles sont beaucoup moins sèches et accompagnées d'un retentissement moindre. Que si, d'un autre côté, l'on vient à explorer, avec le plessimètre, le crane, le sacrum, les os iliaques ou la face, on voit que ces organes résonnent et impressionnent le doigt chacun d'une manière spéciale.

Or, les os des rachitiques sont sensiblement moins durs et moins sonores que ceux d'un individu du même



âge, de même sexe, et qui se trouve dans des circonstances normales. Moins les proportions de phosphate de chaux qu'ils contiennent sont grandes, moins la trame organique est consistante, et moins sont marquées la dureté et la sécheresse de ces parties observables par la percussion médiatisée. Il arrive même

OSTÉOMALAXIE: PHOSPHATE DE CHAUX

que, dans des cas extrêmes, les os ramollis sont à peine élastiques et ne donnent qu'une résonnance très-

obscure.

Il résulte de tout ceci que le pléssimetrisme fournit en quelque sorte la mesure approximative de la proportion de sels calcaires contenus dans les os, et que si, par la suite et sous l'influence du traitement ou de toute autre circonstance, les proportions du phosphate de chaux augmentent ou diminuent encore, on pourra constater, par les résultats tactiles ou acoustiques que donne la percussion médiate, les changements survenus dans l'os ramolli. De là, comme il est si facile de le concevoir, d'importantes applications à la thérapeutique.

288. Utilité du phosphate de chaux porphyrisé dans le rachitisme (ostéomalaxie).

C'est en procédant ainsi, c'est en ne m'en rapportant pas à des opinions préconçues, c'est en demandant sans cesse à l'expérimentation d'éclairer les questions en litige, que je suis parvenu à constater, de la manière la plus certaine, qu'en administrant aux rachitiques des doses abondantes de phosphate de chaux, on ne tarde

#### 402 PHOSPHATE DE CHAUX DANS LA GROSSEGSE

pas à observer que les os ramollis deviennent plus durs et contiennent, par consequent, des sels calcaires dans des proportions de plus en plus grandes (1). Bien entendu qu'en même temps les malades atteints de rachitisme (ostéomalaxie) sont soumis à un régime, réparateur composé de viandes grillées, rôties, et de toutes les substances que l'hygiène apprend être les plus propres à convenablement nourrir. La dose de phosphate de chaux, que l'on administre d'ailleurs en poudre impalpable, et que l'on mélange avec une substance pateuse, telle que du riz au lait, une crême, des marmelades (2) etc., a été, dans les cas que j'ai observés, de cinq à dix grammes par jour; et comme ce sel n'est en rien dangereux (si ce n'est chez les gens âgés et qui portent des concrétions dans le cœur ou dans les artères), on peut, sans inconvénient, augmenter les quantités de ce médicament pour les enfants en bas âge.

289. Utilité du phosphate de chaux dans la grossesse, chez certains pneumo-phymiques et dans les fractures.

Ce n'est pas seulement alors qu'il existe un ramollissement des os bien constaté et suivi de déformations, qu'il convient de faire prendre au malade et même aux gens bien portants du phospate de chaux, mais c'est toutes les fois que les circonstances d'organisation où

<sup>(4)</sup> Voyez le mémoire de M. Souligoux sur ce sujet.

<sup>(2)</sup> M. Leroy, pharmacien, rue d'Antin, a composé une dissolution de phosphate de chaux, qui est d'une administration avantageuse et sommode.



MAL DE POTT; UTILITÉ DU PHOSPHATE DE CHAUX 403 se trouvent les individus exigent l'emploi de ce sel en proportion plus grande qu'à l'ordinaire, comme cela a lieu: 1º pour les femmes enceintes depuis le troisième mois jusqu'à l'époque de la parturition, époque durant laquelle la mère et l'enfant\_en consomment alors beaucoup pour la nutrition des os du fœtus; 2º pour certains pneumo-phymiques chez lesquels on peut espérer la guérison des tubercules par induration crétacée; 3º chez les gens atteints de fractures, comme il résulte des expérimentations intéressantes de M. le professeur Gosselin, etc., etc.

# 290. Utilité extrême du phosphate de chaux dans les affections dite mal de Pott.

Ainsi que je l'ai démontré dans le mémoire et dans les quatorze observations que j'ai lus à l'Académie des sciences, la maladie de la colonne vertébrale, dite mal de Pott, est, dans une multitude de cas, très-heureusement traitée par le phosphate de chaux, le repos et un régime réparateur. J'ai largement réussi dans de tels cas, sans faire appliquer de cautères, de moxas ou de vésicatoires à demeure. Depuis lors, de nombreux succès sont venus confirmer mes premières expériences, et j'affirme que la très-grande majorité des malades atteints de mal vertébral que j'ai traités par le phosphate de chaux et un régime réparateur ont été rendus à la santé (1).

(1) Voyez le Trailé de plessimétrisme.

291. Abcès par congestion (pyoles étiostéiques) guéris par le phosphate de chaux et les injections de teinture d'iode iodurée au tiers.

Parmi les cas que je pourrais citer, il en est plus de dix dans lesquels le mal de Pott ou rachisocélie, avait donné lieu à des pyoïes étiostéiques (abcès par congestion), abcès qui ont cédé aux irrigations abondantes faites avec l'eau tiède et aux injections réitérées plusieurs fois par jour, et composées du mélange d'un tiers de teinture d'iode iodurée, avec deux tiers d'eau.

#### 292. Moyens simples de redressement des os.

Les os, dont la dureté semblerait exclure la mollesse, sont très-susceptibles de se modifier dans leur forme et dans leur direction. C'est ainsi que les dents mal rangées, soumises à des pressions fréquentes et médiocrements fortes, pressions convenablement dirigées, finissent par se redresser; souvent une mère attentive est parvenue ainsi à régulariser les arcades dentaires plus ou moins difformes que portaient ses enfants. C'est au moyen d'appareils mécaniques que les dentistes habiles parviennent, par une compression continue, à donner aux dents cette régularité de forme tant recherchée.

C'est par de semblables procédés que l'habile M. Preterre parvient, avec le temps, à faire supporter des pièces qui remédient parfaitement aux accidents que causent des perforations congénitales ou accidentelles des os du palais, etc. En cherchant à redresser un très-grand nombre de fois par jour les jambes torses,



CHUTE DE L'ÉMAIL DES DENTS; PHOSPHATE DE CHAUX 405 on finit par les ramener quelquesois mieux que par des bandages à leur disposition naturelle. On agit alors en sens inverse de ces nourrices peu soigneuses qui, portant sans cesse leur ensant sur un bras et du même côté, rendent dissormes ses extrémités insérieures.

292 bis. Chute journalière (chez un diabétique.) d'une couronne de dent pendant huit jours de suite. Administration du phosphate de chaux; dès le lendemain, il ne tombe plus de nouvelles dents.

En 1866, un adulte, dans la force de l'âge, était atteint, à l'Hôtel-Dieu, salle Ste-Agnès, d'un diabète sucré très-intense. Il arriva que pendant une semaine il perdit chaque jour la couronne d'une dent, qui se détachait spontanément de sa racine en laissant à la place une surface rugueuse; cet homme conservait ses débris dentaires, et à chaque visite il montrait aux élèves une nouvelle dent qui s'était détachée. Me rappelant les innombrables faits que j'avais recueillis sur l'efficacité du phosphate de chaux, je pensai à administrer le jour même, à ce malade, 10 grammes, matin et soir, de ce même phosphate. Chose vraiment extraordinaire, dès le lendemain et les jours suivants, les dents qui restaient ne tombèrent plus, et il en fut ainsi pendant plus de deux mois durant lesquels ce diabétique resta à l'hôpital.

293. Mouvements permanents et habituels de redressement du tronc empèchant le corps de se courber en avant.

Ce que l'on observe dans le jeune âge a tout aussi bien lieu à une époque même avancée de la vie. La tendance du corps à se courber en avant, tendance qui dépend en très-grande partie : du poids de la tête, de l'hypotrophie des muscles du dos, de la diminution du phosphate de chaux des vertèbres, est combattue avec le plus grand avantage par des mouvements habituels de redressement du tronc. Tel vieillard qui se courbe de plus en plus au grand détriment de ses organes, de leurs fonctions et de ses formes, parviendrait peu à peu à se tenir tout aussi bien qu'auparavant si la volonté persévérante de redresser le rachis et de rapprocher les épaules en arrière, ne lui faisait pas défaut. Cette gymnastique de tous les moments est plus utile, à coup sûr, que bien des manœuvres orthopédiques et prévient cet abaissement gradué et successif de la tête, qui, inévitablement suivi d'une déformation des côtes, d'une difficulté dans la dilatation de la poitrine, dans l'abaissement du diaphragme, finit par exposer le vieillard aux affections les plus graves des voies aériennes et par tenir dirigés habituellement vers la terre ses regards que l'intelligence lui recommande d'élever vers le ciel.

#### 294. Utilité de veiller à l'attitude du corps.

La nécessité de faire une attention extrême à l'attitude que l'on prend ordinairement est évidente; tel qui s'habitue à se mal tenir, à incliner la colonne vertébrale dans un sens toujours le même, s'expose dans un court espace de temps à se déformer complétement. Le plus grand nombre des bossus n'ont d'autres déviations que celles qui sont l'exagération des courbures naturelles du rachis. Celui-ci présente sur tous les hommes, au niveau du dos, une convexité très-légère à droite, et une concavité proportionnée à gauche (1).

Par contre, et pour que le centre de gravité du corps puisse se conserver, la région des reins ou lombaire présente une inclinaison à convexité gauche et à concavité droite, ce qui est un peu en rapport avec la présence de la masse du foie de ce côté. Eh bien! alors que l'on abandonne à lui-même le poids du corps, et qu'on ne le maintient pas dans sa rectitude normale. pour peu surtout que les os éprouvent une diminution dans leur trame organique, ou dans leur élément phosphato-calcaire, pour peu encore que les muscles du dos et des lombes soient moins développés ou moins énergiques qu'à l'ordinaire, voici ce qui arrive : le corps s'infléchit dans le sens des courbures naturelles d'abord légèrement, puis davantage, puis plus encore. Après un temps parsois assez court, la déviation devient extreme et d'autant plus que la tendance à la flexion est plus marquée et que la courbure qui s'opère augmente la longueur du levier à l'extrémité duquel la tête est placée. Dans de tels cas, le rachis finit à la longue par prendre la forme d'un S dont la convexité supérieure est en haut et à droite.

<sup>(1)</sup> Cette concavité est probablement le résultat de la position du cœur qui correspond plus à gauche qu'à droite.

#### 408 DÉVIATION DU RACHIS CHEZ LES GENS DÉBILES

295. C'est surtout chez les gens débiles que le rachis a de la tendance à se dévier.

C'est surtout chez les individus d'une constitution détériorée (hyporganisme), chez ceux qui sont soumis à un mauvais régime ou à des pertes habituelles de liquides, qu'il en arrive ainsi.

Encore une fois, on a fait de cette triste disposition de l'organisme, et sous le nom de rachitisme, une maladie particulière. Cette manière d'individualiser le mal est si peu exacte et satisfait si peu l'esprit, que tous les degrés possibles d'incurvation du rachis se font observer, sans transition aucune, depuis la plus légère courbure compatible avec une taille encore bien prise jusqu'à une déformation portée à l'extrême. Très-peu de personnes, en effet, ont un rachis à peu près droit, et sur vingt individus il y en quinze ou dix-huit de plus ou moins déviés.

On peut jeter un coup d'œil sur l'ensemble des squelettes de la Faculté pour s'assurer de ce fait; mais on le constate également pendant la vie. Sans doute il arrive, à cause du mouvement de torsion des vertèbres, que M. Guérin et moi avons observé si fréquemment, à l'hospice des vieilles femmes, que les épines rachidiennes sont ordinairement situées sur la ligne médiane, de sorte que l'on croirait tout d'abord que le rachis est rectiligne; mais si l'on vient à percuter et à dessiner la colonne vertebrale, on trouve très-ordinairement que la rangée dorsale des vertèbres est située à droite de la ligne moyenne du corps.

#### DÉVIATION DU RACHIS; INDURATIONS DES POUMONS 409

206. Pour éviter de commettre de graves erreurs sur le diagnostic des tubercules ou de la pneumonite, il est utile de percuter la colonne vertébrale.

Il faut bien connaître le fait dont il s'agit, alors que l'on veut explorer la poitrine par la percussion, car, sur les points où correspond la colonne vertébrale un peu déviée, se rencontre, par le plessimétrisme, une résistance et une obscurité de son que les gens peu expérimentés prennent trop souvent pour une altération de son et d'impressions tactiles dues à des tubercules (1). De la de graves erreurs possibles en diagnose et en thérapisme. Que de fois n'ai-je pas été consulté par des personnes, traitées comme phthisiques, et qui n'avaient autre chose qu'une déviation du corps des vertèbres, avec bronchites successive et coïnciden te!

Le moyen d'éviter une aussi grave erreur est de percuter et de dessiner avec soin la colonne vertébrale; il sussir d'être prévenu de la possibilité d'une aussi grossière méprise pour ne jamais la commettre.

297. Moyens d'éviter la déviation des vertèbres (dysorthorachisie).

Les moyens d'éviter que la colonne vertébrale se dévie consistent, d'une part, dans la médication propre à combattre le ramollissement des os telle qu'elle va

<sup>(4)</sup> Je suis même récemment parvenu, en percutant très-profondément la poitrine en avant, à dessiner, au moyen du plessimétrisme, et par un certain degré de matité éloignée, la déviation de la colonne vertébrale.

## 410 DÉVIATIONS DU RACHIS; TRAITEMENT

bientôt être exposée, et, de l'autre, dans les mouvements habituels et volontaires propres à redresser le rachis. Ces mouvements consistent à courber l'ensemble des vertèbres en sens inverse de ce qui a lieu chez le rachitique. On fait imiter à celui-ci la position d'un homme qui serait bossu du côté opposé à celui où la colonne vertébrale s'infléchit. Dans cet exercice gymnastique on fait exécuter au corps des vertèbres une torsion dans une direction contraire à celle qui avait lieu, et l'on ramène la masse vertébrale non-seulement à la ligne médiane derrière les apophyses épineuses, mais, si le cas n'est pas très-grave, on parvient même à la porter vers le côté du thorax opposé à la déviation. Des exercices gymnastiques spéciaux, des appareils bien faits, peuvent aussi contribuer à ce résultat, mais infiniment moins que ne le font les contractions volontaires des muscles, soit de la gouttière vertébrale, soit de la poitrine et même du tronc. C'est une chose curieuse que de voir combien, sous l'influence de l'action énergique de ces muscles, se redressent immédiatement des tailles déformées. En même temps que la colonne rachidienne vient se placer derrière les épines vertébrales. la hauteur du corps du rachitique s'élève de trois ou quatre et même de six centimètres, comme il est facile de s'en convaincre en faisant tenir le dos appuyé sur un mur, et en mesurant l'elevation de la tête avant et apres l'execution du mouvement dont il s'agit. Reste à l'habitude, soutenue par une volonté serme, à continuer cette manœuvre. Sous l'influence de ces moyens, après un cer-

#### INFLUENCE FACHEUSE DES CORSETS

tain temps et après des efforts persévérants, des tailles, même très-déformées, reprennent, au moins en grande partie, leur direction naturelle. Je pourrais citer plusieurs faits de ce genre, mais je pense qu'il suffit d'affirmer ce que je viens de dire.

Une lanière de gomme élastique légèrement tendue depuis la nuque jusqu'au sacrum, et maintenue soit en haut par un collier ou des brassières, soit en bas, par une ceinture fixée au bassin, ajoute utilement, chez des gens affaiblis, chez des vieillards, etc., son action de redressement à celle des muscles extenseurs du tronc.

296. Les vétements et les corsets déforment souvent la taille de seux qui les portent.

Les vêtements mal disposés contribuent infiniment à déformer le corps, et cela est vrai pour les corsets de la femme et pour les habillements des hommes.

Les corsets semblent faits tout exprès pour mettre obstacle à l'action régulière des organes de la poitrine et du ventre. Ils empéchent les côtes de s'écarter de l'axe du thorax; ils font que le diaphragme s'abaisse difficilement et que la paroi abdominale, retenue, comprimée par un lien circulaire, ne peut se dilater; de là une gêne habituelle à respirer, un refoulement des vicères par en haut, et de l'utérus par en bas; ces circonstances exposent aux affections du cœur et des poumons, et sont pour beaucoup dans la production des abaissements de l'utérus.

Malgré tous les essais qui ont été faits pour rendre

412 CORSETS PERMETTANT LA DILATATION DE L'ESTOMAC les corsets moins dangereux, il y a encore bien des perfectionnements à y apporter.

#### 299. Corsets et brassières pouvant présenter de l'utilité.

Une double brassière, servant à porter les épaules vers le rachis et sixée en arrière, près de la ligne médiane, à une ceinture, est infiniment présérable à un corset quel qu'il soit; mais si la mode, infiniment plus écoutée que la raison, exigeait impérieusement l'usage de ce vêtement, il faudrait au moins le rendre le plus inoffensif possible. A la place de cette tige droite et aplatie saite avec de la baleine ou de l'acier, il serait, par exemple, utile de faire courber une plaque solide de saçon à laisser en avant sur le corset, au niveau de l'épigastre, une large ouverture où se placerait facilement l'estomac alors qu'il serait distendu par la nourriture, par l'eau ou par des gaz.

J'ai fait fabriquer de tels corsets, qui font, en trèsgrande partie, disparaître les inconvénients attachés à ce genre de vêtements; mais il vaudrait mieux encore s'en passer que d'en porter d'une forme quelconque.

On peut tirer quelque parti des brassières, à l'effet de coopérer au redressement de la colonne vertébrale; il suffit, en effet, de faire porter une de ces brassières sur l'épaule opposée à la flexion, pour que l'action lente et facile à graduer qu'elle exerce tende à ramener peu à peu le rachis incurvé vers le centre de gravité.



#### VÉTEMENTS CAUSES DE DÉVIATIONS DU RACHIS 413

300. Inconvénients de certains vêtements portés par les hommes

Les vêtements des hommes sont, pour la plupart, disposés d'une manière fort peu conforme à l'accomplissement régulier des fonctions. Il faudrait un volume pour exposer ce qu'il serait utile de dire sur ce sujet. Je me bornerai ici à exposer de simples annotations.

La ceinture du pantalon, très-serrée, gêne les mouvements, refoule (comme le fait le corset pour les femmes) les viscères de bas en haut, tend à augmenter a concavité de la région lombaire en arrière, et, par conséquent, à faire courber davantage les vertèbres dorsales en avant. Joignez à ceci que cette compression du ventre par la ceinture empêche la respiration (qui exige l'abaissement du diaphragme) de s'accomplir régulièrement.

Mais c'est surtout la manière dont le pantalon est retenu qui influe d'une manière fàcheuse sur la colonne vertébrale.

Si l'on porte ce pantalon serre à la taille, dans l'intention de prévenir la chute de ce vêtement, on tombe dans les inconvénients de la ceinture dont il vient d'être parlé; si l'on se sert des bretelles ordinaires, il en résulte encore de véritables dangers.

Lors, en effet, que les courroies dont il s'agit sont fixées en avant et à peu près au niveau des mamelons, il se trouve que la tête se trouve tiraillée en avant et en

#### 414 REDRESSEMENT DE LA COLONNE VERTÉBRALE

bas par ce lien antérieur, et que la tendance à la flexion du cou et de la colonne dorsale, due en trèsgrande partie au poids du cerveau, augmente de toute l'influence qui résulte de la traction que causent sans cesse les bretelles antérieures.

De là un immense inconvénient pour les gens dont les os sont grêles, peu solides, et dont les muscles ne sont pas vigoureux, comme cela a lieu chez les personnes qui ont perdu du sang ou qui ont été soumises à d'autres causes d'exténuation.

## 301. Manière de fixer les bretelles faisant redresser la colonne vertébrale.

Pour prévenir les inconvénients dont il s'agit, pour forcer les épaules à se rapprocher, et pour relever la tête en redressant la colonne dorsale, il suffit tout simplement de déplacer les boutens qui retiennent en avant les bretelles du pantalon, et de les attacher tout à fait en arrière et près de ceux auxquels sont fixées les extrémités postérieures de ces mêmes bretelles. Une petite courroie en caoutchouc, maintenant rapprochées en arrière les lanières de ces supports, est aussi très-utile pour rapprocher les épaules. Ces remarques, en apparence de si peu d'importance, en ont cependant une tellement grande que les précautions dont il s'agit ont, sur le maintien, une immense influence et concourent infiniment à conserver ou à augmenter la rectitude du tronc, à favoriser le développement de la poitrine, l'amplitude de la respiration et



#### TRAITEMENT DE L'OSTÉOMALAXIE

l'accomplissement régulier des fonctions. Il n'y a pas en médecine de petites choses : il n'y a que des gens qui voient petitement les choses.

Toutes les précautions précédentes prises chez les personnes dont les os sont généralement ou partiellement plus mous qu'ils ne doivent l'être, doivent coïncider avec l'emploi des moyens propres à donner à ces mêmes os le degré de solidité qui leur manque. Or, d'après les considérations précédemment établies, et que je ne crains pas de répéter, à cause de leur utilite, ces moyens sont de deux ordres.

#### 302. Moyens de rendre aux os leur consistance normale.

Les uns sont appelés à augmenter, autant que possible, la nutrition de la trame organique qui entre dans la structure osseuse, et ils consistent dans une nourriture réparatrice, fortement animalisée, telle que des viandes succulentes, du poisson, des œufs, du laitage, auxquels, pour varier la nourriture, on ajoute quelques végétaux consistant en herbages, fruits très-mûrs, etc., et ce régime réparateur sora secondé, d'ailleurs, par l'exercice modéré au grand air et à la lumière,

Les autres ont pour but d'augmenter la proportion des sels calcaires indispensables à la solidité des organes osseux, et il est évident que c'est de l'emploi du phosphate de chaux qu'il s'agit ici. Ce sel qui, chez les jeunes sujets, n'a aucun inconvenient, peut être donné, sans qu'il en résulte de danger, à des doses assez fortes,

#### 416 PHOSPHATE DE CHAUX CHEZ LES VIEILLARDS

et, par exemple, à celle de 5 à 10 grammes à chaque repas. C'est à l'état de poudre impalpable (porphyrisée) qu'il faut l'administrer, et le lait contenant du riz ou de la fécule, un potage épais, etc., sont les meilleurs excipients pour l'incorporer. A peine s'aperçoit-on de la présence de ce sel dans les aliments, car il est insipide. M. Gobley en a fait faire des pastilles qui n'ont rien de désagréable. On a longtemps pensé que le phosphate de chaux était insoluble, ne devait pas être absorbé dans le tube digestif ou angibrôme. On sait maintenant, à n'en pas douter, que les acides contenus dans l'estomac suffisent pour le dissoudre et pour permettre son introduction dans l'organisme. La chimie le prouve et l'expérience clinique le démontre; car, très-peu de jours après l'administration de ce médicament, on constate facilement que les os ramollis deviennent plus durs et plus sonores; que ceux qui sont tuméfiés par suite de leur ramollissement diminuent de volume et que les fractures chez les animaux qui prennent des sels phosphato-calcaires se consolident beaucoup plus vite que chez des individus de même age et de même espèce, placés dans des circonstances analogues.

303. Inconvénients du phosphate de chaux chez les vieillards et chez les goutteux.

Le phosphate, le carbonate de chaux, peuvent avoir, chez les gens âgés et chez ceux surtout qui sont disposés à la goutte ou oxurémie, de très-grands inconvénients, car de tels individus sont très-sujets à la forma-



EXOSTOSES; PHOSPHATE DE CHAUX

tion de concrétions dans les parois artérielles, dans la membrane interne du cœur et autour des articulations; et il serait à craindre qu'en leur faisant prendre en abondance des sels calcaires, ceux-ci, loin de se porter sur les os dont la trame cesse d'être constituée pour s'en imprégner, ne vinssent à encroûter les vaisseaux, le cœur et les jointures, et ne donnassent lieu à des troubles de circulation, à des ruptures vasculaires dans le cerveau ou ailleurs, à des déformations articulaires, etc. Tout au contraire, ainsi qu'il a été dit, chez le jeune enfant, chez la femme qui porte un fœtus dont les os s'endurcissent, l'utilité des sels calcaires, administrés comme aliments, est évidente, et je crois qu'il en est ainsi chez quelques phthisiques dont les tubercules pulmonaires peuvent passer à l'état d'induration.

Quelques recherches sur l'efficacité du phosphate de chaux pour favoriser l'induration des tubercules, m'ont conduit à des résultats qui me paraissent utiles, mais il faut bien du temps et bien des occasions d'expérimenter, pour acquérir une opinion fixe sur ce sujet. Les faits dont je vais parler viennent à l'appui de ces idées.

304. Curation des exostoses et des périostoses (ostéocélies, périostéocélies).

La mollesse, le peu de sonorité des os au plessimétrisme, alors que les organes ou leur membrane sont partiellement tuméfiés et malades, m'a conduit à administrer, dans de tels cas, du phosphate de chaux à 418 MALADIES DES OS; PHOSPHATE DE CHAUX des doses plus ou moins fortes (de cinq à quinze grammes par jour).

J'ai agi ainsi, même dans des cas où les accidents antérieurs, les états organopathiques coïncidants, me portaient à croire que le syphiose était l'agent primitif qui avait causé le mal.

Chose remarquable : dans presque tous les cas de cette sorte que j'ai eu l'occasion d'observer, une amélioration très-prompte, aulvie presque constamment de la guérison, a été obtenue.

Il faut avouer cependant que, dans la plupart de ces faits, j'ai administré, en même temps que le sel phosphato-calcaire, de l'iodure de potassium, et que, dans quelques autres, j'ai fait prendre aux malades, matin et soir, deux ou trois centigrammes de proto-iodure d'hydrargyre.

Il n'est pas impossible qu'une partie de l'honneur de cette curation doive être rapportée à l'iode ou au mercure; mais, dans d'autres cas analogues où je n'avais prescrit que du phosphate de chaux, j'ai encore obtenu des succès.

305. Ulcères des os (elcostéies); abcès par congestion (pyoïes elcostéiques); mai de Pott (rachisocélie, rachisophymie).

Plusieurs fois j'ai vu des ulcérations superficielles, ayant pour siège des os dénudés ou recouverts de téguments perforés eux-mêmes par des fistules, se cicatriser sous l'influence du phosphate de chaux et de l'iodure de potassium administrés dans l'intérieur, et cela

tandis que j'avais recours, a l'exterieur, aux applications de teinture d'inde étendne d'ens.

Il en a surtout été ainsi d'une electie de sternum observée chez un homme de querante ans, et présentant un diamètre de près de trois certainètres.

Dix on douse malades atteints d'abois par concestion on symptomatiques, suites d'ulcérations de la surface antérieure des vertébres, on de tabercules ramollis du corps de ces es, out va. sous l'influence du traitement dont je vais parler, leur santé se rétablir complétement. Les cas de ce genre que je me rappelle le mieux sont les suivants : 1º l'enfant d'un pharmacien et chimiste distingué, M. Leroy, qui, frappé des résultats du traitement que j'avais prescrit, se livra plus sard à des travaux intéressants sur la propriété que présente l'iode de prévenir la putréfaction du pus; 2º un jeune homme, inutilement traité pendant longtemps pour un abcès, suite d'une carie vertébrale, par un chirurgien du plus haut mérite ; 3° une jeune fille dite scrofuleuse, qui eut successivement deux abcès, dont la source était une tumeur ramollie de la colonne vertébrale et une suppuration de l'extrémité inférieure du radius (droite?); 4º un crémier de la rue Sainte-Anne, atteint d'un énorme abcès par congestion; 8° sa belle-sœur, jeune fille atteinte du même mal; 6º un homme de trente ans, qui, entré dans mon service il y y quelques mois, portait une tumeur de la colonne vertébrale aux lombes. Le plessimétrisme sit reconnaître, à droite de cette légion, une collection purulente que,

pendant huit jours, on put suivre dans le côté par l'extension successive de l'espace occupé par la matité.

Cette pyoïe étiostéique vint enfin faire saillie, en moins de deux mois, à l'aine. Cet homme guérit parfaitement, etc., etc. (1).

Il y a bien peu d'années encore, tous les cas de ce genre étaient invariablement suivis de la mort. Ni les cautères, ni les moxas, ni les sétons avec lesquels on torturait les malades, n'entravaient en rien la marche réputée inévitable et fatale de la maladie. La pyémie, la paralysie de la moitié inférieure du corps, les escarrhes de la région sacrée, étaient les circonstances qui amenaient le plus fréquemment une terminaison funeste. Maintenant, je ne crains pas d'affirmer que, sous l'influence de l'ensemble du traitement très-simple dont je vais parler, la plupart des malades dont il est ici question guérissent.

Je crois utile de résumer en quelques mots l'ensemble du traitement que j'emploie dans les abcès par congestion.

Ainsi que dans les cas de rachisocélie sans abces, je fais prendre, lors des pyies éliostéiques, la limaille d'os frais ou le phosphate de chaux, réduits en poudre impalpable et administrés dans du riz au lait ou dans tout autre potage ou encore la dissolution de ce même phosphate calcaire. La dose en est, matin et soir, de trois ou de cinq grammes; en même temps je donne

<sup>(4)</sup> Voyez d'autres faits consignés dans le Traité du plessimétrisme.

PHOSPAATE DE CHAUX DANS LES TUBERCULES de cinquante centigrammes à un gramme d'iodure de potassium, et cela trois fois par jour. Je fais pratiquer, dans le trajet fistuleux, des injections abondantes et très-réitérées avec l'eau pure, de façon à bien nettoyer l'abcès, dont on a soin d'évacuer le pus au moyen de pressions et d'une position convenable. Après avoir ainsi lavé les surfaces sur lesquelles le pus stagne, on fait toutes les douze heures, dans les foyers d'où ce même pus est sorti, des injections avec la teinture d'iode étendue de deux fois son poids d'eau; parfois même il m'est arrivé, pour prévenir la putréfaction des liquides contenus dans les cavités où ils séjournent, de renouveler, à cinq ou six reprises dans la journée, les injections alco-iodiques. Les malades sont en même temps soumis à un régime très-réparateur. Les vins de Bordeaux et même de Malaga ne leur sont pas épargnés. J'y ajoute souvent du vin de quinquina. Loin de condamner ces personnes à un repos absolu, je cherche à faire prendre de l'exercice, tout en évitant la moindre fatigue et en faisant soutenir les épaules par des béquilles. La propreté et le changement fréquent de position dans le lit, des soins extrêmes pour prévenir les escarrhes (dermo-nécrosies) de la région sacrée (page 52), sont ici des précautions de premier ordre pour conserver la santé et la vie.

306. Emploi du phosphate de chanx dans les tubercules pulmonaires.

Ce sont les succès que j'ai obtenus par les moyens précédents, dans les cas de maladie de Pott (qui, évi422 INCRUSTATIONS CALCAIRES; LIMONADE CHLORHYDRIQUE demment, n'étaient autres que des rachisophymies), qui m'ont conduit à tenter, comme je l'ai déjà dit, l'emploi du phosphate de chaux dans les cas de tubercules peu nombreux, et où l'on peut raisonnablement espérer que le mal est susceptible de se terminer par une incrustation calcaire.

307. Emploi de la limonade chlorhydrique dans les cas d'incrustations calcaires ayant leur siège dans les vaisseaux et dans le cœur.

C'est encore dans la même série d'idées que j'ai cherché à prévenir et même à guérir par l'emploi d'une limonade légère prise abondamment et acidifiée par l'acide chlorhydrique des concrétions survenues dans le cœur ou dans les vaisseaux. Cet acide, largement étendu, a, en effet, la propriété de dissoudre, après la mort, les sels des os, et de mettre ainsi à nu leur trame organique. Mon but était, en agissant ainsi, de rendre soluble le phosphate de chaux contenu dans les aliments, et peut-être d'agir utilement sur celui qui se dépose anormalement dans les organes. Il m'a semblé avoir quelquesois réussi dans cette tentative. Il faudrait de nouveaux saits, pour se prononcer sur l'efficacité d'une telle méthode.

#### CHAPITRE XVI

# maladies du névraxe ou centre nerveux (névraxies).

Le centre nerveux (cerveau, cervelet, moelle allongée et rachidienne), ensemble d'organes dont les fonctions si importantes et si variées touchent à la vie elle-même, est susceptible d'un grand nombre de lésions que, pour indiquer les moyens simples et hygieniques par lesquels on peut les soulager ou y porter remède, il faudrait consacrer à leur exposition d'innombrables pages. Je me bornerai à établir ici quelques annotations relatives aux cas principaux qui les concernent, et surtout à ceux dans lesquels les médications peu compliquées peuvent être utiles.

Avant de parler des affections névraxiques, qu'il me soit permis de dire quelques mots sur les douleurs de tête qu'on attribue trop fréquemment à l'encéphale luimême, et auxquelles on a donné, en conséquence, le nom de céphalalgies, de céphalées, etc., tandis qu'elles ont pour siége les nerfs qui, placés sous la peau du

#### 424 DOULEURS DE TÊTE; NÉVRALGIES

front ou le cuir chevelu, ne sont autres : que les branches frontales ou temporales de la cinquième paire, ou encore, le nerf sous-occipital et ses divisions, etc. (1).

\$08. Douleurs de tête ou céphalalgies frontales et sus-orbitaires, névralgies sous-occipitales.

Dans le plus grand nombre des cas de douleurs de tête, c'est dans le nerf frontal que le mal existe; l'organographisme (2) prouve ce fait de la manière la plus évidente. Si l'on presse avec le doigt, ou mieux encore avec un corps mince, les points endoloris, et si l'on marque avec le crayon ceux où la souffrance est le plus vive, on dessine bientôt la branche nerveuse dont il s'agit, ou les filets qui sont spécialement atteints. On parvient, de cette façon, à tracer, pendant la vie la disposition anatomique de ces ramifications de la cinquième paire, et l'on peut, en procédant ainsi, tracer la figure entière et les rapports de la plupart des autres nerfs douloureux superficiellement placés.

La névralgie frontale, considérée isolément, est trèsrarement due à quelque lésion appréciable du nerf lui-même; mais elle est le symptôme ou l'expression de quelque souffrance d'organes ou de nerfs plus ou moins éloignés; de là vient que, pour connaître les

<sup>(4)</sup> Les os du crane ou leur membrane, les muscles épicraniens, la peau elle-même, peuvent être le point de départ des souffrances de la tête, de sorte qu'il faut se donner garde de rapporter au cerveau, comme on le fait trop souvent, toute souffrance aigué dont la partie supérieure de la tête est le siège.

<sup>(2)</sup> Mémoire lu à l'Académie des sciences en 4854.

moyens de remédier à une céphalalgie frontale, ou mieux à une pentanévralgie, il faut être médecin instruit et versé dans la triple étude de l'anatomie, de la physiologie et de la diagnose. Tel mal de tête, purement névralgique, sera le résultat d'une indigestion ou dyspepsie, et réclamera l'emploi de vomitifs; tel autre encore, reparaissant à des heures fixes, coincide presque constamment avec une augmentation dans le volume de la rate, qui, au lieu de présenter au plessimétrisme les dimensions de l'état normal (4 centimètres de haut en bas sur 8 d'arrière en avant), en offre cinq, six ou sept dans la première direction, et dix, douze ou quatorze dans la seconde : ici le sulfate de quinine, l'extrait de berberis ou les douches froides, sur le côté gauche, sont les principaux et je dirai même presque les seuls moyens de guérir la céphalalgie.

Il résulte évidemment de ce qui précède que les maux de tête ne peuvent être traités convenablement : qu'après avoir élucidé, au moyen d'un examen attentif, le caractère de la souffrance, son point de départ, les circonstances où se trouve le malade, et qu'en dirigeant une médication appropriée au cas particulier qui se présente. On en peut dire autant des autres douleurs dont la tête est fréquemment le siège.

369 Migraine ophthalmique, ou mieux névropallie ommique.

La migraine ophthalmique, si l'on veut, la névro-

426 MIGRAINE OPHTHALMIQUE; NÉVROPALLIE OMMIQUE

pallie ommique (1), occupe ordinairement un seul œil. Elle se manifeste, d'abord par la vue d'une image bleuâtre, d'un arc lumineux le plus souvent disposé en zigzags, oscillant avec rapidité, grandissant avec lenteur, et auquel succède une douleur frontale du même côté (2). C'est une de ces vibrations de nerfs, de ces nevropallies (appréciables ici à la vue), qui, partant d'un point du système nerveux, s'étendent de proche en proche, passent successivement, par des communications dites anastomoses, d'un nerf à un autre. Dans ce trajet, ces vibrations causent soit des douleurs, soit des accidents convulsifs, soit des paralysies ou d'autres troubles fonctionnels, phénomènes divers qui sont en rapport avec les actions départies aux organes où ces nerss se distribuent, ou encore avec l'organisation de chacun de ces nerfs. Dans le langage genéralement reçu, la migraine dont il s'agit et que j'ai appelée d'abord irisalgie, puis névropallie ommique, est une névropathie qui, partant de l'œil, s'étend au nerf frontal, où elle cause d'atroces souffrances, se propage à la huitième paire (nerf qui se distribue à l'estomac) et donne lieu alors à des nausées, à des vomissements; quelquesois, bien que rarement, elle se reproduit, sous la forme d'os-

<sup>(4)</sup> Voyez le Mémoire sur la migraine orhthalmique dans le procèdé opératoire de la percussion, dans la Clinique médicale de la Pitié et dans le Traité de médecine pratique.

<sup>(2)</sup> Je reviens ici sur l'étude de la migraine ophthalmique, parce que son histoire éclaire celle des névropalites en général.

ACTION NERVEUSE REFLEXE; TRAVAUX DE M. PIORRY 427 cillations, dans les doigts, les avant-bras, etc. (1).

310. Action nerveuse réflexe dont la consaissance est faussement attribuée à Marshall Hall. — Travaux, de beaucoup antérieurs, de M. Piorry sur ce sujet. Névropalies prosasiques.

En vérité, l'on a bien raison de dire que nul n'est prophète dans son pays. Dès 1826 ou 1827, ayant étudié sur moi-même la névropallie ommique ou irisalgie, n'ayant que trop vu le demi-cercle oscillant dont il vient d'être parlé, ayant suivi la marche de la vibration fibrillaire qui le constitue vers le ganglion ophthalmique, le nerf frontal, puis la huitième paire, jusqu'à l'estomac, et son extension dans les membres, et cela sans que le névraxe fut atteint de ces phénomènes; ayant ensuite retrouvé exactement les mêmes accidents chez un grand nombre d'autres personnes, je publiai ces faits; d'abord dans divers Mémoires sur les névralgies et sur les névroses, puis dans la Clinique médicale de la Pitié (1833), dans les Traités de diagnostic (1832) et de médecine pratique (numéros 11,551, 11,519, 11,630). Tout d'abord je vis que des faits tout à fait analogues avaient lieu dans l'épilepsie, l'hystérie, le tétanos, la rage, l'angine de poitrine, etc., etc., en un mot, dans la plupart des affections dites névroses, dans le fièvre intermittente, etc., etc., et je déduisis

<sup>(4)</sup> Dans des cas trèf-rares, d'ailleurs, le point de départ des oscillations névriques, donnant lieu à des douleurs de tête, à des nausées et à des vomissements, n'est plus l'œil lui-même, mais bien le nez ou l'oreille.

de ces études que certains états névropathiques, consistant pour moi en des oscillations nerveuses (névropallies). naissaient sur certains point périphériques du système nerveux, et se propageaient non pas jusqu'au cerveau. mais soit à la moelle, soit à des plexus, soit à des ganglions, soit à d'autres nerfs, et déterminaient dans ce trajet des symptômes en rapport avec les filets que les vibrations parcouraient, ou avec la structure des organes où ces filets se distribuaient. Je vis même à la Pitié, en 1836 ou 1837, un cas qui fut publié dans la Gazette des hôpitaux, et dans lequel existait une destruction complète de la moelle devenue entièrement purisorme et diffluente, et cela à la hauteur de la dernière vertèbre dorsale et dans l'étendue de plus de trois centimètres. Or, sur ce même point et un peu au-dessous de lui, il y avait des sensations perçues qui tenaient à ce que des nerss en communication avec l'encéphale portaient au névraxe les impressions dont les tissus sous-jacents à la lésion étaient le siége; mais plus bas: aux lombes, au bassin, dans les membres inférieurs toute sensibilité était absolument anéantie.

Chose remarquable, cependant : s'il arrivait que l'on excitàt les membres inférieurs et surtout que l'on chatouillàt la plante des pieds, des contractions très-bien ordonnées dans les muscles de ces membres avaient lieu, de telle sorte qu'ils se rétractaient précisément de la même façon que si la volonté avait décidé de ce mouvement instinctif et comme si un nouveau centre nerveux, formé au-dessous de la lésion, avait présidé à

ACTIONNERVEUSE REFLEXE; M. PIORRY; MARSHALL-HALL 429 des contractions destinées à faire éviter le mal par les

parties excitées (1).

Ainsi, tous ces phénomènes que l'on dit constituer l'action réflexe dont l'étude est si bien rapportée, en France et à l'étranger, à Marshall Hall, ont été reconnus et décrits en France, bien des années auparavant, par M. Piorry, qui a été plus loin que l'illustre médecin anglais, puisqu'il a prouve que cette action consiste dans une vibration, une oscillation, une pallie névrique et extensive (prosasique), qui, sans passer par l'encéphale, suit la direction de filets, de branches, de troncs, de plexus, de ganglions nerveux, de sections de la moelle, pour s'étendre de là à des nerfs de sentiment ou de mouvement, en déterminant des phénomènes en rapport avec les fonctions de ces organes.

Mais reprenons ici l'étude des moyens simples et utiles qu'il convient d'employer pour combattre la névropallie ommique ou migraine de l'œil.

311. Petits moyens therapeutiques à employer contre la migraine ophthalmique.

Les moyens pharmaceutiques que l'on a employés pour remédier à la migraine ophthalmique ne réussis-

(1) Cette action involontaire, irréfléchie, rappelle la corde de violon que l'on rapproche du fou et qui se retire comme si elle fuyait la chaleur. Ce fait mérite à coup sûr les réflexions du physiologiste et du penseur. C'est bien là, en effet, la contractilité du tissu de Bichat, ou plutôt le racornissement; mais il faut avouer que la rétraction de la corde se rapproche infiniment de la contraction dirigée par la volonté.

sent presque jamais; l'opium et la morphine donnés à l'intérieur, ou en frictions à l'extérieur, sont sans efficacité. J'ai cru d'abord obtenir de la belladone quelques résultats avantageux; mais plus tard, cet espoir ne s'est pas réalisé. Les seuls moyens qui aient présenté dans ces cas une véritable efficacité sont entièrement du domaine de l'hygiène.

Les causes qui donnent le plus souvent lieu à la migraine ophthalmique sont l'éblouissement et l'action de lire, de travailler des yeux, de fixer un corps lumineux soit après le repas, soit lorsque l'on souffre de la faim. Le premier soin à donner ici est donc d'éviter ces causes pour que leur effet n'ait pas lieu.

## 312. Aliments excitants arrêtant à son début la migraine ophthalmique.

Tout aussitôt que l'image initiale du mal (arc lumineux, apparence électrique, simples lueurs oscillantes, éblouissements) vient à se déclarer, il suffit de porter dans l'estomac quelques aliments excitants, tels que du vin avec un biscuit ou du pain, etc., pour arrêter la progression de la névropallie ou oscillation nerveuse, et pour empêcher qu'elle ne s'étende au front et aux autres nerfs. En agissant ainsi, on ne fait pas cesser, il est vrai, le travail pathologique qui donne lieu à la sensation de l'image, mais ce travail ne se continue pas au delà de l'œil. L'obscurité et le sommeil, quand il est possible de s'y livrer, sont encore d'utiles moyens que les gens atteints de migraine sont conduits spon-

congustions cénébrales; encéphalémies 431 tanément à employer contre cette douloureuse affection.

313. Congestions sanguines cérébrales aigües (encéphalémies); hémorrhagies cérébrales ou apoplexies (encéphalémies).

Les congestions cérébrales aiguës, ainsi que les hémorrhagies dans le cerveau, résultats trop fréquents de ruptures de vaisseaux, ne peuvent guère être utilement combattues par des médications pharmaceutiques. En général, West en ayant recours à des précautions hygiéniques, à des moyens plus ou moins simples, sans danger et à la portée de tous, que l'on peut prévenir, pallier ou guérir les états pathologiques dont il vient d'être parlé.

314. Moyens propres à empêcher les congestions sanguines vers la tête.

Le trop de sang rapidement porté vers le cerveau réclame, avant toute chose, que la tête soit placée sur un plan élevé, autant que possible, au-dessus des autres parties du corps (1).

A ce moyen de premier ordre, il faut ajouter les suivants :

1º Tenir les pieds et les jambes pendants, c'est-à-dire non posés sur le sol;

<sup>(1)</sup> La plupart des considérations qui vont suivre sont extraites de mes expériences et de mes recherches sur les pertes de sang, sur l'appoplexie et la syncope, etc., etc. (procédé opératoire de la percussion médiate et collections de Mémoires, 1832); Traité de médecine pratique, t. VIII.

#### TRAITEMENT DE L'ENCÉPHALÈMIE

432

- 2º Placer les membres supérieurs dans une position analogue;
- 3º Établir en même temps des ligatures fortement serrées au-dessus des coudes et au-dessous des genoux; tenir les membes pendants, c'est-à-dire sans appui, à l'effet de retenir le sang dans les veines et dans les capillaires des extrémités, de sorte qu'une très-grande proportion de liquide soit momentanément soustraite à la circulation et, par conséquent, soit en moins portée vers le cerveau;
- 4º Entourer de corps chauds les membres pour que les vaisseaux s'y dilatent;
- 5° Placer, sur les parties latérales du cou, des corps très-froids, à l'effet que les artères carotides, revenues sur elles-mêmes, reçoivent peu de liquide et en portent moins vers l'encéphale;
- 6° Si le temps permettait d'avoir recours à des ventouses de forte dimension appliquées sur les membres, ce serait encore là un moyen d'une grande efficacité;
- 7° Les respirations suspirieuses profondes et réitérées coup sur coup, pendant quelques minutes, favorisant la circulation pulmonaire et, par suite, le coûrs du sang dans le cerveau, sont encore des manœuvres aussi simples qu'avantageuses pour remédier à la congestion cérébrale et à ses tristes conséquences;
- 8º Les évacuations de matières ou de gaz au moyen de purgatif sont aussi extrêmement utiles, en ce sens



#### ENCÉPHALÉMIE; TRAITEMENT

433

que, vident les intestins, elles diminuent le volume du ventre, et que, rendant ainsi plus facile l'abaissement du diaphragme, il en résulte une expansion plus facile des poumons et une activité plus grande de la respiration.

L'ensemble des moyens précédents est bien autrement actif que les sinapismes, les vésicatoires et les autres moyens douloureux que l'on emploie d'une façon banale, et sans que l'on se soit demandé, avant leur emploi, si la sensation pénible qu'ils causent, si l'impression qui en résulte pour l'encéphale, n'ont pas plus d'inconvénient pour cet organe que n'ont d'avantages le trouble d'innervation et de circulation qu'ils déterminent localement.

313. Utilité de la saignée dans les congestions cérébrales et au moment où se font des hémorrhagies encéphaliques.

Le moyen par excellence, dans les congestions cérébrales bien caractérisées et dans les hémorrhagies encéphaliques, au moment même où elles viennent de se faire, est la saignée, et non pas la saignée pratiquée par une main que dirige un esprit pusillanime, mais portée aussi loin que l'état actuel de l'organisme et les proportions du sang en circulation permettent de le faire.

On ne s'explique, en effet, les appréhensions qu'un grand nombre de médecins de notre temps ont relativement à la saignée que par le peu d'habitude qu'ils ont de la pratiquer, ou par la crainte puérile de ne pas 434 ENCÉPHALÉMIES; TRAITEMENTS DIVERS

plaire au public en y ayant recours. Son extrême utilité, dans les cas où elle est véritablement indiqués et où le plessimétrisme démontre que les organes contiennent béaucoup de sang, est un fait scientifique absolu et contre lequel l'entêtement ou des préventions ridicules peuvent seuls s'élever.

316. Les congestions cérébrales, étant de natures très-diverses, réclament chacune des traitements qui diffèrent entre eux.

Les congestions sanguines du cerveau sont, du reste, de différentes sortes, et les moyens qui conviennent pour les combattre sont loin d'être applicables dans tous les cas. Ainsi, les unes sont dues à un accroissement dans la circulation cérébrale; d'autres à une stase veineuse de l'encéphale, suite elle-même de ce que le cours du sang est difficile dans le cœur ou dans les poumons. Un grand développement du ventre par des matières, des gaz, de l'eau, etc., occasionne aussi une dilatation des vaisseaux dans la cavité du crâne. Des poisons, portés par la circulation dans la substance cérébrale, y déterminent un afflux de liquides, et cet afflux survient encore à la suite des impressions morales et de certaines affections névropathiques, telles que l'hystérie et l'épilepsie. Les lésions chroniques de l'encéphale, telles que celles qui succèdent aux foyers hémorrhagiques, telles encore que des ramollissements, des tubercules, peuvent être les causes des congestions vers la tête.

Chacune de ces circonstances exigeant des modifi-

HÉMORRHAGIES ENGÉPHALIQUES; TRAITEMENT PRÉVENTIF 435 cations particulières dans le traitement, il en résulte qu'il est impossible d'établir ici les moyens hygiéniques plus ou moins simples qui conviennent à chacune des variétés de congestion cérébrale dont il vient d'être question.

La conséquence logique de ce qui précède est que pour remédier à la congestion cérébrale, il faut faire cesser l'action des causes qui la déterminent, ce qui exige, de la part du médecin, une étude approfondie et de la science et du malade. — Ces études ne peuvent être faites dans un ouvrage de la nature de celui-ci.

 Moyen de prévenir la rechute d'une hémorrhagie encéphalique ou d'une attaque d'apoplexie.

Lorsqu'un homme a été atteint d'une hémofrhagie encéphalique (encéphalorhémie), il y a tout lieu de craindre qu'après un nombre variable de jours, de mois ou d'années, le mal ne se reproduise avec une intensité nouvelle et ne compromette encore plus que la première fois la vie du malade. Ce fait est généralement connu: mais ce qui l'est moins, ce sont les moyens de prévenir une aussi fâcheuse catastrophe.

Le premier de tous est la sobriété, et surtout d'éviter d'introduire à la fois dans l'estomac et dans l'intestin une grande proportion d'aliments, et surtout de ceux qui dégagent des gaz. Si cette précaution est utile pour un seul repas, elle l'est non moins pour la vie habituelle,

### 436 HÉMORRHAGIES ENCÉPHALIQUES; TRAITEMENT

et il est certain qu'un régime très-substantiel et trèsabondant, donnant lieu à la formation d'une proportion très-considérable de sang, dispose singulièrement à la congestion et à l'hémorrhagie cérébrale. De plus, l'ingestion habituelle d'une nourriture copieuse, surtout alors qu'elle est composée de farineux, de fécules, de graines potagères, de corps graisseux, doit être rangée, ainsi que la rétention habituelle des matières et des gaz, parmi les circonstances qui favorisent le plus le développement du ventre. Ce grand développement de l'abdomen, genant démesurément la respiration et refoulant le cœur, est une cause puissante d'embarras dans la circulation du cerveau. Il est donc très-utile, pour celui qui est disposé à la rechute d'une hémorrhagie encéphalique, d'être réservé sur la proportion des aliments qu'il prend, et de se nourrir particulièrement de substances qui, sous un petit volume, peuvent le nourrir suffisamment, telles que les viandes, le poisson, les œufs, etc.

Le second moyen est de ne prendre des boissons fermentées, et surtout de celles qui contiennent beaucoup d'alcool, qu'avec la plus grande modération.

Le troisième, d'après ce qui vient d'être dit de la stase des matières et des gaz, et du volume du ventre, est d'avoir fréquemment recours à des purgatifs légers qui, tels que de petites doses de rhubarbe ou de scammonée, provoquent un certain nombre d'évacuations par jour et empêchent la stase des scories et le dégagement des fluides élastiques.

Le quatrième moyen est de se soustraire autant que possible aux impressions morales vives, aux efforts violents et surtout à ceux de la défécation.

Le cinquième est d'éviter aussi de se trouver dans des appartements étroits, mal aérés, et dans ceux surtout où la respiration d'un grand nombre d'hommes a altéré l'atmosphère.

Le sixième est, pour peu que l'on éprouve la sensation d'une gêne à la circulation vers la tête ou de la peine à respirer, de pratiquer coup sur coup des inspirations suspirieuses.

318. Utilité de la limonade chlorhydrique dans le cas de concrétions dans les artères du cœur et dans les vaisseaux.

Les gens qui présentent du côté du cœur des accidents chroniques que l'on peut rapporter à des concrétions dans les vaisseaux, concrétions qui sont parfois appréciables aux artères du bras, de la cuisse, etc., feront bien, d'après quelques faits dont j'ai été témoin, d'avoir recours, pour prévenir la formation de ces concrétions ou pour y remédier jusqu'à un certain point, de prendre, le matin et le soir, une verrée de limonade chlorhydrique légère, et destinée à agir sur les sels calcaires en les dissolvant.

Enfin les saignées, dont la quantité doit être proportionnée à l'état des organes et obtenues au moyen de la lancette ou des sangsues, pourraient, avec avantage, être pratiquées de loin en loin.

Je puis affirmer qu'en ayant recours à l'emploi des

moyens précédents, j'ai vu des gens qui avaient été frappés d'une première et même d'une seconde attaque d'apoplexie, vivre six ou huit ans sans récidive, et que madame H..., de Versailles, qui a été dans ce cas, n'a péri, dix ans après une seconde attaque, qu'à la suite d'un ramollissement hypotrophique du cerveau.

349. Peut-on espèrer ramenor un paralytique, devenu tel à la suite d'une hémorrhagie encéphalique, à un état convenable de l'intelligence et des mouvements? Moyens les plus convenables à employer dans de tels cas.

Rien n'est désespérant comme de voir les infirmités physiques et intellectuelles de l'homme qui a été atteint d'une hémorrhagie cérébrale. A coup sûr, dans des cas pareils, les médicaments n'ont aucune efficacité. Heureusement que, peu à peu et à mesure que s'éloigne le temps où l'attaque a eu lieu, l'intelligence altérée s'améliore et le mouvement se rétablit jusqu'à un certain point. Ces heureuses modifications survenues dans l'état morbide sont les résultats de l'organisme lui-même, que l'on est convenu d'appeler la nature. Seulement, quelques moyens ont, sur le retour des facultés intellectuelles et sur le rétablissement des mouvements, lesquels d'ailleurs restent toujours incomplets l'un et l'autre, une influence heureuse. Ces movens sont d'exciter la volonté des malades, d'engager ceux-ci à agir le plus possible avec les membres paralysés, de pratiquer des frictions et le massage sur ces mêmes membres, et de diriger exclusivement dans leur étendue; en se donnant

garde de le porter vers les centres nerveux, un courant d'électricité par induction; c'est, de plus, de faire exécuter tous les jours des mouvements gymnastiques de plus en plus étendus; c'est encore de faire exercer, autant que possible, l'intelligence ét de recommencer une éducation nouvelle, comme s'il s'agissait d'un enfant que l'on élève; car j'ai vu M. Vatel, (père de l'ancien directeur des Italiens,) qui, à la suite d'une hémorrhagie encéphalique, avait perdu la possibilité de lire, tout en ayant conservé la faculté d'écrire, et qui, reprenant des leçons de lecture, finit, après quelques mois, par lire couramment et ses écrits et les journaux.

32e. Aphasic, aphémie, etc. Cas remarquables d'oubli de la mémoire de certains mots (amnémononie, ce qui signifie perte de la mémoire des noms.

On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, d'un symptôme de souffrance encéphalique, dont on a presque fait une maladie: je veux parler de l'impossibilité où se trouvent quelques personnes atteintes de lésions cérébrales, persistantes ou passagères, de dire certains mots, certains membres de phrase, tandis qu'elles peuvent facilement prononcer d'autres paroles. Des médecins, qui sont très-loin d'adopter le pathonomisme (nomenclature conçue d'après les idées médicales modernes) et qui se sont élevés, avec plus d'animation que de raison, contre l'admission d'un langage utile et expressif, se sont évertués à donner au symptôme dont il s'agit une dénomination convenable et

faite d'après les principes qu'il est souvent indispensable d'adopter dans la plupart des cas pathologiques.

Eux, qui s'élèvent avec une ténacité singulière contre l'emploi, dans notre langue, des racines grecques, ont cherché à former un mot, de source hellénique, qui soit propre à exprimer nettement leur idée sur le caractère même du phénomène dont il s'agit.

C'est ainsi qu'il ont proposé, pour désigner le symptôme dont il est ici question, les dénominations: aphémie, aphasie, etc., etc. Il y a même eu dans les journaux, sur le terme le meilleur à adopter dans ce cas, des discussions auxquelles on a accordé beaucoup trop d'importance; et cependant ces mêmes personnes cherchent à faire croire qu'il est inutile de désigner les lésions d'organes par des mots significatifs! Ainsi est fait l'esprit humain alors qu'il écoute la prévention, la rivalité ou l'esprit de parti!

Ces termes mêmes que l'on a proposés sont surtout mauvais, parce qu'ils ne désignent pas la nature du symptôme que l'on veut dénommer. Ce n'est pas, en effet, la faculté d'émettre les sons vocaux nécessaires pour articuler un mot, une phrase, etc., qui manque au malade : c'est bien la mémoire de ce mot. La preuve en est que, si l'on vient à prononcer devant lui ce terme ou cette phrase alors qu'il les a longtemps et inutilement cherchés, ils les prononce plusieurs fois de suite tout a coup et avec volubilité. C'était ce qui avait lieu pour le vieux prêtre Perrier, que j'ai vu dans les premiers temps de ma carrière médicale et dont j'ai tracé

l'histoire dans les traités de diagnostic et de médecine pratique. Ce vieillard avait oublié les noms de tous les substantifs, et se servait, pour exprimer ce qu'il vou-lait dire, de périphrases dans lesquelles n'entraient que des verbes, des adjectifs, des pronoms ou des prépositions. Ainsi, si son intention était de demander un chapeau, il se servait d'une locution comme celle-ci: Donnez-moi ce qui sert à se couvrir en haut. Arrivait-il qu'on proférât devant lui le mot chapeau, il le répétait plusieurs fois coup sur coup, et, un instant après, il avait de nouveau complétement oublié de pouvoir le dire. J'ai vu, depuis bien des années, plusieurs faits analogues, et je serais désolé d'avoir pu les rapporter à une maladie.

Des phénomènes de ce genre sont si bien des symptômes, que le vieux prêtre Perrier comme M. Vatel (p. 439) portaient des lésions organiques consécutives à des hémorrhagies, et qui, pour le premier de ces malades, furent constatées sur le cadavre, car je trouvai dans l'un des corps striés de l'ancien ecclésiastique plusiers petits kystes sèreux, résultats de l'hémorrhagie encèphalique dont je l'avais traité un an auparavant.

Si l'on voulait donner un nom juste au symptôme dont il est ici question, il faudrait l'appeler amnémo-nomie, ce qui signifie défaut de la mémoire des noms, et cette absence de mémoire se prononce dans un grand nombre de cas et à des degrés très-divers, depuis cet oubli des noms propres, qui a lieu soit d'une manière accidentelle chez tant de gens soit âgés, ou

#### AMNÉMONOMIE (TRAITEMENT UTILE)

442

même jeunes, soit alors que l'on est affaibli, jusqu'aux phénomènes nettement accentués de la perte de mémoire des mots, tels qu'on les observe à la suite des hémorrhagies et de l'atrophie cérébrale, etc.

Il en est du trouble fonctionnel précédent comme d'une foule d'autres : il peut dépendre d'une lésion persistante et de durée, comme cela arrivait dans le cas du vieux prêtre Perrier, et alors le symptôme amnémonomie persiste aussi; ou il est le résultat d'une modification momentanée de texture analogue aux névropallies, aux altérations du sang, etc.; et quand il en arrive ainsi, comme il paraît que cela a eu lieu chez M. le professeur Lordat, le phénomène symptomatique cesse quand l'état organique qui lui a donné lieu s'est dissipé.

Tout ce qui a été dit précédemment des moyens d'exercice et d'éducation applicables à la curation des paralysies, suites des lésions encéphaliques, est applicable à celle de l'amnémonomie,

320 bis. Cas remarquable et guérison incomplète d'amnémononie.

Tout récemment, à l'Hôtel-Dieu, salle Saint-Bernard, j'ai observé à la clinique un cas de guérison imcomplète d'amnémonomie, qui me paraît être des plus remarquables et qui prouve bien que ce phénomène maladif est le résultat d'une lésion encéphalique dont il suit la marche:

Une jeune femme fut atteinte à la fois d'une paralysie du membre, supérieur droit, et d'une perte de la mémoire

des mots : la connaissance était intacte, mais la malade ne pouvait en aucune façon se rappeler le nom des choses, et la manifestation de ses idées était on ne peut pas plus difficile. Les jours suivants, le mouvement se rétablit peu à peu dans le bras droit, et j'en déduisis la conséquence que l'amnémonomie étant liée à la même lésion du cerveau à gauche que celle qui avait donné lieu à l'anervismie du membre supérieur droit, il devait arriver que la mémoire se rétablirait, puisqu'il en advenait ainsi du mouvement. C'est en effet, ce qui eut lieu, bien que d'une manière incomplète : la jeune femme, qui se désespérait de l'impossibilité où elle était de dire le nom des objets qui l'entouraient, parvint d'abord à les prononcer, alors qu'on les répétait plusieurs fois devant elle ; dès lors, je lui fis faire des exercices de parole ou plutôt de mémoire répétés tout le jour; et l'amélioration fut assez rapide; mais ce qui réussit le mieux, fut de lui faire voir un mot qui devint un signe suffisant pour la faire tout d'abord se ressouvenir du terme que ce nom signifiait.

Lorsque je perdis de vue cette jeune femme, le mouvement du bras et sa mémoire étaient en très-grande partie rétablis.

Les soins que les sœurs et les gens de service ont pris de cette femme, sont au-dessus de tout éloge.

 Défaut d'abord du sang vers le cerveau (hypocéphalémic, acéphalémic). Syncope, évanouissement.

Le cerveau et très-probablement le moelle vertébrale souffrent peut-être plus souvent par défaut que

#### 444 SYNCOPE; HYPOCÉPHALÉMIE

par excès de sang, et l'on n'a pas toujours tenu assez compte de ce fait capital. Pour peu que l'on éprouve des étourdissements ou des vertiges, on ne manque pas de se croire atteint d'une congestion cérébrale, et malheureusement trop de médecins partagent cette croyance. Or, il s'en faut bien que, dans une foule de cas, ils soient, à cet égard, dans le vrai; des symptômes analogues à ceux qui produisent la congestion sanguine, ou les premiers phénomènes d'une hémorrhagie encéphalique, se déclarent alors que le sang n'arrive plus au cerveau ou n'y parvient pas en proportion suffisante.

L'évanouissement ou syncope est l'expression extrême de ce défaut de sang, ou d'un arrêt de circulation dans la tête; ce même défaut de sang présente bien des degrés, dont les plus faibles sont marqués: par des étourdissements, des éblouissements, des tintements d'oreilles, etc., tandis que, dans les cas les mieux dessinés, ont lieu : la perte de connaissance, des vomissements et même des convulsions. J'ai publié, sur ce sujet, des travaux qui ont eu pour matériaux soit des expériences sur les animaux, soit des faits observés sur l'homme sain, soit des observations recueillies, pendant de longues années, dans les hôpitaux.

Il suffit de tenir, pendant quelque temps, la tête d'un animal qui a perdu beaucoup de sang élevée sur un plan supérieur aux autres parties du corps pour voir survenir les symptômes dont il vient d'être parlé, et ces phénomènes cessent de se manifester alors que l'on abaisse le cerveau. Il semble parfois, dans le premier cas, que

SYNCOPE SIMULANT LA MORT; RETOUR A LA VIE 445 l'animal soit mort, et qu'il ressucite dans le second. Les mêmes faits sont observés chez l'homme (1).

322. Cas remarquable de retour momentané à la vie chez un homme qui paraissait mort.

J'ai cité ailleurs le cas d'un courtier en diamants, M. Achard, qui, en 1825, avait été atteint par un coup de pied de cheval porté sur le ventre (2). Une hémorrhagie abdominale était survenue. On avait tenu le malade assis sur une chaise. Depuis cinq minutes il n'avait plus de connaissance; la respiration ne s'exécutait pas; les battements du cœur et du pouls étaient inappréciables; les assistants croyaient que ce malheureux n'existait plus. Je fis étendre le malade sur un plan horizontal, la tête étant placée un peu plus bas que le tronc. Un instant après, quelques soupirs eurent lieu, le cœur battit, la connaissance revint, des phrases trèslucides furent proférées; malgré mes exhortations et même malgré mes ordres, on souleva la tête de cet agonisant, qui, presque subitement, perdit alors connaissance et périt. Certes, si la tête fût restée élevée, l'attitude assise étant conservée, il n'y aurait pas eu cette sorte de résurrection dont il vient d'être parlé, et Achard eût été, dès lors, frappé d'une mort définitive (3),

<sup>(4)</sup> Mémoire sur les pertes de sang, sur la syncope et l'apoplexie. Procédé opératoire de la percussion, pages 208, nºs 351, 444, etc.; Traité de médecine pratique, n°s 11,814; 14,816, etc.

<sup>(2)</sup> Procédé opératoire, nº 404.

<sup>(3)</sup> On peut comparer ce retour momentané à la vie à ce qui a lieu chez certains animalcules desséchés, qui sont animés de mouvements alors que l'eau et la chaleur les pénètrent.

A46 SYNCOPE; HYPOCÉPHALÉMIE; TÊTE ABAISSÉE qui, plus tard, fut le résultat d'un défaut absolu de l'abord du sang dans les vaisseaux du cerveau, dù à ce que la faible proportion de ce liquide qui circulait encore ne pouvait, à cause de son peu de volume et de la faiblesse du cœur, surmonter l'influence de la pesanteur et être lancé dans l'encéphale.

#### Extrême utilité, dans la syncope, de tenir la tête plus ou moias abaissée.

Que de fois, depuis cette époque, soit en ville, soit à l'hôpital, dans l'agonie par défaut de sang et par faiblesse du cœur, ne suis-je pas parvenu, en tenant abaissée, ou de niveau avec le corps, la tête du moribond, à retarder de quelques minutes et même de quelques heures la terminaison fatale! Dans combien de cas, chez des femmes atteintes de pertes utérines, surtout à la suite de l'accouchement, ou chez des hommes qui avaient perdu beaucoup de sang, n'ai-je pas remédié ainsi aux éblouissements, aux vertiges, à la perte de connaissance, aux convulsions même, etc., qui étaient dus au défaut d'abord du sang vers le cerveau! Que de fois le moyen si simple dont il vient d'être parlé n'a-t-il pas contribué à conserver la vie des malades ou de nouvelles accouchées?

C'est donc une loi en thérapisme, et une loi absolue, que de maintenir de niveau avec le tronc et parfois abaissée, la tête des malades qui perdent ou qui viennent de perdre une grande proportion de liquide sanguin. Cette proposition est tout aussi applicable au cas

d'hypémie (peu de sang) survenue à la suite des pertes de liquides causées par la diarrhée, les sueurs, la nourriture insuffisante, l'abstinence, etc., que dans ceux où une hémorrhagie a fait un vide dans les vaisseaux. Telle jeune fille qui, dans une soirée, se trouve mal; telle femme enceinte chez laquelle le sang, se portant vers le produit de la conception, cesse d'être suffisamment dirigé vers la tête; tel malade exténué par un régime trop sévère qu'on lui a fait ridiculement tenir ; tels hommes qui se nourrissent mal ou ayant éprouvé des privations, sont atteints de vertiges, de tintement d'oreilles, de nausées, de tendance à l'évanouissement, etc., ne devront être soumis, pour ces accidents, à des moyens pharmaceutiques et surtout à des saignées, que si l'on a essayé d'abord de faire disparaître les symptômes dont il s'agit par une position convenable de la tête.

321. Moyen simple de distinguer la syncope de la congestion cérébrale et de l'apoplexie.

L'étude et la constatation des faits qui viennent d'être exposés m'ont conduit à trouver, dans la position de la tête par rapport au corps, un moyen physique précieux pour distinguer les cas de congestion ou d'hémorrhagie cérébrale de ceux où il s'agit du défaut d'abord du sang vers le cerveau (1).


Quand un malade, pâle ou non, mais qui ne présente

<sup>(4)</sup> Mémoire sur le diagnostic de la syncope et de l'apoplexie dans le procédé opératoire, nº 444.

pas cette coloration de la face, cette turgescence des vaisseaux, cette rougeur des capillaires, cette énergie du pouls de l'avant-bras et surtout du cœur, qui ne permettent pas de se méprendre sur le fait d'une congestion vers la tête; quand, dis-je, il arrive que ce malade est atteint d'éblouissement, de tintement d'oreilles, de vertiges suivis de nausées, de vomissements, de troubles dans l'intelligence, et même de mouvements convulsifs, il convient de faire placer, pendant quelques instants, la tête sur un plan situé plus bas ou au moins placé de niveau avec celui des autres parties du corps. S'il s'agit, chez cet individu, d'une absence de sang vers le cerveau, presque à l'instant même les accidents se dissipent.

\$25. Élévation du bras suivie de l'affaiblissement du pouls, faisant voir qu'un malade a peu de sang ou que les battements du cœur ont peu d'énergie.

Pour bien constater, sur un malade présumé atteint de congestion cérébrale, que la faiblesse de la circulation et les autres accidents sont dus au peu de sang contenu dans les vaisseaux, il suffit de palper l'artère de l'avant-bras dans diverses positions de celui-ci. S'il arrive qu'étant située horizontalement, cette artère ne donne pas une sensation de résistance; puis, si l'on élève le bras de telle sorte que la main soit placée plus haut que la tête, et si alors le pouls radial disparaît, on a ainsi la preuve que la circulation est très-languissante, que les vaisseaux sont presque vides, ou que



RAMOLLISSEMENT DU CERVEAU, CÉPHALOMALAXIE 449 l'action du cœur n'est pas assez énergique pour porter le sang jusqu'au cerveau. Cette remarque est applicable à beaucoup d'autres cas d'affections dans lesquelles le médecin, conservant des doutes sur les proportions de liquides contenus dans l'appareil circulatoire, ou sur la force des contractions cardiaques, veut dissiper toute incertitude à cet égard.

236. Moyens rationnels à employer dans le cas de ramollissement du cerveau, de la moelle (encéphalo ou myélomalaxie) et dans la paralysie générale.

Sous le nom de ramollissement du cerveau et des centres [nerveux, on a désigné des ces très-divers et qui se rapportent à des affections aiguës ou chroniques différentes les unes des autres. Parmi ces affections, il en est d'inflammatoires, et il n'entre pas dans mon plan d'en parler ici. D'autres, au contraire, sont très-lentes dans leur marche, et on les a souvent étudiées sous le nom de paralysie générale. Ces déplorables lésions sont presque toujours abandonnées à elles-mêmes, parce que les médecins les plus habiles savent bien que les excitants de la peau, les exutoires, les traitements pharmaceutiques, sont, dans de tels cas, entièrement dépourvus d'efficacité.

Les symptômes dont il s'agit, souvent en rapport avec une vieillesse anticipée (il est des gens qui sont vieux dans le jeune âge), d'autres fois consécutifs à des états pathologiques dont l'aliénation mentale est l'expression, consistent très-fréquemment en une véritable

#### 450 RAMOLLISSEMENT DU CERVEAU; TRAITEMENT

hypotrophie des éléments constituents du névraxe, et ils peuvent être heureusement ralentis dans leur marche funeste, ou combattus avantageusement par des moyens tirés de l'hygiène. Des faits assez nombreux ont démontré pour moi la réalité de cette proposition,

 Matière nerveuse donnée comme aliment aux malades atteints d'hypotrophic névraxique.

Quand un organe se nourrit mal, il diminue de volume; c'est ainsi que l'abstinence et l'alimentation insuffisante sont suivies d'hypotrophie. Quand les matériaux qui entrent dans la trame organique ne se trouvent pas en assez grande proportion dans le sang pour la nourrir, il faut bien qu'elle dépérisse; c'est d'après ces faits ou ces idées que l'on donne une nourriture abondante, et composée surtout de chairs saignantes. aux gens dont les muscles sont exténués. La fibrine, en effet, bien que modifiée par les organes digestifs, ne peut être inutile pour rétablir des gens atteints de marasme musculaire. D'un autre côté, il est incontestable, comme nous l'avons vu, que le phosphate de chaux est une substance très-propre à rendre aux os leur solidité, etc. Or, très-probablement, une nourriture principalement composée de matière nerveuse provenant du cerveau, de la moelle ou des nerss d'animaux, de laitance de poisson a quelque chance d'être utilement administrée dans le ramollissement de la trame névraxique. Ces aliments contiennent évidemment les mêmes principes organiques que ceux qui entrent dans la composition chimique des

CÉPHALOMALAXIE; ALIMENTS; SUBSTANCE NERVEUSE 481
parties névriques atrophiées. Or, s'il est vrai, comme
Dumas et Liebig l'ont admis, que la graisse et que les
huiles dont on fait usage comme nourriture fournissent
au moins une partie des substances adipeuses qui entrent dans la composition de l'homme et des animaux,
il y a tout lieu de penser qu'une alimentation formée
en grande partie de matière nerveuse peut mieux réparer le névrosystème hypotrophié que toute autre
espèce de nourriture.

Je ne pense pas, à coup sûr, que la matière nerveuse ingérée puisse aller de toute pièce réparer un encéphale profondément lésé dans sa structure intime, et que des vaisseaux, des fibres, des cellules, des tubes, détruits dans cet organe, puissent se reformer sous l'influence de matériaux nutritifs analogues à ceux qui, primitivement, avaient constitué la structure encéphalique; mais soit qu'il s'agisse de retarder l'émaciation successive des parties qui s'atrophient, soit que l'on cherche à arrêter ce mouvement d'exténuation, rien n'est plus raisonnable que de donner aux malades atteints de ramollissement chronique du névraxe, des aliments qui recèlent plus que d'autres les matières entrant normalement dans la composition de cet important organe.

Il faut que certains critiques plus que malveillants n'aient pas lu ou aient voulu oublier ces annotations pour avoir attaqué d'une façon qui leur a fait plus de tort qu'à moi-même, l'emploi de la matière nerveuse dans les cas de ramollissement du cerveau ou de la moelle;

#### 452 CÉPHALOMALAXIE; TRAITEMENT

ces gens-là qui, très-probablement ne craindraient pas de proposer un affreux poison: le phosphore, pour tonifier des gens affaiblis, ne savent donc pas que la matière cérébrale en contient sous une forme et à un tel état qu'il peut, sans aucun danger, être donné comme nourriture.

328. Régime, exercice, éducation dans la névraxo-malaxie ou ramollissement de l'axe nerveux.

Mais quand la matière nerveuse, donnée comme aliment, n'aurait pas une utilité en rapport avec sa trame organique et ses éléments spéciaux, elle en aurait au moins comme substance nutritive. C'est, en effet, au moyen d'un régime animal et réparateur, joint à un exercice proportionné aux forces et augmenté graduellement; c'est en cherchant journellement, par l'éducation, à rendre la volonté plus active au point de vue de son influence sur le mouvement musculaire et sur les fonctions intellectuelles, que l'on peut obtenir quelques succès dans les cas d'encéphalo ou de myélo-malaxie (ramollissement du cerveau ou de la moelle). Des douches et des courants électriques, dirigés vers les nerfs et les muscles des membres affaiblis, peuvent aussi concourir à améliorer la position des malades atteints de paralysie générale. Les propositions que je viens d'émettre ne sont pas des théories gratuites : elles ont été consacrées, dans ma pratique, par les heureux résultats que j'ai obtenus, chez quelques malades, d'une médication analogue à celle qui vient d'être exposée.

 Troubles dans l'exercice de l'intelligence (dyspsychismieanomopsychismie). Délire, folie ou aliénation mentale.

A Dieu ne plaise que je veuille agiter dans cet ouvrage la grande question philosophique relative à l'âme et à ses rapports dans l'encéphale.

Que le principe qui nous anime et auquel convient si bien le mot psychatome, soit, comme je l'admets (1), le point de départ de toute organisation, que l'on suppose au contraire que les facultés intellectuelles soient les résultats d'une action primitive de l'organisme, du système nerveux et de la matière (ce qui me paraît inacceptable), toujours est-il qu'il faut bien convenir que le cerveau est tellement lié à la manifestation de la pensée que les plus légères lésions dont il est atteint sont suivies de modifications considérables dans l'intelligence. C'est ce que l'étude du délire et de l'aliénation mentale ne permet pas de mettre en doute.

Il est fort difficile de distinguer le délire de l'atiénation mentale, qui n'est en définitive qu'un délire prolongé (2).

On a voulu assigner pour caractère au délire d'être accompagné de sièvre, ainsi qu'il en arrive dans les affections dites sièvre typhoïde, variole, etc; mais on

<sup>(1)</sup> Dieu, l'ôme et la nature, poème par M. Piorry, 1856. Une seconde édition de cet ouvrage paraîtra en 1868. Elle sera précèdée d'études philosophiques, et suivie de quelques autres productions littéraires.

<sup>(2)</sup> Mémoire sur le délire lu à l'Açadémie de médecine, par M. Piorry, sur la folie et le délire.

a oublié alors que l'altération du sang que causent l'alcool, l'opium, le haschich, la jusquiame, etc., donnent
lieu à un trouble intellectuel dit délire, sans qu'aucun
phénomène fébrile se manifeste, et qu'il en arrive ainsi
pour les aberrations d'idées qui parfois ont lieu à la
suite: soit du défaut de sang, de l'abstinence, de l'asphyxie incomplète ou hypoyémie; soit de l'empoisonnement du sang par les gaz du charbon en combustion;
soit des impressions morales et des passions portées à
un degré extrême.

Ce n'est pas davantage le défaut de lésions anatomiques qui différencie l'aliénation mentale du délire; car, des deux côtés, tantôt on peut constater l'existence de modifications organiques, et tantôt on est inhabile à prouver matériellement leur présence. Cette dernière proposition, dont on ne peut révoquer en doute l'exactitude, n'implique en rien l'idée que de telles lésions font réellement défaut; la raison veut même qu'elles existent dans le cas où l'on ne les rencontre pas. D'ailleurs, depuis que le microscope a permis de mieux étudier l'encéphale, il y a fait trouver des altérations de structure dans certains cas où, jusqu'alors, on n'avait constaté aucune modification morbide dans la trame de l'axe nerveux ou névraxe.

L'aliénation mentale, en définitive, n'est donc, encore une fois, qu'un délire prolongé, et ne peut guère en être séparée par des caractères tranchés. Ce qui va suivre est en très-grande partie applicable à l'un et à l'autre de ces états de l'intelligence.  Les médicaments ne remédient pas directement au délire ou à la folie.

Ce n'est pas par des médicaments que l'on remédie directement au délire, et il n'y a pas d'agent spécial par lequel on puisse utilement le combattre; mais, comme certaines substances, portées par le sang vers l'encéphale, agissent à la facon des poisons et troublent ainsi l'intelligence, il se peut faire qu'en rejetant ces poisons au dehors, en modifiant leur composition, en les décomposant, en détruisant ainsi la cause matérielle qui, blessant le cerveau, amène le délire, on fasse cesser celui-ci. C'est dans cette intention, sans doute, que beaucoup de médecins ont recours, dans le narcotisme causé par l'opium, la belladone, le datura, le hacshich, etc., à divers agents dont les effets thérapiques, dans de tels cas, ne sont pas bien démontres. Souvent le succès dont leur emploi est suivi peut être rapporté à l'eau qui leur sert de véhicule.

Cette eau, en effet, pénetrant dans la circulation, entraîne hors de la trame encéphalique, l'agent toxique qui la modifiait d'une manière funeste. C'est donc encore dans ce genre d'empoisonnement, comme dans ceux dont les autres organes sont le siège, à un moyen bien simple, je veux dire à l'administration de l'eau en abondance donnée en boisson, en injections, en bains, en vapeur, qu'il convient surtout d'avoir recours.

456 ALCOCÉPHALIE; DÉLIRE DE L'IVRESSE; AMMONIAQUE

331. Utilité de l'ammoniaque dans le délire de l'ivresse et dans le delirium tremens.

Les réflexions qui précèdent et qui sont relatives à la destruction ou à la modification de la cause matérielle du mal, sont en partie applicables au délire de l'ivresse (état aigu) et à cette aliénation mentale avec tremblement musculaire qui a recu l'absurde nom de delirium tremens (état chronique). L'agent chimique qui produit ces deux séries de phénomènes n'est autre que l'alcool, et l'action toxique de celui-ci sur l'encéphale est combattue avec succès par l'ammoniaque, administrée à la dose de 10 à 20 gouttes dans une verrée d'eau, ou par l'acétate d'ammoniaque donnée dans les proportions d'un gramme dans le même véhicule. C'est une chose remarquable que de voir la promptitude avec laquelle se dissipe l'ivresse (alcocéphalie) alors que l'on a fait prendre au misérable qui en est atteint, le médicament dont il s'agit, médicament dont il est bon de renouveler la dose à quelques minutes de distance.

J'ai réussi, par ce moyen inoffensif, et d'une manière vraiment remarquable, dans plusieurs cas de délire chronique avec ou sans troubles de locomotion, et qui me paraissaient dus à l'action de l'alcool.

332. Cas d'encéphalie alcoolique guérie promptement par l'ammoniaque.

La première fois que j'obtins un résultat aussi heureux fut celui du baron de X..., qui me fut recommandé par le prince de la M. X.... était, depuis huit jours, dans un état comateux ou dans un délire furieux; ses membres se livraient à des mouvements désordonnés. On le croyait atteint d'une méningo-encéphalite, et d'abord mon opinion ne différa pas de celle des autres médecins; mais ayant eu connaissance des excès d'alcool auxquels le malade se livrait habituellement, je proposai l'emploi d'une boisson avec addition d'ammoniaque, et ce conseil fut suivi. Quelques heures après, le délire ou plutôt l'aliénation mentale et le tremblement musculaire avaient complétement cessé pour ne plus reparaître.

Depuis lors, à l'hôpital ou dans ma pratique particulière, j'ai eu recours, dans un très-grand nombre de cas analogues, au même traitement, et des succès rapidement obtenus en ont été la suite. Espérons que le temps et l'expérimentation feront découvrir des agents d'une utilité semblable pour remédier aux accidents cérébraux causés par les autres poisons narcotiques.

On a proposé de guérir l'empoisonnement par un narcotique au moyen d'une intoxication avec un autre narcotique : c'est là une de ces idées bizarres que la clinique ne consacre pas.

333. C'est la cause physiologique et la lésion anatomique que, dans le délire, il faut avant tout combattre.

Pour remédier à la plupart des aberrations morbides de l'esprit, qu'elles soient aiguës ou qu'elles soient chroniques, c'est, d'une part, la cause qui les a pro458 DÉLIRE; REMÉDIER A SES CAUSES PRODUCTRICES duites et les entretient, et, de l'autre, la lésion organique qui leur donne lieu, qu'il s'agit de faire cesser ou de détruire.

334. Agents toxiques causant le délire. Traitement dans de tels cas.

Le délire, dans les maladies aiguës, est souvent le résultat de l'action d'un agent toxique qui blesse le cerveau. Il en est ainsi dans la variole, dans la rougeole, etc. On ne connaît aucun contre-poison des virus ou des agents animés qui causent ces maladies; en conséquence, il n'y a ici aucun conseil à donner autre que ceux qui ont trait à la curation du délire produit par les narcotiques (page 455).

Les phénomènes cérébraux qui se manifestent dans les affections dites typhoïdes, sont, en général, les résultats de l'action de l'agent septique (septiose). Or, la rénovation de l'air, les boissons abondantes, peut-être les inspirations d'iode ou de chlore, sont alors les médications les plus indiquées, et ce sont encore là des moyens presque hygiéniques.

Quand le foyer des matières putrides qui empoisonnent le sang et, par suite, font délirer, est dans l'intestin ulcéré et rempli de matières fécales, évidemment il faut, par des purgatifs et des irrigations anales, faire évacuer ces matières.

L'abstinence prescrite par le médecin ou exigée par les symptômes, et à laquelle les malades atteints de ces affections sont souvent soumis, le défaut de sang (hypémie), qui rend la circulation encéphalique peu active, Les causes morales, c'est-à-dire les sensations, les impressions, les passions, les événements de diverses sortes qui viennent à frapper l'intelligence, peuvent produire des délires momentanés ou l'aliénation mentale. Il est évident ici que le principal moyen thérapique est de soustraire le malade à l'action de ces causes puissantes. De là l'extrême avantage, dans beaucoup de cas, de l'isolement et même de la séquestration. Je ne puis insister sur les détails que comporterait ce sujet; mais il n'est pas douteux que les médicaments ne soient ici que des moyens très-accessoires, et que l'éloignement des circonstances sous l'empire desquelles le mal s'est déclaré est, dans des cas semblables, la précaution la plus utile à prendre

335, Délire ou folie dont les causes matérielles existent dans le cerveau et dans les autres parties de l'axe nerveux.

Le délire ou l'aliénation mentale sont, dans bien des cas, les résultats d'une cause matérielle appréciable qui tantôt existe dans l'encéphale lui-même, tantôt dans les organes autres que le névraxe. C'est ainsi qu'à la suite des inflammations des membranes du cerveau, surtout

460 DELIRE; FOLIE; CAUSES ANATOMIQUES APPRÉCIABLES alors que le mal a son siège vers la voûte du crâne, survient un trouble aigu des facultés intellectuelles. trouble qui s'élève quelquesois jusqu'à la fureur, et qui rend le malade si déraisonnable, qu'il se précipite par la fenétre, veut se pendre, cherche à assassiner ses gardiens ou même ceux que d'ordinaire il aime le plus. De tels cas exigent évidemment un traitement énergique, dont l'exposé ne rentre pas dans le cadre de cet ouvrage, et ce traitement se compose : 1º de celui qui remédie aux causes de l'inflammation cérébrale: 2º de celui qui convient contre cette phlegmasie elle-même. On n'a que trop souvent, dans les hôpitaux, l'occasion de constater, sur les cadavres, les causes matérielles d'un tel délire, et la médecine fondée sur la diagnose parvient quelquesois à les reconnaître pendant la vie-

A l'état chronique, on voit des aliénations mentales être la conséquence de troubles circulatoires à marche lente (stases sanguines, congestions, etc.), d'épaississements, de couches plastiques développées dans les membranes du cerveau, de ramollissements superficiels entourant ou non des kystes hémorrhagiques, de dégénérescence ou de tumeurs variées dont cet organe est le siège. Dans ces cas malheureux, les moyens simples, autres que ceux qui ont été indiqués (page 432) et qui ont trait à la position du malade, réussissent peu. Toutefois, une alimentation réparatrice, principalement composée de viandes, de gelées, et surtout de substance nerveuse, l'albumine de l'œuf (qui entre en si grande proportion dans la composition du névraxe), m'ont paru

avoir, dans le ramollissement encéphalique causant la démence, une efficacité réelle. J'ai pu même, par des exercices gymnastiques, en faisant marcher par des pas de plus en plus grands, améliorer le mouvement. J'ai même rendu, à la langue un peu d'energie alors que des aliénés paralytiques, d'après mes conseils, avaient, pendant un certain temps, inutilement cherché à exercer cet organe.

 Aliénations mentales causées par des lésions autres que celles du cerveau.

Des lésions de parties autres que le cerveau donnent quelquefois lieu au délire ou à l'aliénation mentale. L'explication de semblables faits est loin d'être facile et doit varier suivant la partie affectée et l'espèce d'altération organique qui sont les points de départ des accidents.

337. Troubles de la vue et de l'ouïe suivis de délire.

A la suite de modifications variées survenues dans l'état physique de l'oreille, se déclare fréquemment un tintouin, un bourdonnement, qui, pendant le sommeil, provoquent des rèves pénibles, et, pendant la veille même, si de telles sensations se prolongent, sont suivis d'hallucinations. Or, ces rèves, ces hallucinations, comme celles dont les troubles de la vue sont parfois les causes physiologiques, sont, chez les gens prédisposés, et surtout chez les personnes faibles d'esprit et impressionnables, des causes réelles de délire. Les

#### A62 DÉLIRE; POLIE DES PENMES EN COUCHE

aliénés de ce genre sont d'autant plus enclins à déraisonner que les tintements d'oreille, les altérations de la vue qui persistent, leur font croire à la réalité des faits que leur imagination leur fait supposer exister. Dans de tels cas, c'est donc par des sensations dues à des causes anatomiques que l'aliénation mentale se déclare et persévère. Il est évident que, dans ces mêmes cas, pour guérir la folie, ce sont les troubles organiques et physiologiques qui causent le mal qu'il s'agit surtout de faire cesser.

# 338. Délire pendant la fièvre de lait.

Ailleurs, une femme délire à la suite de la fièvre de lait et des modifications matérielles qui surviennent soit dans la glande mammaire, soit dans la composition du sang par la présence de quelques principes du lait, soit encore dans la trame organique des ovaires ou de l'utérus. Ce qu'il convient de faire ici, c'est de remédier, autant que possible, à l'état des parties dont la structure et les fonctions sont altérées; c'est encore d'avoir habituellement recours à quelques purgatifs doux et inoffensifs, à l'effet de combattre sa galactémie (page 169), que l'on pourrait supposer être la cause primitive de l'encéphalie; mais ce qui réussit le mieux. c'est, il faut l'avouer, d'attendre avec patience (en préservant les malades contre les accidents auxquels expose le délire de la flèvre de lait) que les organes mammaires et génitaux reviennent peu à peu à leur état normal.

339. Délire ou folie, suites d'affections intestinales.

Esquirol avait pense qu'un déplacement de l'intestin dit colon transverse, pouvait causer la manie. L'observation ultérieure n'a pas vérifié cette assertion; mais ce qui est plus positif, c'est que la présence habituelle des matières dans la dernière portion du tube digestif dispose aux idées tristes, et qu'il est de règle pratique d'avoirs recours, chez les aliénés, à des évacuants et à des lavements purgatifs, ce qui contribue à les soulager et à les guérir.

340. Délire ou folie, suites de maladies de la rate et des fièvres intermittentes.

On voit souvent survenir, lors des fièvres intermittentes, un délire aigu, porté, parfois, jusqu'à la manie. Dans les affections chroniques de la rate, la raison est dans certains cas, altérée; ici, c'est presque toujours d'une façon périodique que l'aliénation mentale se manifeste par accès. Dans l'un et l'autre cas, c'est évidemment à cette même rate qu'il faut rapporter la cause organique du trouble de l'esprit. J'ai plusieurs fois remédié, d'une manière presque subite, à la folie, en administrant aux malades 1 gramme de sulfate de quinine dissous dans 30 grammes d'eau acidulée avec 4 gouttes d'acide sulfurique. C'est qu'alors j'avais constaté, chez ces aliénés, une augmentation plus ou moins considérable dans le volume de la rate (splénomégalie). J'ai longtemps eu sous les yeux un jeune malade

464 DÉLIRE; FOLIE; SUITES D'HYSTÉRIE OU D'ÉPILEPSIE de Puerto-Ricco, qui dans la maison de mon confrère et ami M. le docteur Rota, rue de Picpus, n° 90, fut guéri en très-peu de jours, par le sulfate de quinine, d'une manie périodique survenue à la suite de flèvres d'accès contractées en Amérique. La rate, volumineuse, reprit son état normal.

Parmi les cas de ce genre, je citerai surtout celui qui se rapporte à l'un de mes élèves et confrères, devenu depuis l'un de mes meilleurs amis, et qui, depuis un mois, délirant toutes les nuits, d'une manière très-violente, présentait une rate de 9 centimètres. Je le soignai dans la maison de M. Pinel neveu, alors à Chaillot. Le malade fut rendu à la santé vingt-quatre heures après le jour où, sous l'influence du sulfate de quinine, cet organe avait repris son état normal. M. le docteur X..., depuis quinze ans, jouit de la meilleure santé physique et morale, et habite une ville voisine de Paris, etc.

Dans mon opinion, il arrive; dans des cas de ce genre, qu'il se porte de la rate vers le cerveau une oscillation nerveuse (névropallie) analogue à celle qui constitue le frisson fébrile, et que cette oscillation parvenue aux organes des sens et à l'encéphale, cause ainsi le délire, qui disparaît quand l'organe splénique cesse d'être malade.

341. Délire et folie, suites d'attaques d'épilepsie et d'hystèrie.

C'est de cette façon encore que, dans le mal dit épilepsie, le point de départ des accès véritables est évidemment la rétine ou membrane interne de l'œil, et bientôt survient le délire. Ces accidents paraissent résulter d'une névropallie (oscillation nerveuse) partant de ce même point et s'étendant par le nerf optique vers la base du cerveau aux tubercules quadrijumeaux et à la moelle allongée. On voit alors survenir, par l'extension de cet état morbide aux autres parties de l'encêphale, un assoupissement, puis un trouble de la raison, qui, plus tard, persiste et est suivi d'une alienation mentale. Des faits du même genre ont encore lieu dans l'hystérie, avec cette différence que la névropallie primitive part ici de l'angiove (appareil génital) pour de là se porter vers l'encéphale. Bientôt je vais encore dire quelques mots sur les névropallies. Ce qu'il importe d'établir actuellement, c'est que, pour remédier à des aliénations mentales de cette sorte, il faut commencer par prévenir, ou du moins par éloigner les attaques épileptiques ou hystériques. Voici deux faits remarquables à l'appui de cette proposition.

342. Guérison momentanée d'une aliénation mentale obtenue par l'éloignement et par la palliation d'attaques d'épilepsie.

Un jeune artiste du Conservatoire, qui avait sur le violon un remarquable talent et dont l'intelligence était du reste assez peu développée, éprouva des attaques d'épilepsie commençant par un éblouissement, un vertige, dus à une névropallie névrommique, c'est-à-dire à des oscilliations de la rétine et du nerf optique. Elles étaient caractérisées par un regard fixe, une chute

POLIE SUITE D'ATTAQUES D'ÉPILEPSIE RÉPÉTÉES précédée d'un cri, la perte de connaissance, les convulsions, l'écume à la bouche, la morsure de la langue, le coma, l'oubli complet de ce qui avait eu lieu pendant l'accès, et bientôt par le délire. Le mal revenait d'abord à des distances assez éloignées, et l'altération de la raison persistait peu; après un certain temps, les attaques se rapprochèrent, et d'une telle façon, que tous les deux jours un nouvel accès survenait; chacun d'eux durait dans son ensemble plus d'une heure, et parfois il y en avait deux par jour; alors le trouble de la raison persista entre chaque attaque, et le malade devint complétement aliéné et parfois furieux. Ayant remarqué que les accès se reproduisaient presque constamment aux mêmes heures et d'une façon périodique (je ne tenais pas assez de compte à cette époque du volume de la rate pour l'examiner), j'administrai en une seule fois, un gramme de sulfate de quinine dissous dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique, et, chaque jour, pendant plusieurs semaines, ce médicament fut administré. En même temps, je sis éviter tout travail des yeux. Presque immédiatement les attaques s'éloignèrent, et bientôt, elles ne se reproduisirent plus que tous les huit ou quinze jours; alors le délire cessa, l'intelligence redevint très-lucide, et pendant plusieurs semaines il en fut ainsi; mais les accès ne tardèrent pas à se rapprocher de nouveau, et alors les délires qui suivaient chacun d'eux se continuèrent jusqu'à l'attaque suivante. Le mal, ne cédant en rien à diverses médications, l'aliénation mentale reparut avec persistance,

FOLIE SUITE DE LÉSIONS ORGANIQUES lut placer le malheureux artiste dans une

et il fallut placer le malheureux artiste dans une maison consacrée au traitement de la folie.

Chez une femme en démence (hypopsychismie), atteinte d'attaques d'hystérie épileptiforme des auteurs, j'obtins, il y a bien des années, des résultats analogues. Sous l'influence de l'éloignement des accès, la raison se rétablit presque complétement; mais lorsque, depuis un mois, elle était dans le meilleur état, une entrevue avec son mari ramena le retour des attaques et la perte à tout jamais de la raison.

#### 343. États organopathiques du cerveau troublant la raison.

On naît sans doute avec des prédispositions à la folie; tel ou tel état anatomique, telle ou telle modification de structure, de volume, de forme, survenus dans l'encéphale, etc., influent considérablement, ainsi que Gall et les physiologistes modernes l'ont démontré, sur les inclinations, les goûts, les aptitudes, le caractère, etc., de l'homme et des animaux (1).

L'expérience journalière prouve la vérité de ces propositions; et quand la présence de l'alcool, du hachich, de l'opium dans le sang, agissantsur le cerveau ou sur telle partie de l'encéphale, modifient avec tant de force les déterminations instinctives, intellectuelles et affectives; quand une hémorrhagie, des ramollissements encéphaliques ou des altérations organiques qui les

<sup>(4)</sup> J'ai cherché à démontrer ailleurs que les animaux sont, en effet, sujets aux mêmes passions que les hommes. Voyez mon poême sur Dieu, l'âme et la nature.

suivent, lésions dont l'étendue est très-peu considérable, émoussent la sensibilité, ôtent l'énergie, rendent pleureur ou irascible, détruisent la mémoire, annihilent la volonté, etc., il est impossible de mettre en doute que les changements matériels survenus dans le cerveau puissent porter une atteinte énorme aux facultés intellectuelles, et partant à la raison.

#### 344. Certaines impressions morales agissent avec force sur les aliénés et sur les gens en délire.

D'un autre côté, la clinique prouve aussi que, sous l'influence de causes morales, telles qu'un discours fortement accentué, des représentations faites ou des ordres donnés avec autorité, on agit sur les gens qui déraisonnent, et cela soit à l'état aigu (délire), soit à l'état chronique (folie). Il faut donc en conclure que l'on peut agir utilement sur les aliénés en s'adressant directement à l'intelligence, ce qui ne peut se faire sans la médiation des organes des sens. Que de fois, en effet, ne m'est-il pas arrivé, au grand étonnement des élèves, de faire cesser brusquement le délire de fébricitants, délire que rien, depuis bien des heures, n'avait pu calmer, en leur parlant à voix très-haute et en leur donnant avec autorité l'ordre de se taire!

Je n'agissais pas autrement, et je ne réusissais pas moins, ainsi que cela m'est arrivé bien des fois dans des réunions ou des rassemblements qui se livraient à des emportements ou à des passions violentes. L'influence d'un homme à volonté énergique, exercée sur des

individus ou sur des masses, est grande et prouve, à n'en pas douter, que, dans la curation des troubles de l'esprit, il faut largement tenir compte de l'action exercée par la parole et par l'autorité de la raison sur l'intelligence de l'aliéné.

345. Ce n'est pas en général par les médicaments que l'on peut combattre le dèlire et l'aliénation mentale (p. 455).

Les considérations et les inductions pratiques précédentes ont dirigé, depuis longtemps, la conduite des médecins aliénistes dans la curation de la folie. En vérité, on ne peut guère compter sur les médicaments alors qu'il s'agit de ramener un fou à la raison. Les purgatifs exercent sans doute, par l'évacuation des matières (car la constipation dispose à la tristesse), une influence heureuse sur la disposition de l'esprit ; mais c'est peut-être plutôt en enlevant une cause de malaise que par une autre action que ces substances ont de l'utilité. L'ellébore, fût-ce celui d'Anticyre, célébré par les poëtes anciens, a été abandonné, et il en a été ains' de beaucoup d'autres drastiques. Les prétendus antispasmodiques, les narcotiques, n'ont qu'une efficacité temporaire; bientôt rejetés au dehors par l'urine, ces remèdes n'ont qu'une bien faible influence sur le délire et la folie (1).

Je ne pense pas qu'un médecin de notre temps, mal-

<sup>(4)</sup> Voyez mon Mémoire sur le délire et la folie, lu à l'Académis impériale de médecine et publié dans son Bulletin.

gré les excentricités de tant de gens, propose un spécifique contre l'aliénation mentale. D'ailleurs, j'ai établi avec beaucoup de soin, dans mon Traité de médecine pratique, t. VIII, numéros 12,321 et 12,386, la pathologie et le thérapisme des troubles de l'intelligence, si variés et si nombreux, auxquels on a donné le nom de folie ou allénation mentale; et je me garderai bien d'entrer ici dans de plus grands détails sur ces importants sujets.

846. Influence d'une bonne éducation pour prévenir l'aliénation mentale.

Je ferai soulement encore une remarque relative à l'influence très-grande que peut avoir l'éducation soit sur le développement de la folie, soit sur sa guérison.

Tels parents qui cèdent au caprice de leurs enfants, qui ne savent pas y résister, qui les adulent sans mesure, qui flattent leurs petites passions, etc., ne savent pas ce que leur faiblesse ménage à ces jeunes êtres et à eux-mêmes de chagrins pour l'avanir! Ils ne voient pas que ces petites colères dont ils rient deviendront plus tard des accès de fureur; que les désirs impérieux, à trois ens, seront, à vingt et un, de la tyrannie; que ce petit espiègle, qui accapare pour lui seul le gâteau ou le joujou qu'on lui donne; sera, à trente ans, égoïste, ingrat, avare et oublieux de ses parents; ils ne savent pas que, s'il existe la moindre prédisposition facheuse, que si les événements secondent celle-ci, ces enfants,

enfants mal élevés devenant aliénés de la pire devenus des hommes, seront des aliénés de la pire espèce, ou, au moins, que leur détestable caractère fera le malheur de tous ceux qui auront des rapports habituels avec eux. Ces petits défauts du très-jeune âge grandiront avec les organes et feront avec le temps, si l'on n'y remédie, de mauvaises passions ou de déplorables vices.

347. Moyens à employer contre l'allénation mentale dont on ne connaît pas la cause organique.

C'est à l'hygiène bien entendue, c'est à la philosophie qu'il faut demander les moyens de rémédier à l'aliènation mentale qui n'est pas causée et entretenue par les causes organiques appréciables. Le plan de cet ouvrage ne comporte pas les détails qu'exige ce grave sujet.

348. Névrose, épilepsie, hystérie, tétanos, rage, etc.

Est-il quelques moyens simples, quelques médications hygiéniques par lesquels on puisse combattre, prévenir ou pallier certaines affections, en très-grande partie encéphaliques ou myéliques, auxquelles on a donné le nom de névroses, telles que l'épilepsie, l'hystèrie, le tétanos et la rage? Pour résoudre cette question, il est indispensable de remonter à la théorie ou pathogénie des phénomènes névriques dont il s'agit.

On a appelé névroses des troubles de sensations, de mouvements, d'intelligence, qui se manifestent pen-

## 472 LES NÉVROSES SONT DE NATURE ORGANIQUE

dant la vie, sans que l'on ait pu constater de lésions cadavériques qui soient assez constantes pour expliquer la production et la succession de ces accidents. Je viens de me servir du mot cadavérique, et non pas de l'adjectif anatomique, parce que, si la mort n'a pas permis de reconnaître dans ces cas des altérations de structure, au moins pendant la vie il a été souvent facile d'en déterminer la présence, et que l'analyse et l'interprétation des symptômes de ces affections complexes conduisent à les faire admettre comme positives.

De ce qu'une lésion, une modification dans les tissus ne persiste pas; de ce qu'elle est passagère, momentanée, elle n'en est pas moins matérielle et organique; car les vibrations moléculaires qui donnent lieu, soit au son, soit au frémissement électrique, soit à la lumière, bien qu'étant seulement temporaires, sont à coup sûr des phénomènes physiques et essentiellement matériels.

 Idée du névrisme, du névropallisme et des oscillations physiologiques.

Or, des recherches extrêmement nombreuses et des plus variées, des observations multipliées recueillies pendant trente ans, m'ont conduit à penser que l'action nerveuse qui constitue la vie, le névrisme pour les organiciens, le biosisme pour les vitalistes, consiste dans une série, une succession d'oscillations qui, parties soit du névraxe, soit de la périphérie, se propagent par les

LA VIE; LE NÉVROPALLISME; ACTION DU PSYCHATOME 473 nerfs, en portant, dans le premier cas, vers les muscles l'influence motrice, et, dans le second, l'action sensitive; tandis que, dans le centre nerveux, ce même névrisme, mis en jeu par l'agent vital (psychatome), y donne lieu à l'instinct, à l'intelligence, à la mémoire, etc. Ces mêmes vibrations, bornées aux ganglions et aux nerfs qui leur correspondent, constituent, dans l'hypothèse précèdente, l'influence exercée par ces parties sur les organes nutritifs.

Ce n'est pas ici de la supposition de Reil, dans laquelle il comparait les nerfs à des cordes tendues et vibrantes, qu'il s'agit; mais d'une oscillation dont les tissus les plus mous peuvent être le siège, car l'eau, lorsqu'elle reçoit une impulsion, s'agite en ondes successives et vibrantes.

 L'hypothèse du névropallisme concorde avec celles qui sont relatives aux vibrations des corps inpondérables.

L'oscillation nerveuse physiologique serait donc la vie, comme la vibration de la matière dans l'univers serait le mens agitat molem de Virgile. J'aurai d'ailleurs, je l'espère, l'occasion de développer plus au long cette pensée, et certes ce n'est pas ici le lieu de le faire; je ne parle ici de ces idées que pour exposer ma théorie relative aux névropallies, qui, suivant moi, donnent les seules explications possibles de l'action réflexe, des affections dites névroses, théorie qui permet de s'élever jusqu'à leur thérapeutique rationnelle.

#### 171 LES NÉVROSES SONT DUES A DES NÉVROPALLIES

#### 354. Théoric des névropallies.

Le névropallisme étant supposé être l'action vitale elle-même (1), le biosisme, les névropallies sont, dans mon opinion, des modifications pathologiques survenues dans les vibrations nerveuses, vibrations qui, comme il a été dit, se propagent : dans les nerfs du sentiment, de la périphèrie vers le névraxe; dans les nerfs du mouvement, du centre vers la périphèrie, et qui parcourent, dans les directions variées, les nerfs, les plexus et les ganglions nerveux nutritifs. Ces oscillations, dans une foule de cas, passent des filets du grand sympathique dans les rameaux sensitifs et moteurs; ailleurs leur direction est parfois opposée.

332. Les névroses sont des névropallies extensives ou prosasiques qui souvent s'étendent à queique pertian de l'axe nerveux, et deviennent alors des névraxepallies.

Ces névroses, ou du moins la plupart d'entre elles, consistent, d'après ce qui vient d'être exposé, dans des névropallies extensives (prosasiques) qui peuvent avoir pour point initial:

(4) Le tintouis que l'oreille fait entendre, l'are bleuàtre et oscillant que l'on voit dans la migraine ophthalmique, la crampe survenant dans les musoles, la sensation de frémissement qui résulte de la compression du narf cubital au coude, l'engourdissement qui aurvient aux membres placés dans une position incommode, les sensations d'oscillation que détermine un courant électrique par induction, etc. 2 donnet une idée juste de l'action vibratile à laquelle j'ai donné le nom de névropallisme pour désigner l'état normal, et de névropallise pour exprimer l'état pathologique.

LES NÉVROSES DUES A DES NÉVROPALLIES; THÉORIE 475

1º Les extrémités périphériques des nerfs encéphaliques, myéliques ou ganglionnaires; et c'est de cette façon que s'expliquent: les auras, c'est-à-dire ces sensations, ces mouvements, ces troubles fonctionnels qui précèdent de quelques secondes, de quelques minutes, de quelques heures l'épilepsie, l'hystérie, etc., et que l'on se rend compte de la progression du mal qui, dans le tétanos et la rage, a lieu depuis la blessure du pied ou la morsure faite par un chien enragé, jusqu'au névraxe lui-même.

2º Les centres névriques, comme cela arrive : soit pour les attaques d'épilepsie (sans aura) qui semblent provenir des tubercules quadrijumeaux ou des nerfs optiques ; soit pour les mouvements convulsifs et involontaires qui, consécutivement à l'affection encéphalique ou myélique, se déclarent dans les muscles.

3º La continuité d'un nerf, ce qui est beaucoup plus rare.

Si la névropallie persiste dans le cerveau, elle y cause le délire, la folie, etc., et si elle est portée dans l'encéphale, la moelle ou les nerfs, à ce point qu'elle diminue ou suspende le névropallisme (vibration nerveuse physiologique), il en résultera des paralysies, qui cesseront lorsque la névropallie s'arrêtera ou sera transportée ailleurs.

Telle est la théorie très-simple et tout à fait rationnelle des névropallies et des névroses, et voici quel ques-unes des applications thérapiques très-utiles auxquelles elle conduit,

# 476 MOYENS DE PRÉVENIR LES ACCÈS NÉVROPALLIQUES

333. Moyens simples et hygiéniques applicables à la curation des né-

Toutes les fois qu'il est possible de reconnaître le point initial d'une névropallie extensive ou prosasique: soit qu'il s'agisse de l'épilepsie, qui commence dans diverses régions du corps et qui, prenant alors le nom d'aura, s'étend ensuite à la membrane nerveuse de l'œil ou nerf optique et aux tubercules quadrijumeaux. ou de l'hystèrie, qui a pour point de départ l'appareil ovarique (angiove), y compris la portion du névro-système qui y est affectée; soit encere du tétanos ou de la rage, dans lesquelles des blessures ou des nerfs empoisonnés par le virus rabique (sialocyniose) sont les points de départ de l'oscillation morbide se propageant par divers filets névriques à la moelle rachidienne ou vers la tête et le pharynx; toujours estil que les moyens les plus propres à prévenir les accès, et par conséquent à guérir le mal, doivent principalement agir sur les parties où commence la névropallie.

#### 254. Moyens d'arrêter les névropallies, les auras, à leur point initial.

Il est certains cas où il est possible d'agir avec un avantage réel sur le point initial de ces névropallies : 1° en évitant les causes dites hygiéniques qui peuvent agir sur lui (et dans l'hystérie, c'est là le principal moyen curatif); 2° en le modifiant, en le narcotisant par divers agents thérapiques (et l'on parvient quelquefois, en

ÉPILEPSIE; HYSTÉRIE; THÉRAPISME

477

agissant de cette façon, à être utile dans l'épilepsie); 3° en le détruisant par l'instrument tranchant, par les caustiques ou le fer rouge, et une telle méthode curative conviendrait peut-être contre la rage, et pourrait peut-être heureusement être appliquée contre le tétanos. Je n'ai à parler ici que de quelques médications hygiéniques dont j'ai tiré parti.

355. Cas remarquables d'épilepsie et d'hystèrie dans lesquels la gué rison a pu être obtenue).

J'ai été, dans deux cas, assez heureux pour prévenir des accès ultérieurs d'épilepsie, en faisant porter par des malades chez lesquels la névropallie partait de l'œil, des lunettes appropriées à l'état maladif de celui-ci. Ailleurs, j'ai réussi à éloigner des attaques analogues, en remédiant à l'état de la rate augmentée de volume, et qui paraissait être le point de départ d'accès analogues. Dans un cas de tétanos succédant à une fièvre tierce présentant des redoublements chaque matin, la lésion splénique était évidente (9 centimètres de dimension verticale); j'ai administré la quinine à haute dose, et le tétanos cessa complétement (1). Il m'est arrivé de remédier à des attaques d'hystérie soit en faisant enlever un pessaire, soit en calmant avec des bains, des cataplasmes, des injections, diverses souffrances de l'uterus et des ovaires, etc., etc. Dans le tétanos traumatique, il serait tout à fait raisonnable de

<sup>(4)</sup> Traité de Médecine pratique, nº 8,852.

# XÉVROSES; TRAITEMENT

478

modifier la bleasure qui a été le point de départ des accidents; et l'expérience comme la théorie démontrent qu'il faut, pour prévenir ces accidents, détruire la partie où existe la plaie qu'aurait empoisonnée le sielocyniose ou virus rabique (1), etc., etc.

Je ne puis qu'énoncer ici ces propositions, qui sont largement développées dans le huitième volume de mon Traité de médecine pratique, n° 12,126 et suivants.

356. Moyens d'arrêter les névropallies, les auras, dans le trajet qu'ils font de leur point initial jusque vers le névraxe,

Quand une névropalie, quelle qu'elle soit, s'étend de son point initial vers la portion du centre nerveux auquel elle aboutit, il est possible, comme cela m'est quelquefois arrivé, de l'arrêter dans sa marche ascendante, en comprimant fortement ou en refroidissant, par une application de glace, le nerf par lequel passe l'oscillation nerveuse. Des narcotiques très-actifs, le chloroforme, le chlorhydrate de morphine, un courant électrique, appliqués ou dirigés sur la peau, le suifate d'atropine injecté au-dessous du tégument qui recouvre ce même nerf, pourraient aussi avoir de l'utilité; mais ce n'est pas ici qu'il convient de parler de ces médications parfois si dangereuses.

<sup>(4)</sup> Discours sur la rage, prononcé à l'Académie par M. Piorry, en 1863. Mémoire sur les névroses, dans la Clinique médicale de la Pitié, page 38, etc., etc.

357. Traitement des névropallies parvenues au centre nerveux vers lequel elles se dirigent.

Quand une névropallie, telle qu'un accès d'épilepsie ou une attaque violente d'hystèrie, est parvenue au névraxe lui-même, on ne peut guère arrêter la série d'accidents qui ont lieu, et l'on est réduit à surveiller le malade, à maintenir doucement les membres pour empêcher qu'il ne se blesse, à éviter qu'il tombe soit dans l'eau, soit dans le feu, dans un précipice, etc., et à modérer les contractions convulsives auxquelles il se livre.

Les nombreux moyens de traitement dont il est ici question ne peuvent être employés qu'avec autant de circonspection que de savoir.

358. Utilité de la quinine solubilisée et de l'extrait de berberis dans les cas de névropallies périodiques.

Quand une névropallie quelconque se déclare d'une façon intermittente et périodique, il est indiqué d'avoir recours à des doses élevées de sulfate de quinine solubilisé ou d'extrait de berberis, sous l'influence desquels le mal se calme d'abord et finit quelquefois par ne plus se renouveler.

Ce n'est pas seulement pour les névropallies qui ont le cerveau pour point central, mais aussi pour celles qui se portent vers des plexus ou des ganglions pour de la se diriger vers d'autres nerfs, qu'il en arrive ainsi. J'ai promptement remédié, par l'emploi du sulfate de quinine solubilisé, à des douleurs périodiques du nerf frontal, dues très-probablement à des névropallies consécutives, à une souffrance de la rate; et M. le docteur Tamin, l'un de mes meilleurs élèves et amis, vient de me communiquer un nouveau fait de ce genre. Il en est arrivé ainsi dans un cas d'angine de poitrine où le mal existait depuis deux ans, et qu'aucune médication n'avait pu arrêter, et chez M. le duc de M... (1), qui souffrait du nerf maxillaire inférieur à ce point qu'il ne pouvait ni parler ni mâcher sans éprouver des souffrances telles qu'il n'osait plus proférer une parole ou prendre le moindre aliment.

#### 356. Maladie de la moelle rachidienne (myélopathies).

Lors de l'étude des petits moyens applicables à la curation des lésions dont les os sont susceptibles, j'ai parlé des cas dans lesquels les affections de la colonne vertébrale déterminent des accidents myéliques, et j'ai fait voir (page 415) que, sous l'influence de l'administration du phosphate de chaux, d'un régime convenable et du repos alternant avec un exercice qui ne soit pas porté jusqu'à la fatigue, on arrive le plus souvent à remédier au mal (page 421). Or ce n'est qu'à l'aide d'une exploration extrêmement attentive et du dessin très-exact tracé au moyen du plessimétrisme et du crayon que l'on parvient à déterminer : si les symptômes observés (2) sont les résultats de la compression

<sup>(1)</sup> Observation rédigée dans le Courrier médical, 1864.

<sup>(2)</sup> Ces symptòmes consistent : dans des douleurs de la région lom . baire s'étendant aux nerfs sciatiques et aux membres inférieurs : dans

MYÉLOPATHIES, MALADIES DE LA MOELLE; THÉRAPISME 484 que les vertèbres volumineuses ou déviées exercent sur la moelle et sur les nerfs qui en émanent, ou bien s'ils sont produits par une maladie primitive de cette même moelle.

360. Notions thérapeutiques relatives aux souffrances de la moelle.

Ce serait un très-grand tort que de tracer ici le traitement de telles affections qui exigent, pour être reconnues et combattues avec succès, des études profondes et suivies. La seule chose convenable à faire remarquer ici est que, dans les lésions de la moelle quelles qu'elles soient, les principaux moyens à employer consistent dans une médication hygiénique telle que l'ensemble des précautions que voici.

361. Moyeus simples et hygiéniques qui sont utiles et non dangereux dans la curation de la plupart des maladies de la moelle rachidieune.

1º Le repos au lit est le plus souvent, dans le traitement des maladies de la moelle, le premier moyen de curation. Cependant, si l'on ne veut pas qu'il ait parfois des inconvénients, il faut éviter que le malade reste constamment couché sur le dos; la raison en est que dans cette attitude, le canal vertébral étant situé à la partie la plus basse, les congestions sanguines, surtout alors qu'elles sont stasiques, y sont plus intenses, et par

des fourmillements, de l'anomestésie lombaire (troubles de sensibilité) se manifestant à la plante du pied, puis surviennent la paralysie, la faiblesse des extrémités inférieures, de la vessie ou du rectum; des contractions spasmodiques, etc. ASS MYÉLOPATHIES; MALADIES DE LA MORLLE; THÉRAPISME conséquent plus difficiles à se dissiper. A plus forte raison en est-il ainsi pour les ramollissements et pour les hydromyélies qui peuvent y avoir lieu. Les inflammations mêmes de la moelle ou de ses membranes doivent aussi être influencées d'une manière fâcheuse par une déclivité constante, il est donc utile de changer fréquemment, alors que cela est possible et qu'il n'en résulte pas trop de douleur, la position que les malades atteints de myélies occupent dans leur lit, de les faire placer de temps en temps sur le côté, et cela est d'autant plus indispensable, que l'on peut alors examiner plus facilement la région du siège où se déclarent trop souvent des lésions d'une extrême gravité.

2º Toutes les sois, en esset, que, sur la peau qui recouvre les parties voisines de l'extrémité insérieure de
la colonne vertébrale, on voit survenir, chez les personnes atteintes de maladies de la moelle, des rougeurs,
des éruptions, etc., (qui sont les résultats de la déclivité,
des frottements, de la malpropreté, du désaut de rénovation de l'air), il saut y porter la plus sérieuse attention
et les traiter par les moyens précèdemment indiqués
(pages 52, 421); c'est là un prècepte de haute humanité, car
si l'on n'agit pas ainsi, il en résulte des ramollissements,
des congestions, des inslammations, des ulcérations,
des abcès tellement dangereux, qu'ils sont suivis de la
gangrène et de la mort.

3° Le repos qui, en général, est si utile dans les cas dont il est les question, aurait cependant de très-graves inconvénients s'il était continuel et absolu; il faut le faire alterner avec l'exercice, qui, encore une fois, ne doit jamais être porté jusqu'à la fatigue ou à la dou-leur; tout aussitôt que le malade ressent les premières atteintes de cette fatigue, il faut le faire remettre au lit. S'il arrive qu'on laisse les membres inférieurs dans une immobilité complète, ils s'hypotrophient par le défaut d'action qu'on leur inflige, et finissent, s'ils ne sont pas déjà frappés d'une anervismie due à la myélopathie, par être atteints de la paralysie du repos. C'est pour éviter cette conséquence fâcheuse du défaut absolu d'action dans les cas dont nous parlons, que j'ai utilisé avec tant de succès l'appareil gymnastique simple dont j'ai donné déjà la description (p. 388).

4º C'est dans la même série d'idées qu'il faut pratiquer fréquemment sur la région des lombes, sur les fesses, les cuisses et les mollets des frictions avec la main, la flanelle, imbibées ou non de liqueurs aromatiques, et avoir recours au massage des muscles de ces parties, massage qui y active la circulation et y provoque le mouvement; à des douches avec de l'eau chaude ou froide, à des courants électriques dirigés de la moelle aux extrémités nerveuses paralysées.

5º II faut éviter avec le plus grand soin que l'urine s'accumule dans la vessie, et que les derniers intestins et surtout le rectum se remplissent de scories; pour cela il faut explorer ces organes de la manière la plus attentive par la palpation et le plessimétrisme, et cela à l'effet de savoir s'ils contiennent ou non des liquides ou des matières; dans le cas où l'on constate la pré-

# 484 MYÉLOPATHIES, SUITES DE RACHISIES

sence de celles-ci, il est urgent de les évacuer et de ne jamais permettre qu'elles y séjournent longtemps. Cette recommandation est une règle pratique que le médecin et les assistants ne doivent jamais oublier.

6° Dans les myélopathies comme dans toutes les autres affections, il faut avant tout éviter l'action des causes qui leur donnent naissance ou qui les entretiennent, et dans ce nombre sont particulièrement : la station prolongée et fréquemment réitérée; la fatigue extrême et continue; les excès vénériens, et surtout les habitudes vicieuses auxquels les adolescents et les jeunes gens se livrent; la spermorrhée nocturne ou diurne; l'usage des liqueurs fermentées et surtout de l'alcool; l'action des oxydes et des sels de plomb, etc.

Des détails plus étendus sur le traitement des myélopathies me feraient sortir du cadre dans lequel je veux me renfermer; je me bornerai à dire ici que les moyens dont il vient d'être parlé et qui sont éminemment hygiéniques, sont en général infiniment plus utiles que l'emploi de la brucine, de la strychnine et d'autres médicaments dangereux dont on a si souvent usé et abusé.

361 bis. Avant de traiter une myélopathie, il faut bien s'assurer qu'elle n'est pas symptomatique d'une lésion de la colonne vertébrale.

Lorsque des symptômes de souffrances de la moelle (myélopathies) viennent à se déclarer, et même quand c'est une sciatico-névralgie double ou même simple, qui a lieu, le premier soin doit être de constater s'il n'existe pas une maladie de la colonne vertébrale (rachiso-

# MYÉLOPATHIES, SUITES DE RACHISIES

485

celies, mégalie ou malaxie, etc.), état pathologique, d'où résulte la compression de la moelle ou des nerss qui en émanent. Dans une multitude de cas, que ceux qui ne connaissent pas le plessimétrisme, ne peuvent distinguer (et cela à l'immense préjudice des malades), c'est seulement par suite de la lésion rachidienne que la moelle est malade. Des malheureux que l'on aurait pu guérir au moyen d'un traitement approprié, si l'on avait su découvrir la cause anatomique du mal, périssent, parce que l'on a cru à une souffrance primitive du cordon rachidien. On peut lire dans le traité de plessimétrisme des faits nombreux qui prouvent jusqu'à l'évidence la vérité de cette proposition.

### CHAPITRE XVII

# Annotations générales sur divers médicaments et sur des médications variées.

Je ne puis éviter de parler dans cet ouvrage de quelques médications qui ont dans la pratique des avantages marqués, et de faire quelques réflexions relatives à l'usage de l'eau, des boissons ou tisanes, des bains simples ou de mer, et des eaux minérales. Si ces mêmes réflexions peuvent détruire quelques préjugés dangereux et quelques opinions fausses, j'aurai rempli la tâche que je me suis proposée en terminant par cette addition l'ouvrage que je publie, addition à laquelle j'ajouterai quelques mots sur une méthode de pansement des plaies d'armes à feu, qui présente d'incontestables avantages sur les procédés curatifs que, dans de tels cas, on emploie d'ordinaire.

362. Médicaments, formules, potions, remèdes dont les malades et les médecins ne doivent pas se servir.

Une foule de médicaments, d'onguents, d'emplatres, d'eaux portant des noms de plantes ou de personnes

qui sont plus ou moins intéressées à vulgariser les drogues et les recettes qu'elles proposent, sont beaucoup plus utiles pour les gens qui les prônent qu'ils ne le sont pour les malades qui en font usage, Ce sont en général des remèdes connus de tous, des purgatifs donnés sous un petit volume, des préparations alcooliques que l'on a rendues odorantes par quelque huile essentielle; des graisses, des résines, auxquelles on ajoute diverses substances, parfois actives, tantôt de nul effet, et qui sont données contre toutes les maladies possibles. Que le public se laisse prendre à de telles excentricités mises en vogue par la réclame, cela se conçoit facilement; ce bon public ne sait en rien ce qu'il faut entendre par les mots : fièvre, rhumatisme, goutte, catarrhe (1), et., etc.; et, dans son ignorance, il donne une confiance banale au charlatan audacieux qui lui promet de tout guérir; il croit à l'efficacité de la révalescière du Barry, comme aux granules homœopathiques, comme aux fioles contenant de l'eau colorée en bleu, en rose, en vert, et dont la forme étrange le flatte.

On lui proposerait la quintessence de la lune en dissolution dans un verre d'eau, qu'il verrait dans celle-ci un remède à tous maux; il suffirait pour cela d'un prospectus impudent ou d'une annonce de cures merveilleuses. Mais que des médecins emploient et prescrivent de tels remèdes, qu'ils les fassent entrer dans

<sup>(1)</sup> Et les médecins ne le comprennent pas béaucoup plus.

## 488 RECETTES, FORMULES A NOMS D'AUTEURS

la pratique civile, en les recommandant par leur nom, c'est, en vérité, compromettre leur dignité et leur conscience. C'est à eux, au contraire, à s'élever contre de hideux trafics; c'est à eux à ne pas indiquer l'eau. l'élixir, la potion, etc., dits de monsieur tel ou tel, mais de formuler des substances connues et dont l'efficacité ne soit pas douteuse, à en déterminer rigoureusement les doses, à associer convenablement les remèdes, et surtout à ne rien prescrire qui n'ait la raison organique, pathologique et thérapique de son emploi. C'est à eux à savoir combiner les médicaments, sans courir les risques de les décomposer, et, autant que possible, ils doivent les donner isolés pour mieux en constater les effets. Que s'ils ne sont pas assez instruits pour associer convenablement dans des formules les substances actives, qu'ils consultent quelque bon livre, et surtout celui que le très-regrettable docteur Reveil, agrégé à la Faculté de médecine de Paris, a publié; ouvrage dicté par le savoir profond et le bon esprit de son auteur (1).

363. On ne doit se servir qu'avec une extrême circonspection des médicaments-poisons et, le plus souvent, il est prudent de s'en abstenir.

Que les praticiens soient surtout on ne peut plus réservés sur l'emploi et les doses des médicaments toxiques dont on a tant abusé! Que le souvenir de ces accidents terribles, dans lesquels plusieurs malheureux ont succombé dans un hospice à la suite d'erreurs sur

<sup>(1)</sup> Formulaire raisonné des médicaments nouveaux et des médications nouvelles, 1861,

engage à être très-circonspects relativement à l'admi-

nistration de ce terrible poison!

Qu'ils se rappellent ces lugubres drames des tribunaux, dans lesquels l'acétate de morphine, la digitaline, l'acide arsénieux, etc., ont causé la mort, et où il a été si difficile de distinguer l'innocent du coupable! Qu'ils se ressouviennent encore que les plus puissants narcotiques peuvent bien quelquefois pallier ou momentanément dissiper les douleurs, tandis que, ne remédiant presque jamais aux causes de ces souffrances, de tels agents ne font pas cesser le mal, et ils penseront comme moi que les médicaments toxiques, tels que l'arsenic, le plomb, le cuivre, les acides minéraux concentrés, l'opium (1) et surtout la morphine, la belladone et l'atropine, la digitale et la digitaline, la jusquiame, le datura, la vératrine, la strychnine, la brucine, le chloroforme même, etc., etc., ne doivent être employés, même par les praticiens les plus instruits, que le moins possible et avec une extrême circonspection.

364. Utilité des applications locales et générales de l'eau à l'extérieur.

En général, ce qui calme infiniment mieux que les narcotiques, et ce qui, très-souvent, remédie au fond des choses, alors qu'il s'agit de douleurs, ce sont :

<sup>(1)</sup> L'opium à petites doses, s'il procure du sommeil, présente parfois de l'utilité, mais son usage est pernicieux; cet usage devient fréquemment un affreux abus, ainsi que j'en ai actuellement un triste exemple sous les yeux.

1º le repos de la partie souffrante; 2º l'éloignement des causes physiques, organiques ou physiologiques qui entretiennent le mal; 30 les cataplasmes, les fomentations, les bains locaux et surtout les bains généraux prolongés. Ces derniers, continués pendant deux ou trois heures de suite, à une température fraiche ou tiède, sont, à coup sûr, les antispasmodiques par excellence; - les bains prolongés combattent le plus avantageusement l'état dit nerveux des femmes. Rien n'est plus difficile, en effet, que de remédier à ces souffrances névropalliques (page 477), dont l'angiove est si souvent le point de départ, et qui viennent se reproduire vers les diverses parties du névrosystème, en y produisant des malaises, des inquiéludes, une sensibilité exagérée. des douleurs, des mouvements spasmodiques, des modifications dans l'intelligence, etc., etc. Les préparations oplacées ne font souvent qu'exaspèrer ces malaises, qui sont le supplice des femmes et parfois le tourment de ceux qui les entourent. On donne souvent, dans ces cas, de l'eau de laitue, de l'infusion de tilleul, édulcorées l'une et l'autre avec le sirop de fleurs d'oranger. l'inévitable potion antispasmodique; autant valent les granules dits homocopatiques : c'est là de ce thérapisme que certaines gens emploient pour calmer des imaginations malades ou pour faire quelque chose. J'aime à croire qu'ils ne le font pas dans de plus mauvaises intentions; mais que l'on sache bien qu'en agissant ainsi, on ne fait ni bien ni mal. Or, il y a des moyens actifs dont on ne pourrait pas en dire autant

et qui ne produisent guère de bien, tandis qu'ils peuvent faire beaucoup de mal, tels sont encore une fois : la belladone, la jusquiame, le datura, le chloroforme, l'alcool aromatisé par des hulles essentielles, actives, etc.; le médecin sage n'emploie ces médicaments qu'avec prudence, et le public ne doit jamais y avoir recours sans consulter des gens instruits.

365. Bains tièdes ou frais prolongés dans des cas divers.

Les bains tièdes ou frais sont, encore une fois, et je le répète à dessein, dans les névropathies ou névropallies des femmes, d'une extrême utilité, et je ne connais aucun moyen qui, dans des cas pareils, réussisse autant qu'eux à soulager et à guérir. L'exercice musculaire, les longues promenades à pied (car les jambes n'ont pas plus que les bras été faites pour le repos), les frictions, les distractions, les soins, les conseils affectueux, qui n'excluent pas un peu d'autorité, sont, dans les souffrances d'ailleurs très-réelles dont nous parlons ici, des médications extrêmement avantageuses qui doivent être combinées avec l'usage d'aliments réparateurs pris en proportion suffisante.

Les bains tièdes ou frais, et surtout plus ou moins prolongés, sont non moins utiles, dans les névralgies, même chez les hommes, que chez les femmes les plus névropathiques; et les lotions, les douches, les applications de linges humides trempés dans l'eau fraiche ou à 0° de température, les cataplasmes, l'hydrothérapie localement employée, agissent sur les parties

circonscrites de la même façon que les bains prolongés dont je viens de parler.

 Inutilité de l'addition aux bains tièdes de diverses substances réputées calmantes.

Un médecin sérieux croira-t-il facilement que l'addition à un bain de substances solides ou visquenses, telles que : le son, les fécules, l'eau de graine de lin, la décoction de guimauve, de riz, d'albumine, de gélatine, de lait, etc., etc., puisse en augmenter l'efficacité? La peau, recouverte d'épiderme, n'absorbe pas les corps en suspension dans l'eau; il en résulte que c'est par simple imbibition que ces bains agissent utilement. L'eau infiltre si bien le tégument, qu'elle le rend plus mou; elle pénètre les tissus de telle façon, qu'après une immersion prolongée dans l'eau tiède, les doigts se rident, les parois musculaires du ventre se relàchent au point de permettre facilement de palper les viscères profondément placés (1), et que l'urine coule bientôt en abondance. C'est une action semblable de l'eau tiède qui cause ce calme si grand que les bains généraux et locaux apportent si fréquemment aux névropathies plus ou moins étendues.

#### 367. Administration de l'eau par l'estomac.

L'administration de l'eau à l'intérieur est, à coup sûr, l'un des principaux moyens thérapiques, et l'on ne peut qu'approuver les travaux et les tentatives des chimistes, des hygiénistes et des magistrats de nos cités pour que

<sup>(1)</sup> J'ai tiré, pour la diagnose, un très-grand parti de ce fait.

des eaux pures et salubres soient abondamment fournies aux populations; celles qui sont à la fois claires, aérées, fraîches, qui ne contiennent que dans de faibles proportions des sels calcaires carbonatés ou sulfatés, et qui ne renferment pas de matières organiques susceptibles de décomposition ou déjà décomposées; celles qui ne donnent pas au goût de désagréables sensations, sont, en général, les meilleures. C'est dans les ouvrages consacrés à l'étude de l'hygiène qu'il faut renvoyer pour les détails plus étendus que cet important sujet comporte.

L'eau pure et salubre, à doses suffisantes et non pas exagérées, portée dans l'estomuc le matin, à midi et le soir, est, à coup sûr, dans une infinité de cas, l'un des moyens les plus utiles que l'on puisse employer. Un grand nombre de succès, dont on fait honneur à certaines eaux minérales, sont dus, au moins en trèsgrande partie, à ce que les malades prennent, toutes les demi-heures, toutes les heures, et pendant la matinée ou la soirée, une verrée d'eau fraiche. Sans doute le bicarbonate de soude, le fer, le soufre que cette eau contient, peuvent avoir une action réelle, mais il ne faut pas se dissimuler que l'eau elle-même est pour beaucoup dans les résultats heureux obtenus. Je vais bientôt revenir sur ce sujet.

366. La plupart des tisanes n'ont d'autre action que celle de l'eati

Il faut remonter à Hippocrate pour voir quelle importance on attachait au choix de telle ou telle espèce de ptisane, et l'on sait combien était grande sa confiance dans la décoction d'orge. Il est vrai qu'il la prescrivait fréquemment comme un aliment léger, et c'est au même titre que, dans les maladies aigués, on administre avec avantage les bouillons de poulet et de veau, la dissolution d'afbumine, l'eau de riz, etc. Il arrive aussi que certaines substances actives, certains sels qui se trouvent dans la composition des boissons que l'on donne aux malades, telles que les infusions de coquelicot (qui contient un peu d'opium), de camomille (qui renferme un principe amer), de pariétaire (où se trouve de l'azotate de potasse ou sel de nitre), peuvent avoir une efficacité spéciale; mais la plupart des tisanes proprement dites : décoction de chiendent, de réglisse. de guimauve, de graine de lin; infusion de fleurs de tilleul, de sureau, des quatre fleurs, etc., etc., n'ont d'autre action que celle de l'eau, et ne valent pas mieux, comme remêde, que les boissons agréables à prendre, et par lesquelles, à la très-grande satisfaction des malades, on peut les remplacer; de ce nombre sont : l'eau sucrée légèrement acidifiée par les sucs de groseille, d'orange, de framboise, ou aromatisée par le suc exprimé de l'écorce d'oranges, par la vanille, la décoction de cerises, de pommes, de pêches, etc., etc., convenablement sucrées. Encore une fois, la plupart

BOISSONS AQUEUSES TRÈS-UTILES, EAUX MINÉRALES de ces boissons ne sont des médicaments que par l'eau qu'elles contiennent, et ont plus d'action par leur température et leur humidité que par les quelques principes plus ou moins inoffensifs qu'elles renferment. Laissons aux simples leur confiance dans les simples; et par cela même que la science reconnaît l'immense utilité de certains végétaux et des substances actives qu'ils contiennent, elle établit que la plupart des boissons dites tisanes n'ont d'autre efficacité que celle de l'eau qui entre dans leur composition. Lorsqu'un médecin vient critiquer le traitement prescrit par un autre médecin, et qu'il conseille seulement l'usage d'une tisane différente de celle qui avait été proposée par celui-ci, soyez assuré que ce n'est pas dans l'intérêt du malade qu'il agit ainsi, mais dans ce qu'il croit être son intérêt personnel.

 Considérations générales sur l'efficacité des eaux minérales. On a exagéré leur utilité.

Des considérations analogues aux précédentes peuvent être établies sur les eaux minérales. La mode, les chemins de fer, l'entrainement routinier, la facilité qu'elles donnent de se livrer au plaisir, les succès parfois dus à tout autre chose qu'à l'action des eaux en elles-mêmes, ont fini par vulgariser si bien les eaux thermales comme remède, que le public, pour peu qu'il ait quelque aisance, ne voit plus, en été et contre les maladies chroniques, qu'une seule médication : les eaux minérales, lesquelles ont remplacé avec avantage, dans

l'esprit d'une foule de personnes de la haute societé, le travers homospathique. Les médecins eux-mêmes, oubliant d'étudier avec soin les états organopathiques, ne tenant compte souvent que de l'apparence extérieure des malades, trouvant plus commode de se servir des mots: diathèses, cachexies, constitution, force, débilité, etc., que de spécifier, de déterminer les causes anatomiques et physiologiques des effets organiques observés, etc., envoient au hasard, dans les établissements thermaux, des gens qui pourraient fréquemment s'en passer, et qui, parfois, s'en trouvent fort mal.

La preuve de la légèreté avec laquelle on les conseille, c'est que presque jamais on ne pose d'une manière précise, dans une consultation motivée, les raisons pathologiques sur lesquelles on se fonde pour en conseiller l'emploi. C'est là faire de cette médecine banale qui exige peu d'instruction de la part de celui qui l'exerce et qui coûte peu de peine au médecin qui v a recours. Avant de se rendre dans un établissement thermal quelconque, que tous ceux qui veulent y aller consultent des médecins habiles, exercés dans l'art du diagnostic, aptes à reconnaître, par le plessimétrisme. par le dessin sur la peau, par l'auscultation, le spéculum, etc., quel est l'état matériel des organes profonds, et qu'ils demandent, après examen attentif, à ces hommes expérimentés d'établir leur opinion motivée et de leur dire à quelles eaux ils doivent se rendre; alors on ne verra pas commettre, à chaque instant, de ces honteuses méprises dans lesquelles on envoie : à Vichy, comme atteints d'affections du foie, des gens qui portent des tubercules dans les poumons; à Contrexéville, des individus dont la rate seule est malade; à Bagnères, à Bourbonne, des malheureux qui sont agonisants par suite d'un rétrécissement des orifices du cœur; à Kissengen, à Ems, à Bade et surtout à Hombourg, des personnes qui, ne sachant que faire, prenant parfois la passion du jeu pour moyen de traitement de l'ennui qu'elle portent partout, demandent au médecin de leur donner un prétexte pour faire un voyage en Allemagne.

Les eaux minérales peuvent être d'une grande utilité. A Dieu ne plaise que je nie le moins du monde l'efficacité de certaines eaux dont les effets utiles ne peuvent, dans des cas nombreux, être révoqués en doute; il m'arrive fréquemment aussi d'en prescrire, mais je ne le fais pas d'une manière banale, je ne les indique pas pour plaire au malade ou au médecin C'est après avoir soigneusement étudié l'organisation, c'est après avoir nettement établi les indications à l'aide des signes physiques et fonctionnels des lésions existantes que je conseille aux consultants, et alors que je les crois utiles, telles ou telles eaux minérales; et quand ces personnes me paraissent pouvoir guérir à Paris ou chez elles, je leur explique, par écrit et avec détail, quel est leur état, ce qu'il convient de faire, et je leur évite ainsi des dépenses excessives et des déplacements qui leur sont souvent très-préjudiciables.

496 UTILITÉ DES BAUX MINÉRALES; CINCONSTANCE HYG.

270. Circonstances hygidalques utiles qui, en général, en rengentreut dans les établissements d'eaux minérales.

Dans l'action des eaux minérales, il y a deux ordres de choses dont il faut tenir un grand compte.

Le premier est l'ensemble des moyens hygiéniques que l'on rencontre aux thermes, c'est-à-dire la pureté de l'air, une nourriture abondante et réparatrice, le lait d'excellente qualité, l'exercice, le changement d'habitation, l'altitude, la distraction, l'éloignement des affaires, des fatigues, des ennuis, et parfois des plaisirs bruyants auxquels on est exposé. Or, la plupart de ces circonstances peuvent être réunies tout aussi blen dans la promière campagne venue que dans des pays renommés pour les eaux, et celles d'un ruisseau limpide. aéré, serpentant dans un site pittoresque et salubre. et dans une localité agréable à habiter, réussiront fréquemment à rétablir la santé de gens qu'une hygiène mal entendue a profondément compromise. L'eau pure. prise le matin par large verrée et à doses réitérées. est, à coup sûr, pourvu qu'elle soit d'excellente qualité. un des agents thérapiques les plus puissants et les plus utiles (1). Lorsque les circonstances précèdentes

<sup>(</sup>i) Lorsque l'un de mes élèves lut à l'Académie un mémoire, résultat de mes travaux et d'un voyage que j'avais fait à Forges (Seine-et-Oise), travaux qui constatent l'utilité des eaux prises dans ce pays; on prétendit qu'elles ne pouvaient être de queique efficacité parce qu'elles ne contenaient pas d'agent chimique. Or, le temps m'a donné raisonet l'habitation à Forges, comme mes recherches cliniques l'avaient prouvé, a été si utile aux enfants d'une faible constitution et atteints

371. Utilité des substances variées que les eaux minérales contiennent.

Les substances minéralisatrices qui sont dissoutes ou suspendues dans les eaux, et qui souvent peuvent être artificiellement administrées à toutes les doses possibles dans l'eau ordinaire, et par exemple : le bicarbonate de soude, les oxydes et les sels de fer, les hydrosulfures, etc., constituent un second ordre d'agents souvent fort utiles. Je ne puis entrer ici dans des détails qui me feraient sortir du cadre où, dans cet ouvrage, je veux me renfermer.

### 374 bis. Bains de mer.

La plupart des réflexions qui précèdent sont applicables aux bains de mer, dont l'utilité est souvent incontestable, mais qui ont aussi leur danger. Il faut encore que le malade, avant de les prendre, consulte un mé-

d'affections chroniques des ganglions, des os et des jointures que, maintenant, l'administration des hôpitaux envoie à Forges un grand nombre de jeunes malades dits scrofuleux. Mon opinion était fondée sur la comparaison établie, sur un registre, entre l'état déplorable de vingt enfants que, dans cotte localité, j'avais constaté au printemps, et l'immense amélioration que je trouval au mois de septembre dans la santé de ces petits malheureux.

872. Dérivatifs, vésicatoires, cautères, moxas, sétons, cau dite sédative (4) pommades et emplatres stiblés, frictions avec l'huile de croton, etc.

Il est une opinion systématique d'ancienne date, et qui a été pour l'homme la cause de bien des douleurs. qui a mis des agonisants à la torture, et qui, faisant interpréter certains faits par le caprice et la prévention. a fait, en définitive, beaucoup de mal; je veux parler de la théorie à laquelle on a donné le nom de dérivation (2). Cette doctrine repose sur des spéculations fantastiques relatives aux humeurs (doctrine ancienne. pathologie humorale), aux forces, aux propriétés, à la vitalité (doctrines anciennes et modernes), toutes choses mal définies, mal comprises, et qui, n'étant que des bases mal établies, n'ont pu permettre d'édifier que des opinions sans solidité. Interprétant faussement l'aphorisme d'Hippocrate: duobus doloribus simul obortis, vehementior obscurat alterum, ce qui signisse, par le mot à mot, un fait positif, c'est-à-dire qu'une forte douleur rend obscure ou moins appréciable une douleur moins vive, on en a déduit qu'en causant, sur des points limités du corps, une souffrance, un afflux d'hu-

<sup>(4)</sup> Qui, au lieu d'être sédative et de calmer, irrite et enflamme la peau.

<sup>(2)</sup> Voyez le mémoire que j'ai lu à l'Académie, et qui a été publié dans ses Bulletins, décembre 4855: De la dérivation et de la révul-

meur, de sang, de vitalité, de force, de douleur, on va, par sympathie, par dérivation, déterminer une diminution dans l'afflux d'humeur, de sang, de forces, de douleur qui, pathologiquement, a lieu dans une autre partie. Quand un médecin, doué de quelque raison, aura placé un vésicatoire sur la jambe droite pour guérir une brûlure faite à la jambe gauche, et qu'il aura réussi à activer ainsi la curation des résultats de l'action du calorique, on pourra croire à l'hypothèse de la dérivation; mais, avant d'obtenir des effets salutaires d'un moyen aussi excentrique, il y a tout lieu de penser que l'on attendra longtemps.

On ne déplace pas ainsi à sa guise les humeurs, qui ne circulent pas et qui ne sont autre chose que des produits du sang, ou que des liquides bientôt versés dans ce même sang; on n'attire pas de cette façon, vers un lieu ou un autre, les forces (qui ne sont que des résultats), la vitalité (que l'on ne comprend pas divisible et mobile); ces forces, qui sont les résultats de la manière dont l'organisme fonctionne; l'irritation, qui n'est qu'un mythe auquel on a donné un nom. L'hypothèse de la dérivation n'est en rien utile pour l'explication des faits thérapiques, et ce n'est pas sur elle qu'il faut se fonder pour appliquer ces innombrables exutoires dont on salit le corps des malades, et qui laissent, après eux, des cicatrices difformes que des médecins soigneux doivent éviter de faire sur la poitrine, sur les bras, sur le cou ou les épaules de jeunes femmes, tout aussi bien qu'il est de leur devoir de ne pas infli-

## CHAPITRE XVIII

#### PLAIRS PRODUITES PAR LES ARMES A FRU.

874. Pansements très-simples des plaies d'armes à feu évitant les innombrables inconvénients attachés à la charpie.

Il faut avoir servi et avoir vu beaucoup de plaies produites par des armes à feu; il faut avoir observé, dans les services de chirurgie, les inconvénients attachés au pansement des blessures, résultats ou non des opérations, etc., pour comprendre combien il y a d'améliorations à apporter dans cette partie si importante de la chirurgie. Le pus qui s'écoule des surfaces mises à nu est une cause d'accidents terribles; sa putréfacfaction infecte l'air; sa résorption donne lieu à la pyémie, c'est-à-dire à une altération du sang spéciale et dangereuse, surtout lorsqu'il est devenu fétide (1); il est la cause d'une indicible malpropreté et d'épidémies effroyables; la septicité qu'il provoque est l'agent principal de la gangrène d'hôpital (nécrosie nosocomiale),

<sup>(4)</sup> Voyez, dans mon Traité de médecine pratique, mon travail sur la pyémie, tome III.

PLAIES D'ARMES A FEU; BANDELETTES DE DIACHYLUM 505 d'érysipèles terribles, de typhus contagieux, d'encéphalites septicémiques, de fièvres puerpérales, etc. La consommation de charpie et de linge que les pansements ordinaires exigent entraîne à d'énormes dépenses. Elle rend le service des ambulances difficile; les malheureux blessés à la suite des batailles ne peuvent être pansés, à cause du manque de ces moyens de traitement; alors que nos soldats pourraient encore marcher, les linges, qui se déssèchent et qui deviennent trèssecs et non flexibles, les en empêchent; si la retraite est forcée et rapide, l'armée est contrainte de les aba donner à l'ennemi; le chirurgien manque de temps pour faire des centaines de pansements, etc., etc., et cependant il est un moyen très-simple qui évite ces inconvénients, et dont l'expérience a constaté l'immense utilité. Ce moyen, je l'ai proposé et employé en 1830. chez dix-sept blessés dont j'ai été chargé par l'administration des hôpitaux, qui me les confia alors qu'ils avaient été déposés à l'hospice de la rue de Sèvres. Aucun de ces blessés n'a succombé; parmi eux se trouvaient des gens atteints de plaies par armes à feu du calcaneum et du genou, trois fractures du péroné produites par des balles; la température était brûlante, et les précautions hygiéniques laissaient beaucoup à désirer. En deux, trois, cinq ou six semaines, toutes ces blessures furent guéries sans accidents, suppurant peu, donnant à peine lieu à quelques exhalaisons putrides, et les malades continuant, pour la plupart, à marcher. La reconnaissance de ces braves gens fit que, longtemps après, je 506 PLAIES D'ARMES A FEU; BANDELETTES DE DIACHYLUM revis plusieurs d'entr'eux, qui n'avaient éprouvé aucun accident à la suite du traitement qui va être exposé, et que j'ai publié dès ce temps-là et à plusieurs reprises.

ı

Ce traitement consiste dans le pansement des plaies d'armes à feu, par l'application de longues bandelettes de diachylum très-agglutinatif, très-frais, préparé, s'il se peut, par le médecin au moment de s'en servir (p. 20), bandelettes dont on entoure circulairement les membres blessés, ou dont on couvre les parties du corps plus plates; elles doivent avoir trois centimètres de largeur, être placées les unes sur les autres, de bas en haut, et de facon à ce que celles du dessus recouvrent la moitié de l'étendue en largeur de celle de dessous. Leurs principales qualités sont d'être très-adhérentes. non irritantes, de s'appliquer comme de la glu sur la peau, sur les plaies, et de ne pas permettre ainsi l'introduction de l'air. Ne vous inquiétez pas des liquides. du pus qui s'écoulent de la plaie : ils s'infiltreront entre le diachylum et le tégument, et sortiront sans se pourrir au-dessus et au-dessous de l'appareil. Le meilleur tissu pour supporter le dischylum est ici le taffetas demi-usé dont il a été parlé (page 20), et tout ce qui a été dit du traitement des petites blessures trouve ici son application, comme aussi l'administration à l'intérieur du phosphate de chaux est, dans le cas de fractures compliquant les plaies, d'une très-grande utilité. Il ne faut pas oublier que, lors du pansement dont il vient d'être parlé, il faut, lorsqu'il s'agit des bras, des

PANSEMENTS DES PLAIES D'ARMES A FEU; DIACHYLUM 507 avant-bras, des cuisses et des jambes, comprimer légèrement ces parties, avec une bande roulée, au-dessous des bandelettes, et cela pour prévenir la tuméfaction des membres inférieurement placés.

Ces pansements ne doivent être réitérés que tous les trois ou quatre jours. Au besoin, les poudres de lycopode, de riz, de charbon, la fécule, etc., pourraient remplacer les bandes de linge ordinairement placées par-dessus les bandelettes de diachylum.

On ne saurait croire à quel point cette méthode de pansement réussit et combien elle peut être utile à une armée en campagne. Je l'ai cent fois mise en pratique pour des cas plus ou moins analogues aux blessures dont il vient d'être parlé, et toujours avec le même succès. Ajoutez, aux avantages qui précèdent, que les caissons d'ambulance, si la méthode de pansement que je propose était acceptée, pourraient être moins chargés de pièces de pansement que s'ils ont à transporter des masses de charpie et de linge, et que tout soldat pourrait ainsi avoir dans son sac des moyens convenables pour panser tout d'abord lui-même les blessures qu'il recevrait.

Je suis loin d'avoir la prétention d'être complétement l'auteur de la méthode de curation des plaies d'armes à feu qui vient d'être indiquée, méthode que je crois être d'une efficacité extrême; notre grand chirurgien Larrey avait déjà utilisé, en Égypte, des idées de ce genre, et, certes, notre très-cher et très-honorable collègue et ami, M. Larrey fils, n'a pas manqué de se rappeler les préceptes que son illustre père a établis sur l'utilité d'abriter les plaies contre le contact de l'air. J'ai vu, à Barcelone, des fractures comminutives de la cuisse, traitées par des chirurgiens anglais, être recouvertes d'étoupes soutenues par des bandes, auxquelles on ne touchait pas jusqu'à la guérison, qui survenait rapidement. Roux a rapporté de Londres le traitement des ulcères des jambes par les bandelettes de diachylum, mais enfin celles-ci n'ont pas, que je sache, été appliquées avant mes pansements, faits en 1830, aux plaies d'armes à feu, et c'est avec un regret très-grand que je ne vois pas cette excellente méthode être entrée dans la pratique générale (1).

<sup>(4)</sup> Voyez dans le bulletin de l'Académie, septembre 1866, et dans le Courrier médical à la même date, le mémoire que j'ai lu à l'Acamie impériale de médecine, sur l'utilité d'abriter les tissus dénudés contre le contact de l'air.

## CHAPITRE XIX

### CURATION DES ABCÈS

375. Ouverture des abcès par de simples ponctions; — leur traiteme par des injections d'eau et de teinture d'iode au tiers.

Les études précédentes sur les plaies d'armes à seu me conduisent à parler ensin d'un procédé de traitement des abcès, qui, certes, doit être employé par d'autres chirurgiens que par moi, et dont je me sers, depuis plus de quinze ans, avec un immense succès. Non-seulement je ne sais plus, aux collections purulentes, de grandes incisions, comme les pratiquait Lissranc; non-seulement j'évite d'en saire avec le bistouri, mais je me borne à avoir recours à une petite ponction avec la pointe d'un très-mince bistouri (pour éviter la difficulté de l'introduction du troisquarts), puis j'introduis une large canule dans la plaie (4); elle me sert : 1° à évacuer le pus; 2° à faire

<sup>(4)</sup> Qu'il me soit permis de parler ici d'un petit moyen proposé par le Dr... (Courrier médical 4865, p. 46), propre à entretenir un conduit fistuleux artificiel destiné à évacuer le pus d'un abcès. Ce procédé ingénieux et utile consiste à passer rapidement dans ce conduit, une sonde canelée dont la rainure contient une petite proportion d'azotate d'argent que l'on y a fait fondre. Cette cautérisation superficielle suffit pour empêcher la cicatrisation de la plaie fistuleuse.

une injection à grande cau, qui est réitérée jusqu'à ce que cette eau sorte très-claire et non odorante: 3º à injecter une dissolution d'un tiers de teinture d'iode dans deux tiers d'eau distillée. Je laisse séjourner, pendant quelques minutes, cette mixture dans la cavité pyoïque, puis je donne à celle-ci un écoulement facile; au besoin, je renouvelle sur-le-champ cette injection, je referme la plaie, j'en maintiens les bords desséchés avec des bandelettes de taffetas recouvert d'excellent diachylum (page 506). Suivant les cas, je réitère les injections iodurées le soir et deux ou trois jours de suite; je constate, par le plessimétrisme et la palpation, la diminution de la collection de liquide et des engorgements, et j'ai presque toujours, si ce n'est toujours, le bonheur de voir les malades guérir trèspromptement sans douleurs, sans grandes plaies, sans pyémie chronique, sans qu'ils gardent le repos et sans être couturés par des cicatrices difformes. Je pourrais citer bien des faits recueillis dans mon service d'hôpital ou en ville, faits qui prouveralent l'excellence de ce traitement. Je me bornerai à mentionner plusieurs cas d'abcès par congestion où cette médication a été si utilement employée et surtout celui d'un énorme abcès périnéphrique qu'en 1864 M. le docteur Gauthier et moi nous avons soigné avec tant de bonheur dans le faubourg Saint-Antoine (1).

<sup>(4)</sup> Voyez sur ce sujet le Traité de plessimétrisme.

## CHAPITRE XX

DE L'AMRATION, DE L'HABITATION ET DE L'ENCOMBREMENT

376. Utilité de l'aération et d'une habitation salubre dans le traitement des plaies par armes à feu, des blessures, des suites d'opèrations, etc.

Les plaies d'armes à feu, les abcès comme toutes les autres solutions de continuité, prennent, sous l'influence de l'agglomération des hommes dans un même lieu, un caractère extrémement fàcheux, auquel on a donné le nom de pourriture ou de gangrène d'hôpital (nécrosie nosocomiale). Éviter cette agglomération est le meilleur moyen de prévenir cette déplorable affection qui compromet si fréquemment la santé et la vie des blessés.

Cette réflexion me conduit naturellement à parler, avec quelque détail, de l'encombrement des hommes et surtout des soldats, de l'inconvénient des tentes pour les campements, et surtout des conséquences déplorables d'une habitation trop petite pour la demeure d'un ou de plusieurs hommes.

## 512 BLESSÉS, OPÉRÉS, DANGER DE L'ENCOMBREMENT

 Travaux et recherches auxquels je me suis livré sur l'aération et l'encombrement.

Lors de l'épidémie de choléra de 1832, il résulta, de recherches nombreuses et de tableaux statistiques que je fis, soit dans les bureaux de secours, soit à l'hospice de la Salpétrière (dont j'étais alors le seul médecin), soit dans la ville: que la circonstance capitale qui donnaità ce mal terrible la plus haute gravité était le défaut d'aération et l'encombrement. Il sut pour moi démontré qu'un seul homme demeurant dans une chambre étroite où l'air n'était pas renouvelé par un tuyau de cheminée, par une fenêtre ou par toute autre ouvertufe, était aussi souvent atteint des accidents les plus graves de l'épidémie que les personnes qui habitaient en grand nombre des salles dans lesquelles l'air ne se renouvelait pas. Sur une population de quatre mille vieilles femmes. vivement impressionnées par la terreur que leur causait la maladie, je vis les cas de cholèra cesser complètement de se présenter dans chacun des services, alors que j'y faisais exécuter de jour et surtout de nuit la ventilation; tout au contraire, là où cette ventilation n'était pas faite (service des aliénées qui ne s'inquiétaient en rien de la présence du choléra), l'épidémie se prononçait avec une gravité de plus en plus grande. - Des faits absolument semblables se présentèrent en ville et dans les bureaux de secours (1).

<sup>(4)</sup> Voyez mon mémoire sur les causes du choléra dans la Clinique médicale de la Pitié, et ma thèse sur les habitations privées pour le concours d'hygiène 4838.

A la suite de ce même choléra, il advint que, sous l'influence de l'encombrement d'une multitude de jeunes orphelins, il se déclara une ophthalmie contagieuse dite catarrhale, qui les fit entrer en grand nombre à l'hôpital de la Pitié (1). La maladie fut des plus graves, eut le caractère contagieux, et ne cessa qu'à la suite du changement d'habitation.

Recueillant des observations innombrables sur la fièvre dite typhoïde, et particulièrement sur ses causes, je vis encore que les gens qui étaient atteints des symptômes graves de cette affection complexe avaient aussi habité des cabinets très-peu spacieux, ou encore des chambres dans lesquelles beaucoup d'individus demeuraient simultanément. (Clinique médicale de la Pitié, mémoires sur les causes de la fièvre dite typhoïde).

Partout où j'ai eu l'occasion d'observer des maladies graves et à caractère épidémique sérieux, j'ai constaté des faits analogues. La variole, chez les gens encombrés, a été confluente, et des pustules avec hémorrhagie hypoëpidermique (variole noire), se sont, dans de semblables cas, fréquemment déclarées. Sur des malades dont l'habitation avait été mal aérée, la scarlatine et la rougeole ont sévi avec une haute gravité Ne saiton pas que chez les fellahs d'Égypte, dont les logis insalubres sont fétides et étroits, la peste présente une horrible gravité? Et Dulaure n'a-t-il pas présenté

<sup>(1)</sup> Mémoire sur l'ophthalmie palpébrale dans la Clinique médicale de la Pitié.

## DANGERS DE L'ENCOMBREMENT

514

le hideux tableau de ces épidémies désastreuses qui, dans le moyen age, frappaient les tristes habitants de Paris?

878. Rapport à l'Académie impériale de médecine au nom de la commission des épidémies en 1836.

C'est en me fondant sur un grand nombre de recherches de ce genre qu'en 1836, étant chargé, par l'Académie, d'un rapport sur les épidémies qui avaient régné en France, je prouvai, jusqu'à l'évidence, que le défaut d'aération diurne et nocturne, que l'habitation d'un seul homme dans un espace trop exigu, et dans lequel l'air ne se renouvelle pas, qu'une agglomération d'hommes ou d'animaux dans un même lieu, etc., sont les circonstances dans lesquelles se forment ces funestes émananations qui impriment aux blessures, aux diverses maladies, un caractère pernicieux et souvent mortel.

Je donnai d'abord, à la modification qu'elles déterminent dans le sang, le nom de typhohèmie, et, en agissant ainsi, en adoptant une expression reçue, mais tout à fait mauvaise, puisqu'elle porterait à penser qu'il s'agit alors d'une stupeur du sang, je croyais faire mieux venir le pathonomisme auprès de M. Chomel, qui avait adopté le nom ridicule de fièvre typhoïde (1),

<sup>(4)</sup> Cetto locution vient des mots: Aèrre, qui signifie chaleur et se rapporte à l'affection la plus mai définie que l'on puisse imaginer: — typhus, expression qui entraîne l'idée de stupeur, et qui a été donnée à une maladic encore peu connue et dans laquelle existent des troubles cérèbraux (qui, parfois, font défaut), et enfin de side ou sidos, que l'on emploie pour désigner qu'une chose ressemble à une autre.

proposée par M. Genest. Cette concession ne calma pas les colères, et bientôt je vis qu'il ne fallait plus me rendre coupable d'une telle faiblesse. Écoutant bientôt la voix de la raison, je désignai l'altération du sang, en rapport avec les miasmes ou les substances putrides, sous la dénomination de septicémie, de σηπτικὸς (septique), αῖμα (sang), et de ie (maladie ou souffrance). Plus tard encore, j'ajoutai à cette expression l'idée de miasme ou de virus, et, dès lors, dans les cas où je croyais à l'altération du sang par un virus septique, je fis entrer le terme iose (de los, miasme, virus), dans la construction du mot, en adoptant alors l'expression septiosémie.

Or, le septiose ou le principe septique, qu'il soit le produit de fermentations ou d'une genèse d'êtres animés, est un des agents les plus dangereux des complications de maladies, et, partout où il vient à porter sa désastreuse influence, des phénomènes toujours fâcheux, mais souvent mortels viennent à se déclarer.

Bientôt je prouvai que c'était le septiose qui, le plus souvent, imprimait : aux épidémies de flèvres graves, de choléra, de suette, de peste, de flèvre jaune; à la flèvre puerpérale, aux plaies, à la pustule maligne, à la phlébite grave, à la flèvre dite puerpérale, à la dermie de la région sacrée, aux épizooties, etc., un caractère

C'est dono, en définitive, comme si, en se servant de cette expression, fièvre typhoïde, on disait : fièvre (mal définie) ressemblant au typhus (encore moins bien spécifié), lequel est caractérisé par de la stupeur, symptôme qui, très-ordinairement, n'existe pas dans la collection de phénomènes ainsi appelée.

pernicieux; je fis voir que sur trente-six cas d'épidémies observés en France par les médecins des départements, il fallait rapporter à l'habitation insalubre la cause principale des accidents funestes qui avaient lieu.

Un second mémoire, publié un an plus tard, établit, pour plusieurs nouvelles relations d'épidémie, des faits entièrement analogues.

Dans ces travaux (1836), qui me causèrent, du reste, beaucoup d'ennuis, je réclamai des règlements, des lois, soit pour fermer les affreux garnis habités par les ouvriers, soit pour favoriser des ouvertures de fenètres dans les maisons mal bâties, soit encore pour exiger que chaque habitant eût assez d'air pour respirer.

J'établis qu'il n'y avait pas de lois dont les prescriptions fussent plus contraires aux préceptes de l'hygiène que celles qui sont relatives aux jours de souffrance.

Je sis voir que ce n'était pas le vent qui frappe l'extérieur d'un logement qui donne de la salubrité, mais bien celui qui renouvelle l'air des appartements.

Je demandai, au nom de l'Académie, l'élargissement des rues et la démolition des masures, etc.

Plus tard, en 1838, ma Dissertation et mon Traité sur les habitations privées complétèrent les recherches et les notions que j'avais établies sur ce sujet et que j'étendis encore dans le Traité de médecine pratique.

Dans les discussions académiques relatives à la sièvre dite typhoïde, à la doctrine organopathique, dans mes cours de pathologie, dans mes Cliniques à

MES TRAVAUX SUR LES HABITATIONS INSALUBRES 1856 517 la Charité, je revins sur les faits qui précèdent, et j'en ajoutai un grand nombre d'autres.

M. de Melun a soutenu très-postérieurement à mes travaux, des idées du même genre. Membre du Corps législatif, il a eu la gloire de faire démolir le vieux Paris, dont Dulaure a tracé le hideux tableau; mais j'ose dire que j'avais depuis bien longtemps alors démontré, devant l'autorité et en séance publique, à l'Académie, l'indispensable nécessité d'assainir les logements insalubres, et sollicité des lois que M. de Melun fut assez heureux pour obtenir (4).

379. Moyens simples de ventilation.

On s'occupe beaucoup et avec raison, des moyens de ventilation perfectionnée, mais on peut facilement se passe d'un grand nombre d'entre eux; et si l'on ne craignait pas autant les courants d'air, si l'on n'en exagérait pas de beaucoup l'influence fâcheuse, il serait presque partout possible d'en établir d'utiles; il suffirait, pour que l'air d'un appartement d'hôpital devint pur, de le renouveler très-frèquemment, pendant quelques minutes, le jour et la nuit, au moyen de l'ouverture des portes et des fenêtres; c'est ce que je faisais pratiquer avec

<sup>(4)</sup> Quant à moi, le mémoire que je lus en 4836, à l'Académie, sur l'encombrement, ne me valut que des reproches, qui ne me furent pas épargnés par M. Pariset, et qui me parlait au nom du ministre; l'indépendance et l'intention de faire le bien n'étaient pas alors des titres de recommandation auprès du pouvoir; mais les hommes qui l'exerçaient sont passés et les faits scientifiques sont restés; aussi les rues de Paris ont été assainies, la demeure du pauvre est devenue plus salubre, et l'on a davantage songé à l'aération des hôpitaux.

# UTILITÉ DE L'AÉRATION

518

tant de succès à la Salpétrière et à la Pitié, et ce que je prescris encore à la Charité.

Les personnes qui veulent bien m'en croire n'ont pas la déplorable prévention de voir, dans un refroidissement momentané de l'air, un très-dangereux ennemi, et pratiquent utilement la ventilation lors de la maladie et même iorsqu'elles sont en santé. Du reste, ces conseils sont ceux que, dans tous les temps, l'hygiène et la raison ont prescrits, ceux que Darcet a formulés, ceux enfin qu'indiqueront tous les médecins instruits et tous les amis de l'humanité.

Propreté, aération (en évitant le refroidissement rapide du corps ou de l'air que l'on respire), tels sont les principaux moyens de prévenir les maladies aiguës et à caractère septique.

# CHAPITRE XXI

HYGIÈNE DES ARMÉES; CAMPEMENTS, ETC.

380. Application des préceptes relatifs à l'aération, soit à l'hygiène des armées, soit aux campements à l'habitation, etc.

Appliquons les considérations qui précèdent aux habitations des soldats en campagne, à leurs campements, à leur casernement, à leur hygiène enfin ; que les terribles souvenirs de 1814 et de 1815 soient présents à notre esprit et qu'ils nous retracent le hideux tableau de l'invasion étrangère trouvant dans la septiosémie des armées ce lamentable auxiliaire qui a mis à découvert les frontières de la France et lui a abandonné les portes de Paris! que les généraux qui disposent de nos cohortes sachent bien que le médecin, dans sa carrière toute d'humanité, remporte des victoires qui conservent le sang au lieu de le faire couler, et qu'ils n'oublient pas que Larrey et Desgenettes ont mérité au moins autant de statues les rappelant à la mémoire des hommes que Klèber, Masséna, ou les grands triomphateurs!

Les éléments de la véritable gloire de ces savants humanitaires ne sont pas fondés sur la stratégie, mais sur la philosophie, les sentiments affectueux et la science! alors que l'on réfléchit qu'une tente de soldat bien disposée, que des mesures de salubrité convenablement dirigées, peuvent conserver bien plus d'hommes de bataille que les boulets de l'ennemi n'en frappent mortellement, on voit tout d'abord l'importance de la médecine humaine et honorable; on voit à quelle hauteur s'élève la profession admirable du médecin, quand ceux qui s'y livrent sont dignes de l'exercer; tandis qu'elle s'abaisse au niveau d'une des plus abjectes, quand l'honneur, la conscience et la philanthropie ne la dirigent pas!

### 384. Construction des tentes.

Les tentes du soldat, telles qu'elles existent, sont les foyers des plus épouvantables épidémies: dix ou douze hommes y sont rassemblés dans un cercle dont le rayon est de trois ou quatre mètres; elles ne sont ouvertes que par un seul côté: la nuit on les ferme hermétiquement par la crainte du froid; à peine, dans ce lieu immonde, y a-t-il assez d'air pour ne pas y mourir. C'est, tout au plus, si quelques fentes imperceptibles, souvent bouchées par de l'herbe ou de la boue, viennent, par en bas et vers le point d'attache de la toile, renouveler l'oxygène que brûlent à chaque instant des poumons robustes altérés d'air; aucun tuyau, aucune ouverture ne viennent par en haut établir un courant

salutaire qui entraîne les vapeurs fétides que tant d'individus mal propres répandent dans l'atmosphère empestée de la tente, laquelle reste déployée dans le jour comme si l'on voulait y éterniser le foyer pestilentiel des épidémies! Le soldat repose sur de la paille ou des herbes humides qui recouvrent le sol, d'où souvent se dégagent des miasmes paludéens, ou qui est imprégné de délétères vapeurs; dans la tente il n'y a même pas de hamacs, dont la construction coûterait si peu et qui élèveraient de quelques centimètres au-dessus de la terre le corps des hommes fatigués par des factions ou par des marches. Entrez le jour, le soir et surtout le matin, soit par une température froide, soit surtout par une chaleur brûlante, dans ces bouges affreux où l'odeur du tabac et de l'alcool se marie aux pernicieuses odeurs septiques; et vous, qui recherchez l'air pur des champs ou des bois, vous reculerez d'horreur et vous vous demanderez, comment en 1866, on n'a pas amélioré davantage l'habitation du soldat!

Ce défenseur de notre patrie, de nos lois, de notre liberté, vient-il à stationner dans une ville, voici qu'on le parque, comme il en arrivait pour les pestiférés de Marseille, dans un temple, dans une église; l'air bientôt vicié ne se renouvellerait que si un ouragan, comme dans l'épidémie immortalisée par la charité philanthropique de Belzunce, enlevait la toiture de l'édifice.

De ces affreux repaires, de ces grottes mortifères s'élèvent des miasmes septiques, qui, prenant le caractère contagieux, s'étendent au loin, frappent le soldat, communiquent aux habitants leurs venins pernicieux et font rayonner au loin la maladie et la mort!

Ouvrez donc largement, le jour et la nuit, les portes et les fenétres de vos églises, de vos temples, de vos salles d'hôpital; que les lits, les vêtements soient rendus propres par les lavages, et qu'au moyen de préparations mercurielles, on débarrasse des parasites les soldats fatigués ou blessés; que les tentes laissent, entre le sol et leurs rebords, de larges ouvertures par lesquelles l'air pénètre et renouvelle l'oxygène que le militaire respire; qu'une large ouverture placée en haut ne permette pas la stagnation de cet air et des vapeurs putrides! Que des pertuis latéraux contribuent à la rénovation si utile de l'atmosphère intérieure du réduit où se trouvent six fois plus d'habitants qu'il n'en faudrait! Rappelez-vous la mortalité affreuse des sauvages habitants des huttes de l'Australie ou des côtes américaines. Tous morts! tous morts! disait un insulaire, qui. revenant dans son pays (1), ne voyait que des cadavres de variolés sur les côtes où il avait laissé, dans leurs étroites demeures, des amis et des parents! Si les cam pements ne peuvent être convenablement aérés, que les soldats reposent en plein air en ayant le soin de recouvrir leur corps par leurs habits et de voiler l'ouverture du conduit de l'air par un tissu léger, tenu à distance de la bouche au nez. Garantissez, sans doute, les hommes contre le froid et l'humidité; mais rappelez-

<sup>(4)</sup> Dissertation sur les habitations privées. — Voyages de Cook, de Vancouvert, etc.



## ARMÉES DÉCIMÉES PAR LA SEPTIOSE

523

vous, encore une fois, que l'action du septiose détruit les armées à peine décimées par le feu des batailles; de ces armées, qui résistaient au froid dans la campagne d'Austerlitz et d'Eylau, et qui ont été frappées davantage par le typhus dans les plaines de la Russie ou dans les champs désolés de la France, qu'elles n'ont péri par les lances des Cosaques ou par la trahison de Leipsik.

### CHAPITRE XXII

### OBÉSITÉ OU PANLIPOSIE.

382. Obésité, polysarcie ou plutôt panliposie (augmentation dans les proportions de la graisse).

L'obésité, l'augmentation considérable dans les proportions de la graisse, est la source des plus grandes incommodités, et devient une épouvantable insirmité alors qu'elle est devenue excessive. Le ventre acquiert surtout, dans ce cas, une énorme dimension. Le tissu adipeux de cette cavité prend une extension considérable; les épiploons, les mésentères, les parois qui entourent les viscères, etc., deviennent énormes ; la masse intestinale, l'estomac, le foie, la rate, sont refoulés en haut; la respiration en est démesurément gênée, et la matrice, poussée par en bas, est le siège d'un déplacement pénible à supporter et dangereux comme conséquences; le cœur, à cause de la difficulté à respirer, se dilate et plus tard s'hypertrophie, et ses battements deviennent irréguliers, les poumons se congestionnent et les bronches sont très-disposées aux souffrances aiguës ou chroniques; de là une très-grande prédisposition aux

lésions des organes circulatoires et respiratoires. Sous ces fâcheuses influences, la marche ascendante est trèslaborieuse, et la progression sur un plan uni devient même si gênée qu'au moindre exercice l'obèse est hors d'haleine. Il se fatigue au delà de toute expression, parce que son poids est énorme et parce que ses membres sont si gros que leurs mouvements deviennent très-difficiles. Vous le verriez couvert de sueur à la moindre marche; sa face est rouge et même bleuatre; démesurément vieux pour son âge, il est forcé de garder le repos et de ne plus se livrer aux exercices ou même aux plaisirs de la jeunesse ou de la virilité, etc. La tendance aux congestions et aux hémorrhagies céphaliques devient très-marquée, le moral lui même est modifié par suite de l'ennui que cet état physique cause à l'obèse, et par suite aussi des souffrances de toutes sortes auxquelles il est en butte.

383. Moyens de remédier à l'obésité et au grand volume du ventre.

Que les médecins et le public se prémunissent contre les médicaments, les recettes, etc., que tant de gens ont proposés contre l'obésité et le gros ventre. Il n'est pas besoin d'aller au loin chercher des substances spéciales pour s'opposer au trop de graisse et aux accidents qui en sont les résultats; quand une drogue, donnée pour y remédier, paraît réussir, croyez bien que c'est au régime suivi par le malade que cette amélioration est due. Dans le Traité de médecine pratique, j'ai insisté sur les moyens hygiéniques qui préviennent l'o-

## OBÉSITÉ; PANLIPOSIE; TRAITEMENT

526

bésité (1) et qui y remédient alors qu'elle n'est pas trop ancienne et trop considérable; ces moyens, qui ont été si utiles à un grand nombre de personnes auxquelles je les ai conseillés, sont les suivants:

- 1º De diminuer les proportions de la nourriture;
- 2. D'éviter surtout de porter à la fois trop d'aliments dans le tube digestif;
- 3° De ne point se livrer à des excès de table et surtout à l'orgie;
- 4º De ne prendre de l'eau que dans de faibles proportions;
- 5° De se priver, autant que possible, de pain, de fécules, de graines potagères, de graisses, d'huile et de corps gras (Dumas et Liebig);
- 6° De se nourrir particulièrement, ainsi que le font les animaux qui sont habituellement maigres (les carnassiers), de la substance charnue ou fibrineuse des viandes;
- 7° D'y ejouter quelques végétaux verts et herbacés, et cela à l'effet de varier la nourriture;
- 8º De prendre journellement beaucoup d'exercice à pied;
- 9° De rester peu au lit, et de ne pas dormir outre mesure;
- 40° De faire habituellement usage de purgatifs doux, tels que la rhubarbe, la soammonée, des pilules drastiques, le tout à des doses suffisantes pour produire deux ou trois selles par jour, etc.
  - (1) Article épidiaphrataple ou anadiaphragmie, t. 111 nº 4.012.

## OBÉSITÉ; PANLIPOSIE; TRAITEMENT

Il convient, pour apprécier les effets de ce traitement, de mesurer le ventre, de faire peser le corps avant de commencer l'usage des moyens précédents, et de réitérer cette mensuration un mois après; on verra presque toujours des différences si marquées entre les deux mesures, que bientôt l'on n'hésitera pas un moment à continuer l'usage de la curation dont il s'agit. Je pourrais citer des faits bien nombreux où j'ai réussi à arrêter de cette façon les progrès de l'obésité; mais il sussira de ce qui précède et de quelques semaines d'expérimentation pour être convaincu de l'utilité des préceptes que je viens de tracer.

## CHAPITRE XXIII

# HYDROPISIE DU VENTRE, ASCITE (HYDROPÉRITONIE); HYDROPISIE DU TISSU CELLULAIRE, ŒDÈME (HYDRETHMIE).

384. Les hydropisies sont des résultats de lésions et ne sont pas des maladies.

L'hydropisie du péritoine, ou hydropéritonie, celle du tissu cellulaire, ou œdème (hydrethmie), comme la plupart des autres hydrorganies, sont presque toujours, ou plutôt sont toujours les effets ou symptômes d'altérations du sang (ce qui arrive rarement), ou de lésions des organes solides (ce qui est de beaucoup plus fréquent).

385. Lésions d'organes solides donnant lieu à des hydropisies.

Les lésions des organes solides déterminent des obstacles à la circulation veineuse, obstacles qui rendent difficile l'absorption de la sérosité normalement déposée dans les cavités des membranes ou dans le tissu conjonctif ou cellulaire. Il en arrive ainsi: 10 dans les oblitérations de grosses veines par des hémoplasties ou embolies; 20 lors de la compression que des

tumeurs exercent sur ces vaisseaux; 3° dans les rétrécissements des orifices du cœur, ou dans d'excessives dilatations de cet organe; 4° lors de plusieurs affections chroniques du foie, telles que la cyrrhose, dans laquelle la structure des glandules hépatiques est tellement altérée que les capillaires terminaux de la veine porte, ou abdominable, et les radicules initiaux des veines hépatiques ne livrent plus facilement passage ausang; 5° dans certaines splénomégalies (augmentation dans le volume de la rate), et cela sans que l'on puisse dire au juste, dans la plupart de ces cas, comment l'organe splénique gêne le cours du sang dans les veines abdominables (1).

386. Certaines altérations du sang donnent-elles lieu à des hydropisies?

On a dit et répété, mais en oubliant de le prouver, que les altérations du sang, ou anomémies, donnent lieu à des hydropisies. L'état couenneux ou fibrineux de la sérosité du sang (hémite, plasthydrémie) étant fréquemment le point de départ de coagulations, c'està-dire de la formation d'hémoplasties ou d'embolies dans les veines, lésions qui y gênent la circulation, peut bien être la cause éloignée d'hydrorganies; c'est d'une manière indirecte que, dans ce cas; le sang couenneux, l'hémite ou plasthydrémie, donne lieu à

<sup>(4)</sup> Voyez dans le Traité de médecine pratique, v° 3987, des faits remarquables de guérisou, par l'emploi du sulfate de quinine, d'hydropisies symptomatiques de spléno-mégalic.

l'hydropisie. On n'observe pas, quoi qu'on en ait dit, d'hydropéritonie dans l'hydrémie sans complications. Lorsque très-rarement j'en ai vu survenir dans celle qui, accompagnée de symptômes névrovariques, a reçu le nom de chlorose ou de chloranémie, j'ai trouvé qu'il existait quelque lésion des solides ayant déterminé des hémostasies phlébiques.

Il est une autre altération du sang ou anomémie dans laquelle il se manifeste des hydrorganies tellement généralisées que l'on pourrait lui donner le nom de panhydrorganie: c'est celle qui se manifeste dans certaines néphrites dites granuleuses. Dans de tels cas, le sang, perdant chaque jour, par les orifices excréteurs des conduits urinaires des reins, une notable proportion d'albumine, finit, en conséquence, par en contenir beaucoup moins qu'à l'ordinaire, ce qui constitue une véritable hypoalbuminémie, ou, pour, abréger, hypoalbumémie. Tout porte à croire qu'alors le sérum du sang, ayant perdu beaucoup de l'albumine qui lui donnait de la viscosité, s'échappe facilement des conduits excréteurs, et cause ainsi non-seulement des hydrorganies, mais encore une diminution dans la consistance des milieux réfringents de l'œil, des symptômes encéphaliques, etc. - Ce ne serait donc pas, dans cette manière de voir, le rein granuleux qui causerait directement les hydropisies, mais le défaut d'albumine dans le sang qui donnerait lieu aux hydrorganies observées dans l'ensemble de symptômes dits maladie de Bright.

HYDROPISIES; COMBATTRE LEURS CAUSES ORGANIQUES 531

387. Dans le traitement des hydropisies, ce sont leurs causes qu'il faut combattre.

Ce qui précède était inévitable pour prouver qu'il est à peu près impossible de trouver des remèdes propres à combattre l'hydropisie considérée d'une façon générale, ou envisagée dans les divers organes. Ni les purgatifs, ni les médicaments que l'on dit provoquer les sueurs ou l'urine, ne parviennent, à eux seuls, à faire disparaître les collections séreuses.

C'est tantôt la cause organique et matérielle qui gêne le cours du sang, c'est l'affection qui donne lieu à la perte d'albumine qu'il faut chercher à enlever ou à détruire. Il m'est impossible de traiter ici ce sujet avec détail, et je me bornerai à dire, ainsi que je l'ai établi dans les autres parties de cet ouvrage, que les principaux moyens palliatifs sur lesquels on peut compter, alors qu'il s'agit des hydropisies, sont : 1º l'abstinence aussi complète que possible des boissons et des aliments; 2º les purgatifs propres à faire écouler de la sérosité; 3º la respiration d'un air sec et chaud; 4º les étuves sèches et la chaleur portée à l'extérieur du corps.

### NOTE

MELATIVE A LA MOLANCLATURE ORGANOPATHIQUE, OU ONO-MAPATRINOMESME ET DES MOTS NOUVEAUX EMPLOYÉS BANS CET OUVELGE.

Je me suis souvent servi, dans ce livre, de mots consacrès par la nomenclature nouvelle : mais je ne l'ai fait qu'après avoir employé des locutions reçues et dont ces mots sont l'expression. Je dois aux lecteurs une explication à ce sujet.

La plupart des mots généralement employés en médecine consacrent des idées fausses, désignent des maladies dont l'existence ne repose que sur des hypothèses, sur des idées abstraites, spéculatives et fondées sur des théories dont l'anatomie, la physiologie, le bon sens, on fait justice. La science positire a donne le prigrès ; les termes qui rappelaient d'anciennes erreurs se sont mis en travers et ont paralyse sa marche. A mesure que les faits ont été mieux connus, et que l'étude de l'homme a remplacé les divagations de l'empirisme et de la fantaisie, on a composé des mots qui exprimaient ces faits; on les a pris, en général, dans los racines grecques, quelquefois dans des termes latinn, et une partie du langage médical est devenue logique et raisonnable; mais la vieillerie et la routine nont rentées debout; on a conservé les mos celtiques. tudesques, saxons, arabes, scandinaves, les lecutions

que les patois des différents pays faisaient surgir, et de tout cela on a fait un affreux gâchis, un tohubohu, une sorte de pandémonium composé de grec, de latin, de vieux gaulois, d'alchimie, de vitalisme; et ce jargon grossier, composé absurde de toutes les langues, a obligé les auteurs à consacrer presque autant de pages pour spécifier la signification d'un mot qu'ils en employaient pour l'étude de la maladie dont ils voulaient traiter.

Mais c'est là le moindre inconvénient de ces malheureux mots. Si l'on s'entendait sur leur valeur actuelle, rien de mieux : on accepterait une signification commune; mais il n'en est rien. Chaque peuple, chaque école, parfois chaque médecin, veut exprimer, par tel nom, une idée différente de celle qu'y attache son voisin. En France, l'apoplexie est une hémorrhagie, et, en Allemagne, on en admet, comme on le fait parfois encore à Paris de nerveuses, de séreuses, sans matière, etc.; l'ictère, qui a pris son nom de la couleur jaune des yeux d'une sorte de belette, est, pour les uns, une simple pénétration de la bile dans le sang, et, pour d'autres, une maladie spéciale; l'expression : choléra, qui signifie bile, se dit d'une souffrance aiguë de l'estomac qui, n'étant en rien due à la bile, a lieu dans nos climats, tout aussi bien que du mal affreux dont l'Inde paraît avoir été l'origine; les uns donnent le nom de peste à un grand nombre de maladies infectueuses ou contagieuses, les autres réservent cette expression pour le mal épidémique qui prend sa source sur les bords du Nil ; personne ne s'entend sur le rhumatisme, pas plus que personne ne peut comprendre cet être fantastique.

Le catarrhe, pour tel médecin, est une entité à part qui règne sur le corps de l'homme et cause certaines maladies des bronches, de l'intestin, de la vessie, etc., tandis que, pour d'autres, il n'est plus qu'une bronchite; tel fait de l'asthme une affection spéciale, presque spécifique, et tel autre n'y voit qu'une simple difficulté à respirer produite par des lésions anatomiques, Le typhus est pris par ceux-ci pour une maladie à forme déterminée, tandis que ceux-là le considèrent, ainsi que cette expression l'indique, comme le symptôme stupeur, qui manque si fréquemment dans certaines affections appelées typhus. On s'est servi du mot flèvre pour désigner quelques centaines de collections arbitraires de symptômes, et cette locution : sièvre, qui signifie brûler, a été appliquée au frisson qui rend l'idée de froid, et l'adjectif algide, qui désigne un refroidissement extrême, a même été ajouté à ce mot flèvre.

Les Français donnent le nom de constipation à cinq ou six états morbides qui se rattachent à des troubles dans la défécation, tandis qu'en Espagne on applique ce même terme à un rhume du nez et des bronches, etc., etc.

Les mots dont on se sert ont souvent, comme étymologie, une signification presque opposée à celle que l'usage a consacrée. Ici, c'est le catarrhe sec qui renerme l'idée d'un écoulement sec; là le terme asphyxie (sans pouls) est appliqué à un état dans lequel le pouls

est souvent énergique; ailleurs, aux coliques, qui devraient être rapportées à l'intestin còlon, on ajoute les épithèles: néphrétiques, hépatiques, utérines, ce qui signifie qu'elles ont les reins, le foie, la matrice pour siège; d'autres fois ce sont des mots qui choquent au delà de tout l'euphonie, ainsi qu'il en est arrivé pour ceux que Molière a stigmatisés et pour tant d'autres du même genre. Certes, cachexie, cacochymie, pédarthrocace, etc., dépassent en étrangeté les termes des nomenclatures modernes qu'une systématisation utile force à admettre, et si la longueur des mots significatifs était un reproche sensé que l'on pût faire à ces derniers termes, la vieille nomenclature en fournirait un grand nombre qui blesseraient l'oreille si l'on n'avait l'habitude de les entendre.

Le langage médical ancien est tellement déplorable que la plupart des modernes ont émis des vœux pour qu'il soit rectifié; on peut lire dans mon Traité de médecine pratique les nombreuses citations que j'ai faites à l'appui de cette assertion; mais ces auteurs, malgré leur science, ne pouvaient faire la réforme qu'ils jugeaient si utile d'effectuer; ils admettaient des maladies unitaires qui, purement hypothétiques, ne pouvaient être nommées comme des choses réelles; l'existence de ces affections, leur nombre, leurs caractères, étant tous de convention, certains médecins en admettaient très-peu, tandis que les autres en voyaient des milliers.

A ce qui n'a rien de fixe on ne peut donner un nom

raisonnable; et ce n'est qu'en se fondant sur les faits anatomiques et physiologiques qu'une nomenclature est exécutable.

Le pathonomisme n'a donc été possible qu'à cause de la doctrine sur laquelle il est fonde; si l'on n'avait pas renversé d'abord les vieilles idées, il eût été impossible de faire un système de mots expressifs et justes. Il fallait qu'un 89 scientifique passât sur la médecine pour qu'elle devint raisonnable, pour qu'elle pût se servir d'un langage digne d'elle et dont les nomenclatures botaniques, chimiques, anatomiques, décimales, lui avaient fait voir les admirables modèles; les langues ne sont que l'expression de l'état des sciences; telle science; sans bases, sans fixité, sans systématisation, ne peut avoir un langage significatif et correct; et l'on peut dire sans crainte que Vesale, Winslow, Harvey, Haller, Morgagny, Avenbrugger, Corvisart, Bichat, Laënnec, Duméril, Chaussier, Bayle, Broussais, etc., sont les vrais fondateurs du pathonomisme, et que M. Piorry n'a fait que rassembler leurs idées, les réunir, les systématiser et emprunter aux anciens et aux modernes des racines grecques (dont l'usage est entré dans le génie de notre langue) pour exprimer les pensées des grands maîtres.

Or, c'est là ce que l'on n'a pas assez vu; on a attaqué tout d'abord le pathonomisme avec une sorte de furie; on a dirigé contre lui des attaques de toutes sortes: l'ironie la plus sanglante, le ridicule et le méchant sourire ont été les armes de gens qui n'avaient pas de

bonnes raisons à opposer à une doctrine qui reposait sur les travaux des anatomistes, des physiologistes, des médecins les plus illustres ; les livres, les journaux, les académies, ont retenti d'articles ou de discours, où parfois l'on composait des mots ridicules que l'on attribuait faussement à l'auteur du pathonomisme. Qu'estil résulté de toutes ces petites menées? Que chacun fait en particulier ce que M. Piorry a systématisé en grand; que l'esprit du siècle, comme l'a dit un grand publiciste, a pénétré dans la tête des gens qui y pensaient le moins, et que ceux-là mêmes qui, dans leurs cours ou leurs écrits, ont le plus attaqué la nomenclature organo-pathologique, ceux qui ont le plus déclamé contre l'usage des mots grecs, ceux qui se sont servis de locutions françaises renouvelées des patois des Gaules pour éviter d'employer des termes déjà admis partout, font des efforts incroyables, aussi inutiles que malheureux, pour désigner par des expressions grecques, des symptômes de peu d'importance pratique. (Voyez la Médecine du bon sens, pag. 422, 423).

Le jour est arrivé où l'on peut sans craînte parler nomenclature, parce que le progrès anatomique, physiologique, étayé par les connaissances physiques et chimiques, permet de le faire, et c'est parce que l'auteur de ce livre est convaincu de cette vérité qu'il ajoute à cet ouvrage le tableau suivant du pathonemisme.

Il suffira d'étudier pendant une heure ce même tableau pour le comprendre parfaitement, et pour apprendre 868

NOTE

à composer soi-même des mots significatifs et sur lesquels il est à peu près impossible de se méprendre.

Bien entendu qu'un grand nombre de noms d'organes, de lésions ou d'antécédents ne se trouvent pas dans ce coup d'œil général sur le pathonomisme ; mais le besoin de la science et l'intelligence des médecins permettront facilement d'ajouter aux termes qu'il contient des dénominations nouvelles.


# TABLE

P	ages.
NTRODUCTION	1
I Maladies de la peau considérées en général	
(dermopathies ou dermies)	12
II Moyens simples et utiles dans les maladies	
des yeux . , ,	66
III Moyens simples à employer contre les ma-	
ladies de l'oreille	93
IV Moyens simples ou hygiéniques applicables	
aux affections du conduit de l'air (organes	
respiratoires, angiaire)	105
V Maladies de l'appareil circulatoire (angié-	
mies); altérations du sang (anomémies);	
maladies du cœur, des artères, des veines	
et des vaisseaux capillaires (hémies); car-	
diopathies, artéries, phlébopathies et mi-	
crangiopathies	151
VI Moyens simples et utiles dans les affections	
des vaisseaux sanguins	185
VII. — Maladies de l'appareil digestif. — Lésions	
des lèvres	203
VIII Moyens simples et hygieniques applicables	
aux maladies de l'estomac, gastropathies	
ou gastries	219



# 540 TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
IX. — Maladies du foie (hépathies)	265
X. — Maladies de la rate (splénopathies ou splé-	
nies)	275
XI Maladies des reins (néphropathies)	281
XII. — Maladies de la vessie (cysturopathies ou cysturies).	
XIII. — Maladies des organes génitaux de l'homme	
(angiospermies)	
XIII bis. Maladies des organes génitaux de la femme	
XIV. — Maladies des muscles (rhumatismes)	365
XV. — Maladies des os et de leur membrane d'en-	
veloppe (ostéopathies ou ostéies, périos-	
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
téies)	282
(névraxies)	423
XVII. — Annotations générales sur divers médica-	
ments et sur des médications variées.	486
XVIII. — Plaies produites par les armes à feu	504
XIX. — Curation des abcès	
XX. — De l'aération, de l'habitation et de l'encom-	
brement	511
XXI. — Hygiène des armées; campements, etc	
XXII. — Obesité ou panliposie	
XXIII. — Hydropisie du ventre, ascite (hydropéri-	
tonie), hydropisie du tissu cellulaire,	
œdème (hydrethmie)	
Note relative à la nomenclature organopathique, ou	
onomapathonomisme et des mots nouveaux employés	
dans cet ouvrage	539



DES

LÉSIONS ET DES MALADIES INDIQUÉES DANS CET OUVRAGE

A

Abaissement de la matrice								2	359
Abcès, leur traitement .						1			358
Abcès par congestion								5	404
Abcès du sein (causes des)									356
Abcès sous l'ongle									64
Absence de dents, cause de								,	224
Accumulation de matières	dan	s les	in	test	ins;	m	oyer	1S	
d'y remédier									241
Aération		- 1	. 4		141		511	a	520
Aéro-gastralgie			*		1				227
Albuminurrhée				*		*	*		290
Alienation mentale	*			9		٠.	2.	3	453
Amaigrissement, débilité d	es m	usci	es 1	resu	Itan	ta	e lei	ır	
défaut d'action	*					*	20	*	383
Amélioration de la voix et	du	cha	nt	proc	luite	p	ar le	es	
grandes inspirations, etc			13						121
Anomémies (altération du	san	g) .							151
Aphthes			1			4	*		193
Aphasie						*	*		439
Apoplexies	:42	dan			4inn	-	*	r.	404
Apoplexie pulmonaire, util	ite	ues	res	pira	tton	is e	xpu	1-	139
Ascite	*						*		528
Ataxie locomotrice			1 3						390
Auras (moyen d'arrêter les	1			4				-	476
and (mojen d arreter les			7						310



## 542 TABLE ALPHAPÉTIQUE

B

Bains (leur utilité)	491 499 361 117 41
Boutons du front et des tempes	17 43 44 190
C	
Cachexie paludéenne. Cataracte (opération de la). Catarrhe de la vessie (traitement du) Cathétérisme (petit moyen destiné à rendre le) moins	181 75 312
douloureux . Calculs des reins engagés dans l'uretère.	305
Cantharides (moyens propres à prevenir l'absorption des)	289
Cerumen causant la durete de l'ouie.	369 96 171
Cholémie (jaunisse, ictère). Cysturite. Congestions cérébrales Congestions pulmonaires (très-grande utilité des res-	309 434
Congestions pulmonaires (tres-grande utilité des res- pirations profondes et reitérées dans les).	132
Conjonctive (plaies de la), corps étrangers	75 250
Constipation (diverses espèces de). Cornée (plaies de la). Cors aux pieds (traitement).	75 57
dans le conduit auditif externe.	95
Corsets et brassières pouvant présenter de l'utilité. Couches graisseuses, emplatres graisseux appliqués	228 412
sur la peau	33
<b>.</b>	
Décollements de la peau, suites d'abcès sous-cu- tanés	40
tanés	466 15

TABLE ALPHABETIQUE	010
Dérivatifs, vésicatoires, cautéres, moxas, séton, etc., (utilité des)	500
que l'on fait cesser en prévenant l'action de ces	
causes. Dermopathies du siège; soins à leur donner. Extrême	15
	49
Déviation des vertebres (moyens d'éviter la)	408
Diabète	291
Diahete Diachylum et poudre de lycopode dans les varices	188
(utilité du)	100
Didymalgies (douleurs testiculaires)	328
Douches (moyens faciles de pratiquer des)	243
Durillons de la plante des pieds causés par des saillies	
de la semelle	57
E	
Eaux minérales	495
Ecoulements	348
Ecoulements	94
Eliosémie (altération du sang par le miasme des ma-	166
rais Empoisonnement par la respiration de l'hydrogène	178
empoisonnement par la respiration de l'hydrogene	287
arsénié	456
Encombrement 541 à	
Encombrement	198
Enduits des dents	197
Enduits des dents.  Engelures  Enrouement.  Epilepsie (traitement de l').  Escarrhes (moyen de prévenir la putréfaction des)	62
Enrouement	118
Escarrhes (moven de prévenir la putréfaction des)	54
Estomac (douleurs nerveuses de l')	236
Estomac (douleurs nerveuses de l')	
le tube aerien	126
Excision d'un fragment de peau lâche et amincie,	
pour contenir une hernie, pour remédier à une di- latation de veine et pour effacer les rides	48
Exercice musculaire (règles pratiques relatives à l').	393
Exostoses	417
	-
F	
Faiblesse de l'ouïe Utilité de la respiration auri-	
	101
culaire	347

544	T	BLE	ALP	HAB	ÉTIQ	UE				
Fièvres puer Fissures hér	pérales morrhag	iques	et	névr	algio	ques	de	i	anu	
Fissures Ion	gitudina	iles d	e la	reg	ion s	sacr	ee.	-	Leu	rs
causes et	leurs da	ngers			8 3	8				
Folie	110.00			9	5 10	- 20	- 31			
Balémie			Įφ.	ч			3.			200
Falémie Fangrène sé	nile	Tra	ai+	t	trè	5-52	mpl	e.	ma	is
très-utile.	- Cas	rema	1	-						
astralgie .				- 8		4	2	3		*
astralgie, v	omissen	ient,		u	ne ir	mar	mm	atio	on u	1-
suffisante.	malia in	- 4	6		4 41	10		2	- an	
de la neen	nerre, pa	rasit	e	913	it ar	vers	es :	ma	adi	es
ue la peau	vaires /i	nflan		- 8	deel			*	*	
									*	
landes sali			III.			-130				
de la peau Handes sali Foutte Fravelle (uti	ilité des	boiss	sons	aqu	euses	s da	ns l	a)	Ó. I	
Fravelle (uti	ilité des	boiss	ons H	aqu	euses	s da	ns l	a)		
ravelle (uti	ilité des	boiss	ons H	aqu	euses	s da	ns l	a)		
ravelle (uti	ilité des	boiss	ons H	aqu	euses	s da	ns l	a)		
ravelle (uti Iabitation . Ialeine (ma Iemeralopie Iemeralopie	ili <b>t</b> é des uvaise)	boiss	sons H	aqu	euses	s da	ns l	a)	51:	l a
ravelle (uti Iabitation . Ialeine (ma Iemeralopie Iemeralopie	ili <b>t</b> é des uvaise)	boiss	sons H	aqu	euses	s da	ns l	a)	51:	l a
ravelle (uti Iabitation . Ialeine (ma Iéméralopie Iéméralopie Iémite ou pl Iémorroïdes	uvaise)  ou visic asthydre	boiss on n'a	esons	aqu t lie	euses	s da	ns l	a) ind :	51: jour	1 à
Iabitation . Iabitation . Ialeine (ma lèméralopie léméralopie léméralopie lémorroïdes lémorroïdes	uvaise)  ou visio asthydre (curations nasale	boiss on n'a	ayan	aqu	euses	s da	gra	nd	51: jour	1 à
Iabitation . Iabitation . Ialeine (ma lèméralopie léméralopie léméralopie lémorroïdes lémorroïdes	uvaise)  ou visio asthydre (curations nasale	boiss on n'a	ayan	aqu	euses	s da	gra	nd	51: jour	1 à
Iabitation . Iabitation . Ialeine (ma lèméralopie léméralopie léméralopie lémorroïdes lémorroïdes	uvaise)  ou visio asthydre (curations nasale	boiss on n'a	ayan	aqu	euses	s da	gra	nd	51: jour	1 à
labitation .  Ialeine (ma léméralopie léméralopie lémorroïdes .  lémorroïdes .  lépatémies .  épatiques ( ernies (mo tites)	uvaise)  ou visic asthydre (curatic es nasale douleurs	on n'a	ayan so). oyen	t lie s sin	euses u qu uple	'au : inte	gra arre	nd :	51: jour : r le: :	1 à
(abitation laleine (ma léméralopie léméralopie lémite ou ple lémorroïdes émorrhagie épatémies épatiques (ernies (mo tites)	uvaise)  ou visic asthydre (curatic es nasale douleurs yens tre	boiss on n'a emie. on de es (m	ayan (s). oyen (aples	t lie	euses	'au	gra arre	nd :	54?	1 à
(abitation laleine (ma léméralopie léméralopie lémite ou ple lémorroïdes émorrhagie épatémies épatiques (ernies (mo tites)	uvaise)  ou visic asthydre (curatic es nasale douleurs yens tre	boiss on n'a emie. on de es (m	ayan (s). oyen (aples	t lie	euses	'au	gra arre	nd :	54?	1 à
labitation laleine (ma léméralopie léméralopie lémite ou ple lémorroïdes lémorrhagie lépatémies épatiques (mo tites) vdrémie (de	uvaise)  ou visic asthydre (curatic es nasale douleurs yens tre	boiss on n'a emie. on de es (m	ayan (s). oyen (aples	aqu t lie s sir de	euses u qu mple mai	'au : d' : inte	gra arre	nd de	544 jour	1 à
labitation .  laleine (ma kéméralopie léméralopie lémorroïdes lémorrhagie lépatémies .  lépatiques (ernies (mo tites) .  ydrémie (do ydropisies o ydropisies de ygiène des	uvaise) ou visic asthydré (curatic es nasale douleurs yens trè efaut de en génér (traitem armées	boiss on n'a emie. on de es (m .) es-sin color cal .	ayan s). oyen : ation es).	aqu t lie s sir de	euses u qu mple mai	'au : d' : inte	gra arre	nd de	544 jour	1 à
Habitation daleine (ma lemeralopie léméralopie lémorroïdes lémorrhagie lépatèmies (mo tites) dydrémie (dydrémie (dydrémie (dydropisies (ygrème des ypémie (an)	uvaise) ou visic asthydre (curatic es nasale douleurs yens tre efaut de en gener (traitem armées émie).	boiss on n'a emie. on de es (m color al ent d	ayan s). oyen ation es)	aqu t lie s sir de	euses u qu mple mai	'au :	gra arre	nd :	5ff	l å
Habitation . Haleine (ma Hemeralopie Hemeralopie Hemite ou pl Hemorroïdes Hemorrhagie Hepatemies . Hepatiques (Hernies (mo tites) Lydremie (do Lydropisies of Lydropisies of Lygrenie des Lypenie (and Lypohydremie	uvaise)  ou visic asthydre (curatic es nasale douleurs yens tre en gener (traitem armées émie).	boiss  on n'a finite.  color color al .  ution	ayan s). oyen cation es)	aqu t lie s sir de	euses u qu mple mai	'au inte	gra arre	nd :	54:	1 a
Habitation . Haleine (ma Heméralopie Héméralopie Hémite ou pl Hémorroïdes Hémorrhagie Hépatiques ( Hepatiques ( Hernies (mo	uvaise)  ou visic asthydre (curatic es nasale douleurs yens tre en gener (traitem armées émie).	boiss  on n'a finite.  color color al .  ution	ayan s). oyen cation es)	aqu t lie s sir de	euses u qu mple mai	'au inte	gra arre	nd :	54:	1 a

TABLE ALPHABÉTIQUE	<b>5</b> 43
Incontinence d'urine	302
Inconvénient de la flanelle	15
Inconvénients des boutons de pantalon qui font saillie	
sur le nombril	45
Inconvénients des corsets dans certains cas	411
Influence de la pesanteur sur la respiration par le nez.	112
Influence fâcheuse de certains vêtements sur la peau.	32
Irrigations intestinales (utilité des)	246
Iris (inflammation de l') et des parties profondes de	
l'œil	75
J	
_	
Jaunisse (cholémie)	268
_	
L	
Langue (ulcération de la) considérée comme cancé-	
reuse	194
Laryngies	117
Lèvres (fissure de la commissure des)	192
Lieu sur lequel doivent être pratiquées les frictions	
dans les cas de ganglions du cou enflammés	39
Limonade chlorhydrique (emploi de la) dans le cas	
d'incrustation	422
Lombago	371
M	
and the late one was to the state of the	
Maladies de la peau causées soit par les frottements	
des parties du tégument en contact, soit par l'ac-	
tion des poils récemment coupés	44
Maladies de la peau et des jointures du gros orteil	
causées par des plis de la chaussure, et simulant la goutte aux pieds.	
Maladies de la peau de l'ombilic	60
Maladies du cuir chevelu	45
1/	38
Matrice (cancers de la)	38 <b>6</b> 349
Matrice (mesure de la)	
Medicaments (réflexions critiques sur les)	340 437
Menstruation (apparition première de la)	333
Migraine	425
Migraine (moyens hygiéniques prévenant cette même).	80
Migraine ophthalmique (aliments excitants guérissant	30
au début la)	79
Moelle rachidienne (maladies de la).	481

Moyens simples à employer contre les brûlures légères	26
et superficielles	20
sicule biliaire et à la jaunisse	269
Moyens très-simples de faire expectorer	127
Moyens très-simples de faire que la région sacrée ne	
reste pas toujours en contact avec le liv	50
Muscles (rupture des)	377
Myélopathies	480
Muscles (rupture des)	<b>37</b> 5
N	
Naminay (uladration des)	106
Narines (ulcération des)	370
Névralgies variées se développant à l'époque mens-	310
two alla	370
truelle	179
Nor (moledies du) 405 406 407	408
Nomenclature (exposé de la) médicale	532
Nomenciature (expose de la) medicale	002
•	
Obésité	524
Obésité	93
Ongle rentré dans les chairs	64
Ongle rentré dans les chairs	
pières	68
Ophthalmies légères	67
Ostéies	395
pières	167
OE	
Œdeme des paupières causé par une lunette dite	
pince-nez	69
Œil (inflammations légères de l')	67

P

Parasites, ulcérations, scrofules, écrouelles du cou Parotidites

Pales couleurs (hydremonevries) .

TABLE ALPHABÉTIQUE

TABLE ALPHABÉTIQUE	547
Plaies par armes à feu 504 à Plessimétrisme utérin Pneumophymie (utilité des respirations profondes et	363
reitérées dans le traitement de la).  Pneumonémie hypostasique.	135
Pneumorrhémies (hémorrhagie pulmonaire) utilité des	192
respirations profondes et réitérées	137
Poils dans les narines. — Danger de les arracher, de	108
les couper, etc	100
antinamia an animanta	37
Poitrine (douleurs de la) dites rhumatismales.  Précautions hygiéniques.	148
Préparation de l'emplatre de diachylum.	20
Procédé pour faire respirer l'oreille moyenne	98
Procedes applicables à la curation des petites bles-	
sures de la peau. Propogation au larynx de l'inflammation du nez.	18
Pyrosis (oxygastrie)	231
Tyroda (oxygastrie)	201
Q	
Quinine (utilité de la) dans les fièvres intermittentes.	276
R	
	399
Rachitisme	399 450
Rachitisme	450 73
Rachitisme	450 73 404
Rachitisme	73 404 341
Rachitisme	450 73 404
Rachitisme	73 404 341 252
Rachitisme	73 404 341 252 105 105 365
Rachitisme . Ramollissement de l'axe nerveux . Rapprochement et occlusion des paupières par des bandelettes agglutinatives, avantage de ce procédé. Résultats remarquables . Redressement des os . Règles (moyens extérieurs de ramener les) . Resserrement des sphincters . Rhinite (ou rhume du cerveau) . Rhumatisme . Rhumatisme . Rhumatisme .	73 404 341 252 105 105 365 162
Rachitisme . Ramollissement de l'axe nerveux . Rapprochement et occlusion des paupières par des bandelettes agglutinatives, avantage de ce procédé. Résultats remarquables . Redressement des os . Règles (moyens extérieurs de ramener les) . Resserrement des sphincters . Rhinite (ou rhume du cerveau) . Rhumatisme . Rhumatisme . Rhumatisme .	73 404 341 252 105 105 365
Rachitisme	73 404 341 252 105 105 365 162
Rachitisme	73 404 341 252 105 105 365 162
Rachitisme . Ramollissement de l'axe nerveux . Rapprochement et occlusion des paupières par des bandelettes agglutinatives, avantage de ce procédé. Résultats remarquables . Redressement des os . Règles (moyens extérieurs de ramener les) . Resserrement des sphincters . Rhinies (maladies du nez et des fosses nasales) . Rhinite (ou rhume du cerveau) . Rhumatisme . Rhumatisme . Rhumatisme . Rhumes et maladies aigues du poumon (utilité d'une voilette pour prévenir les) . Rudesse de la peau causée par la desquammation de l'épiderme ; ichthyose des auteurs .	73 404 341 252 105 105 365 162
Rachitisme .  Ramollissement de l'axe nerveux .  Rapprochement et occlusion des paupières par des bandelettes agglutinatives, avantage de ce procédé. Résultats remarquables .  Résultats remarquables .  Rèsultats remarquables .  Rhinite (ou rhume du cerveau) .  Rhinite (ou rhume du cerveau) .  Rhumatisme et maladies aigues du poumon (utilité d'une voilette pour prévenir les) .  Rudesse de la peau causée par la desquammation de l'épiderme ; ichthyose des auteurs .	73 404 341 252 105 105 365 162 124 35
Rachitisme . Ramollissement de l'axe nerveux . Rapprochement et occlusion des paupières par des bandelettes agglutinatives, avantage de ce procédé. Résultats remarquables . Redressement des os . Règles (moyens extérieurs de ramener les) Resserrement des sphincters . Rhinies (maladies du nez et des fosses nasales) . Rhinies (maladies du nez et des fosses nasales) . Rhinite (ou rhume du cerveau)	73 404 341 252 105 365 162 124 35
Rachitisme . Ramollissement de l'axe nerveux . Rapprochement et occlusion des paupières par des bandelettes agglutinatives, avantage de ce procédé. Résultats remarquables . Redressement des os . Règles (moyens extérieurs de ramener les) . Resserrement des sphincters . Rhinies (maladies du nez et des fosses nasales) . Rhinite (ou rhume du cerveau) . Rhumatisme . Rhumatisme . Rhumes et maladies aigues du poumon (utilité d'une voilette pour prévenir les) . Rudesse de la peau causée par la desquammation de l'épiderme; ichthyose des auteurs	73 404 341 252 105 365 162 124 35

848	TABLE A	LPHAE	e <b>ét</b> iq	UR				
Sel marin (utilite	du) dans	les fi	èvres	d'ac	cės.	_	Se	
inconvénients					•			. 278
inconvenients Soif (traitement of Soins à donner à	de la) .	٠.	• •	•	•	•	•	. 297
Soins à donner à	la femme	encei	nte.		•			. 351
Soins à donner à Soins de proprete	ė, lavage,	lotion	ıs, on	ction	s d	iver	sea	3,
bains, etc				•				. 13
Stérilité chez l'he	omme .							. 320
bains, etc Sterilité chez l'ho Strabisme ; moye	en simple (	d'y rei	médie	r.				. 87
Sucre (administrative Syncope, évanou	ation du) o	lans l	e dial	bète :	suci	•é		. 295
Syncope, évanou	issement (	(moye:	ns d'	y ren	aédi	ier)		. 443
Syphiosemie Syphiosorganie (								. 181
Syphiosorganie (	affections:	vénéri	ennes	) mo	yen	de	pre	<u>-</u>
vention			•	•				. 32
		T						
Tête (douleurs de	e)				_	_		. 424
Tête (douleurs de Théorie des névr	opallies.			-				. 474
Trachéie				-		-		. 117
Traitement des	brůlures é	tendu	as à	une s	rar	nde	S111	
face de la pes	u: combu	stion	des v	êtem	ent	S SI	ıi v	ie ie
de la cautérisa	tion des t	égume	ents .					. 28
Traitement des	dermonath	ies de	e la r	égion	886	crée		. 5
Toxémies (altér	ation du s	ang n	ar les	ssuh	sta	nces	. de	
1								
Tubercules puln	nonaires	(emul	oi du	nh	osnł	ın te		le .
chaux dans le	s)	( J			- P		. `	. 42
Tumeur lacryma	de compr	ession	prév	entiv	e.	•	•	. 7
rumour ruorj	,p-		P		••	•	•	•
		U						
Ulcères des os . Urination trop fi Urines concentre Utilité des insp								. 418
Urination trop f	réquente							. 30
Urines concentre	ées, épaiss	es. sé	dime	nteus	es			. 28
Utilité des insp	irations l	entes	et pr	ofone	les.	su	ivi	88
d'expectoration	ns brusque	s pou	r exp	ulser	les	m	uco	) <u> </u>
sités du laryn: Utilité des purg	atifs admi	nistre	s par	le re	ctu	mi		. 23
Utilité de veille	r à l'attitu	de du	corp	в.				. 40
					-	-		
		v						
Vagin (tamponn	ement du	) et co	ompre	ession	ı dı	ı ve	ntı	re
après l'accouc	hement .	· .						. 34
après l'accouc Varices et héme	orrhagies	veine	uses	(infl	uen	Ce	hei	1-
reuse de la po	sition élev	ée des	men	abres				. 18
reuse de la po Viandes crues (	moyens de	prépa	arer l	es).				. 22
Vomissements (i	nanière de	prove	oquer	lés)		•		







